


# المتميز



## في الرياضيات



تابع جديد زاكروولي على موقعنا  
<https://www.zakrooly.com>

=

+

>

<

الصف الثاني الإعدادي  
الفصل الدراسي الأول

إعداد : أحمد الشنوري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد الله و اشكره و أثنى عليه أن أعاننى

و وفقتى لتقديم هذا الكتاب من مجموعة

" المتميز "

فى الرياضيات لأقدمه لأبنائى المتعلمين

و إخوانى المعلمين و الذى راعيت فيه

تقديم المادة العلمية بطريقة مبسطة و ممتعة

مدللاً بأمثلة محلولة ثم تدريبات متنوعة و متدرجة

للتدريب على كيفية الحل لتناسب كل المستويات

و مرفق حلولها كاملة فى آخر الكتاب

متمنياً أن ينال رضاكم و ثقتم التى أعتز بها

و الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً

و هو ولى التوفيق

أحمد التنتوى

## المحتويات

الوحدة الأولى : الأعداد الحقيقية  
مراجعة

\* الدرس الأول : الجذر التكعيبي للعدد النسبي

\* الدرس الثانى : مجموعة الأعداد غير النسبية

\* الدرس الثالث : إيجاد قيمة تقريبية لعدد غير نسبي

\* الدرس الرابع : مجموعة الأعداد الحقيقية ح

\* الدرس الخامس : علاقة الترتيب فى ح

\* الدرس السادس : الفترات

\* الدرس السابع : العمليات على الأعداد الحقيقية

\* الدرس الثامن : العمليات على الحذور التربيعية

\* الدرس التاسع : العمليات على الحذور التكعيبية

\* الدرس العاشر : تطبيقات على الأعداد الحقيقية

\* الدرس الحادى عشر : حل المعادلات و المتباينات من

الدرجة الأولى فى متغير فى ح

الوحدة الثانية : العلاقة بين متغيرين

\* الدرس الأول : العلاقة بين متغيرين

\* الدرس الثانى : ميل الخط المستقيم و تطبيقات حياتية

الوحدة الثالثة : الإحصاء

\* الدرس الأول : جمع البيانات و تنظيمها

\* الدرس الثانى : الجدول التكرارى المتجمع الصاعد و الجدول

التكرارى النازل و تمثيليهما بيانياً

\* الدرس الثالث : الوسط الحسابى - الوسيط - المنوال

الوحدة الرابعة : متوسطات المثلث و المثلث المتساوى الساقين

\* الدرس الأول : متوسطات المثلث

\* الدرس الثانى : المثلث المتساوى الساقين

\* الدرس الثالث : نظريات المثلث المتساوى الساقين

\* الدرس الرابع : نتائج على نظريات المثلث المتساوى الساقين

الوحدة الخامسة : التباين

\* الدرس الأول : التباين

\* الدرس الثانى : المقارنة بين قياسات زوايا المثلث

\* الدرس الثالث : المقارنة بين أطوال أضلاع المثلث

\* الدرس الرابع : متباينة المثلث

يرجى عدم حذف علم  
يسمح فقط بإعادة النشر  
دون أى تعديل  
لأمانة العلمية

## الوحدة الأولى

## الأعداد الحقيقية

## مراجعة

تذكر : مجموعات الأعداد :

مجموعة أعداد العد :

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

مجموعة الأعداد الطبيعية :

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$$

مجموعة الأعداد الصحيحة :

$$\mathbb{Q} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة :

$$\mathbb{N}^+ = \{ 1, 2, 3, \dots \}$$

$$\mathbb{N}^- = \{ -1, -2, -3, \dots \}$$

$$\mathbb{Q} = \mathbb{N}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

مجموعة الأعداد النسبية :

$$\mathbb{R} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

لاحظ :  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 

و شكل فن المقابل يوضح ذلك



## القيمة المطلقة للعدد النسبي :

القيمة المطلقة للعدد الصحيح  $p$  هي :المسافة بين موقع العدد  $(p)$  و موقع الصفر على خط الأعدادو هي دائماً موجبة ، و يرمز لها بالرمز  $|p|$ 

فمثلاً :

$$|-5| = 5, \quad |0| = 0$$

$$|-5/3| = 5/3, \quad |صفر| = صفر$$

ملاحظة :

$$|s| = 0 \text{ إذا كان } s = 0 \text{ فإن } s = \pm 0$$

## الصورة القياسية للعدد النسبي :

يكون العد النسبي في صورته القياسية إذا كان على الصورة :

$$p \times 10^{-n} \text{ حيث } 1 \leq |p| < 10, n \in \mathbb{N}$$

فمثلاً :

$$102 \dots \dots \dots \times 10^{-5} \text{ هي } 1,02 \times 10^{-5}$$

$$-4,6 \times 10^{-1} \text{ هي } -4,6 \times 10^{-1}$$

## العدد النسبي المربع الكامل :

هو العدد الذي يمكن كتابته على صورة مربع عدد نسبي

أي : ( عدد نسبي )<sup>2</sup>

فمثلاً :

العدد : ٢٥ هو عدد نسبي مربع كامل لأنه يمكن كتابته على

الصورة :  $(٣)^٢$  أو  $(٣-)^٢$ 

ومن أمثلة الأعداد النسبية المربعة الكاملة :

١ ، ٤ ،  $\frac{٩}{١٦}$  ،  $\frac{٢٥}{٣٦}$  ، ٠,٤٦ ، ١,٤٤ ، ....

العدد النسبي المكعب الكامل :

هو العدد الذي يمكن كتابته على صورة مكعب عدد نسبي

أى : ( عدد نسبي )<sup>٣</sup>

فمثلاً :

العدد : ٢٧ هو عدد نسبي مكعب كامل لأنه يمكن كتابته على

الصورة :  $(٣)^٣$  ،

العدد : - ٢٧ هو عدد نسبي مكعب كامل لأنه يمكن كتابته على

الصورة :  $(٣-)^٣$  ،

ومن أمثلة الأعداد النسبية المكعبة الكاملة :

١ ، - ٨ ،  $\frac{٢٧}{١٢٥}$  ، - ٠,٦٤ ، ....

لاحظ الجدول التالي :

العدد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
مربعه	١	٤	٩	١٦	٢٥	٣٦	٤٩	٦٤	٨١	١٠٠
مكعبه	١	٨	٢٧	٦٤	١٢٥	٢١٣	٣٤٣	٥١٢	٧٢٩	١٠٠٠

الجذر التربيعي للعدد النسبي :

الجذر التربيعي للعدد النسبي الموجب p

هو العدد الذى مربعه يساوى p

و يكون : كل عدد نسبي مربع كامل p له جذران تربيعيان

كل منهما معكوس جمعى للأخر أى أن مجموعهما صفر

هما :  $\sqrt{p}$  ،  $-\sqrt{p}$ 

فمثلاً :

العدد : ٢٥ له جذران تربيعيان هما : ٥ ، - ٥

لأن :  $٢٥ = (٥)^٢$  ،  $٢٥ = (-٥)^٢$ 

ملاحظات :

(١)  $\sqrt{١٦}$  يعنى الجذر التربيعي الموجب للعدد : ١٦ ، و هو : ٤(٢)  $\sqrt{\text{صفر}}$  = صفر

(٣) العدد النسبي السالب ليس له جذر تربيعي

فمثلاً :  $(٣-)$  ليس له جذر تربيعي بمعنى أن :  $\sqrt{٣-} \notin \mathbb{Q}$ (٤)  $\sqrt{س} = |س|$ فمثلاً :  $\sqrt{٣} = |٣| = ٣$ ،  $\sqrt{\frac{٢}{٥}} = |\frac{٢}{٥}| = \sqrt{(\frac{٢}{٥})}$ (٥) المعادلة التربيعية :  $س^٢ = p$  لها حلان هما  $\{p-، p\}$ فمثلاً : مجموعة حل المعادلة :  $س^٢ = ٩$  هي :  $\{٣-، ٣\}$ 

(٦) لإيجاد الجذر التربيعي لأي عدد يمكن تحليله إلى عوامله الأولية

، كما يمكن استخدام الآلة الحاسبة



## الدرس الأول : الجذر التكعيبي للعدد النسبي

نعلم أن :

حجم المكعب = طول الحرف × نفسه × نفسه = ( طول الحرف )<sup>٣</sup>  
 فمثلاً :

حجم المكعب الذي طول حرفه ٣ سم  
 $= 3 \times 3 \times 3 = 3^3$  سم<sup>٣</sup>

تعلم :

أما إذا كان : حجم مكعب ٦٤ سم<sup>٣</sup> فإن : إيجاد طول حرفه  
 نبحث عن عدد إذا ضرب في نفسه ثلاث مرات ( أو عدد مكعبه )  
 نحصل على ٦٤

سنجد أنه : ٤ لأن :  $4 \times 4 \times 4 = 64$

و بالتالي يكون : طول حرف المكعب الذي حجمه ٦٤ سم<sup>٣</sup>  
 هو : ٤ سم

يسمى العدد : ٤ الجذر التكعيبي للعدد ٦٤

الجذر التكعيبي لعدد نسبي :

الجذر التكعيبي للعدد النسبي  $p$  هو العدد الذي مكعبه يساوي  $p$   
 ، يرمز للجذر التكعيبي للعدد النسبي  $p$  بالرمز :  $\sqrt[3]{p}$

ملاحظات :

(١) الجذر التكعيبي لعدد نسبي موجب يكون موجباً

فمثلاً :  $0 = \sqrt[3]{125}$ 

(٢) الجذر التكعيبي لعدد نسبي سالب يكون سالباً

فمثلاً :  $-4 = \sqrt[3]{-64}$ (٣)  $\sqrt[3]{\text{صفر}} = \text{صفر}$ (٤)  $\sqrt[3]{-8} = -2$ 

إيجاد الجذر التكعيبي للعدد النسبي المكعب الكامل :

لإيجاد الجذر التكعيبي لأي عدد نسبي يمكن تحليله إلى عوامله الأولية  
 ، كما يمكن استخدام الآلة الحاسبة

فمثلاً :

$$\sqrt[3]{1000} = 10 = 10 \times 10 = 10^3$$

ملاحظات :

(١) العدد النسبي المكعب الكامل :

هو العدد الذي يمكن كتابته على صورة مكعب

عدد نسبي أي : ( عدد نسبي )<sup>٣</sup>

(٢) العدد النسبي المكعب الكامل له جذر تكعيبي واحد

وهو عدد نسبي أيضاً

(٣) إذا كان :  $p$  عدداً مكعباً كاملاً فإن : المعادلة التكعيبية :  $\sqrt[3]{p} = p$ لها حل واحد فقط في  $\mathbb{Q}$  هو :  $p$ فمثلاً : مجموعة حل المعادلة :  $\sqrt[3]{x} = 8$  في  $\mathbb{Q}$  هي :

$$\{ \sqrt[3]{8} \} \text{ أي : } \{ 2 \}$$

(١) أكمل الجدول التالي :

العدد p	٢٧	٨ -	٤
$\sqrt[3]{p}$		٥ -	٦
العدد p	$-\frac{1}{64}$	$-\frac{3}{8}$	
$\sqrt[3]{p}$		-١	$-\frac{1}{4}$

(٢) أكمل ما يلي :

$$.... = \sqrt[3]{27} \quad [1]$$

$$4 = \sqrt[3]{....} \quad [2]$$

$$.... = | \sqrt[3]{120} | \quad [3]$$

$$\sqrt[3]{....} = \sqrt[3]{16} \quad [4]$$

$$\sqrt[3]{....} = \sqrt[3]{8} \quad [5]$$

$$.... = \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{8} \quad [6]$$

$$.... = \sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{9} \quad [7]$$

$$.... = \sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{64} \quad [8]$$

$$0 = .... + \sqrt[3]{64} \quad [9]$$

(٣) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$.... = \sqrt[3]{(8-)} \quad [1]$$

( ٢ - ، ٢ ، ٤ - ، ٤ )

$$.... = \sqrt[3]{(\frac{1}{8}-)} \quad [2]$$

(  $\frac{1}{16}$  ،  $\frac{1}{8}$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{1}{2}$  )

$$.... = \sqrt[3]{-120} + \sqrt[3]{-\frac{3}{8}} \quad [3]$$

( ٢ - ، ٢ ،  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{2}{3}$  )

$$.... = \sqrt[3]{-8} \times \sqrt[3]{1} \quad [4]$$

( ٢ - ، ٢ ، ١٠ ،  $\frac{1}{2}$  )

$$.... = \sqrt[3]{س} \quad [5]$$

( س<sup>٤</sup> ، س<sup>٣</sup> ، س<sup>٢</sup> ، س )

$$.... = \sqrt[3]{س} \quad [6] \text{ إذا كان : س}^3 = 64 \text{ فإن : } \sqrt[3]{س} =$$

( ٢ - ، ٢ ، ٤ - ، ٤ )

(٧) طول حرف المكعب الذي حجمه ٢١٦ سم<sup>٣</sup> يساوي .... سم

( ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ )

(٨) المساحة الجانبية لمكعب حجمه ١٢٥ سم<sup>٣</sup> تساوي .... سم<sup>٢</sup>

( ٢٠ ، ٢٥ ، ١٠٠ ، ١٢٥ )

أحمد التنتوري

(٤) أوجد مجموعة حل المعادلات التالية في  $\mathbb{R}$  :

[٢]	[١]
$٢٠ = ٧ - ٣س$	$\frac{٢٧}{٢٤} = ٣س - \frac{١}{٣}$
[٤]	[٣]
$٦٤ = ٣(٢ - س)$	$٨ = ٧ + ٣س$
[٦]	[٥]
$٣٠ = ٣ + ٣(٢ - س٥)$	$٨ = ٣(س - ١)$

أحمد الشنتوري

(٥) كرة حجمها  $\pi \frac{٣٢}{٨١}$  وحدة مكعبة أوجد طول قطرها( حجم الكرة  $= \frac{٤}{٣} \pi ر^٣$  )

(٦) إذا كان نصف مكعب يساوي ٢٥٦ فما هو العدد ؟

## الدرس الثاني : مجموعة الأعداد غير النسبية ( ٥ ' )

نعلم أن :

العدد النسبي : هو العدد الذي يمكن وضعه على الصورة  $\frac{p}{b}$  حيث :  
 $p, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$

فمثلاً :

عند حل المعادلة :  $4x = 9$  فإن :  $x = \frac{9}{4}$

و يلاحظ أن : كلاً من  $\frac{9}{4}$  ،  $-\frac{9}{4}$  عدد نسبي

و لكن توجد كثير من الأعداد التي لا يمكن وضعها على الصورة  $\frac{p}{b}$  حيث :  
 $p, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$

فمثلاً :

عند حل المعادلة :  $x^2 = 2$

فإنه لا يوجد عدد نسبي مربعه يساوي 2 يكون حلاً للمعادلة

العدد النسبي :

هو العدد الذي لا يمكن وضعه على الصورة  $\frac{p}{b}$  حيث :  
 $p, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$

من أمثلة الأعداد غير النسبية :

(١) الجذور التربيعية للأعداد الموجبة التي ليست مربعات كاملة

مثل :  $\sqrt{3}$  ،  $\sqrt{5}$  ،  $-\sqrt{6}$  ، ....

(٢) الجذور التكعيبية للأعداد التي ليست مكعبات كاملة


مثل :  $\sqrt[3]{2}$  ،  $\sqrt[3]{4}$  ،  $\sqrt[3]{10}$  ، ....

أحمد الشنتوري

(٣) النسبة التقريبية  $\pi$ 

حيث أنه لا يمكن إيجاد قيمة مضبوطة لأي من هذه الأعداد

مثل هذه الأعداد و غيرها تكون مجموعة تسمى مجموعة الأعداد غير النسبية و يرمز لها بالرمز ( ٥ ' )



ملاحظات :

(١)  $\mathbb{Q}$  ،  $\mathbb{Q}'$  منفصلتان أي أن :  $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset$

(٢) مجموعة حل المعادلة في  $\mathbb{Q}'$  :  $x^2 = 2$  هي  $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$

(١) أكمل باستخدام أحد الرمز  $\mathbb{Q}$  أو  $\mathbb{Q}'$  :

[١]  $9 \in \dots$  [٢]  $9 \in \dots$

[٣]  $3 \in \dots$  [٤]  $3 \in \dots$

[٥]  $\pi \in \dots$  [٦]  $\text{صفر} \in \dots$

[٧]  $9 - \sqrt{3} \in \dots$  [٨]  $\sqrt[3]{8} \in \dots$

أحمد الشنتوري

$$[4] \quad 1 = {}^3(2 - s)$$

$$[5] \quad 2 = {}^1(1 - s)$$

$$[4] \quad \text{أوجد طول ضلع المربع الذي مساحته } 6 \text{ سم}^2$$

(5) بسبب الريح كسر الجزء العلوي من شجرة طولها 3 أمتار فصنع مع سطح الأرض زاوية ما ، فإذا كان طول الجزء الثابت فوق الأرض من الشجرة متر واحد أوجد المسافة بين قاعدة الشجرة و نقطة تلاقي قمته مع الأرض

(2) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] العدد غير النسبي من بين الأعداد التالية هو ....

$$(\sqrt{2}, \sqrt[3]{8}, \sqrt{4}, \sqrt[3]{2})$$

[2] العدد النسبي من بين الأعداد التالية هو ....

$$(\sqrt[3]{9}, \sqrt{2}, \sqrt[3]{9}, \sqrt[3]{9})$$

[3] المربع الذي مساحته 1. سم<sup>2</sup> يكون طول ضلعه .... سم

$$(0, 0, \sqrt{1}, -\sqrt{1})$$

[4] المكعب الذي حجمه 2 سم<sup>3</sup> يكون طول حرفه .... سم

$$(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, 0, 0)$$

(3) أوجد قيمة s في كل من مما يلي و بين ما إذا كانت

$$s \in \mathbb{Q} \text{ أم } s \in \mathbb{I} :$$

$$[1] \quad 0 = s^2$$

$$[2] \quad 2 = s^3$$

$$[3] \quad 24 = s^3$$

## الدرس الثالث : إيجاد قيمة تقريبية للعدد غير النسبي

تمهيد :

- (١) الأعداد : ١ ، ٤ ، ٩ ، .... كل منها مربع كامل  
و بأخذ الجذر التربيعي لها تكون : ١ ، ٢ ، ٣ ، ....  
ونلاحظ أن : ٢ يقع بين ١ ، ٤ و بالتالي يكون :  
 $\sqrt{2}$  يقع بين ١ ، ٢ أي أن :  $\sqrt{2} = 1 + \text{كسر عشري}$   
،  $\sqrt{5}$  يقع بين ٢ ، ٣ أي أن :  $\sqrt{5} = 2 + \text{كسر عشري}$   
، ..... و هكذا
- (٢) الأعداد : ١ ، ٨ ، ٢٧ ، .... كل منها مكعب كامل  
و بأخذ الجذر التكعيبي لها تكون : ١ ، ٢ ، ٣ ، ....  
ونلاحظ أن : ٣ يقع بين ١ ، ٨ و بالتالي يكون :  
 $\sqrt[3]{3}$  يقع بين ١ ، ٢ أي أن :  $\sqrt[3]{3} = 1 + \text{كسر عشري}$   
،  $\sqrt[3]{10}$  يقع بين ٢ ، ٣ أي أن :  $\sqrt[3]{10} = 2 + \text{كسر عشري}$   
، ..... و هكذا

(١) أكمل ما يلي بعددين صحيحين متتاليين ينحصر بينهما العدد :

[١]  $\sqrt{12}$  العددين هما : .... ، ....

[٢]  $\sqrt{29}$  العددين هما : .... ، ....

[٣]  $\sqrt[3]{9}$  العددين هما : .... ، ....

[٤]  $\sqrt[3]{10}$  العددين هما : .... ، ....

أحمد الشنتوري

إيجاد قيمة تقريبية للعدد غير النسبي :

تستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة تقريبية للعدد غير النسبي

فمثلاً : نجد :  $\sqrt{2} = 1,4142....$  ، ..... و هكذا

ويمكن إيجاد قيمة تقريبية للعدد غير النسبي دون استخدام الآلة الحاسبة

فمثلاً : يمكن إيجاد تقريبية للعدد :  $\sqrt{2}$  كما يلي :

نلاحظ أن : ٢ ينحصر بين العددين ١ ، ٤ ( كل منهما مربع كامل )

أي أن :  $1 < \sqrt{2} < 2$  بأخذ الجذر التربيعي للأطراف∴  $1 < \sqrt{2} < 2$  أي أن :  $\sqrt{2} = 1 + \text{كسر عشري}$ 

و بفحص قيم الأعداد : ( ١,١ ) ، ( ١,٢ ) ، ( ١,٣ ) ، ( ١,٤ )

، ( ١,٥ ) نجد : ( ١,١ ) ، ( ١,٢ ) ، ( ١,٣ ) ، ( ١,٤ ) ، ( ١,٥ )

، ( ١,٦ ) ، ( ١,٧ ) ، ( ١,٨ ) ، ( ١,٩ ) ، ( ١,١٠ )

، ( ١,١١ ) ، ( ١,١٢ ) ، ( ١,١٣ ) ، ( ١,١٤ ) ، ( ١,١٥ )

، ∴  $1,96 < \sqrt{2} < 2,25$  و بأخذ الجذر التربيعي∴  $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$  ∴ ينحصر بين ١,٤ ، ١,٥∴  $\sqrt{2} = 1,4$  لأقرب جزء من عشرة

و لإيجاد قيمة تقريبية أدق لرقمين عشريين نلاحظ أن :

 $\sqrt{2} = 1,4 + \text{كسر عشري}$  ، و نجد :

( ١,٤١ ) ، ( ١,٤٢ ) ، ( ١,٤٣ ) ، ( ١,٤٤ ) ، ( ١,٤٥ )

∴  $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$  ∴ ينحصر بين ١,٤١ ، ١,٤٢∴  $\sqrt{2} = 1,41$  لأقرب جزء من مائة ، ..... و هكذا

أحمد الشنتوري

و يمكن استخدام الآلة الحاسبة للتأكد من صحة الإجابة

(٢) [1] أوجد لأقرب جزء من عشرة قيمة  $\sqrt{0}$

[2] أوجد لأقرب جزء من مائة قيمة  $\sqrt{11}$

[3] أوجد لأقرب جزء من عشرة قيمة  $\sqrt[3]{2}$

(٣) أوجد قيمة  $s$  في كل مما يلي حيث  $s \in \mathbb{R}^+$  :

[1]  $s > \sqrt{7} > s + 1$  ،  $s = \dots$

[2]  $s > \sqrt{21} > s + 1$  ،  $s = \dots$

[3]  $s > \sqrt{80} > s + 1$  ،  $s = \dots$

[4]  $s > \sqrt[3]{5} > s + 1$  ،  $s = \dots$

[5]  $s > \sqrt[3]{30} > s + 1$  ،  $s = \dots$

[6]  $s > \sqrt[3]{100} > s + 1$  ،  $s = \dots$

(٤) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] العدد غير النسبي المحصور بين ٢ ، ٣ هو ....

(  $\sqrt{10}$  ،  $\sqrt{7}$  ،  $\sqrt{3}$  ،  $0,2$  )

[2] العدد غير النسبي المحصور بين -٢ ، -١ هو ....

(  $-\sqrt{3}$  ،  $-1,0$  ،  $-3$  ،  $-\sqrt{2}$  )

[3]  $\sqrt{10} = \dots$

(  $3,2 -$  ،  $3,99$  ،  $3$  ،  $3,17$  )

[4] أقرب عدد صحيح للعدد  $\sqrt[3]{20}$  هو ....

(  $0$  ،  $4$  ،  $3$  ،  $2$  )

أحمد الشنتوري

ملاحظات :

$$(1) \sqrt[n]{s} = \sqrt[n]{s} = \sqrt[n]{s} \times \sqrt[n]{s} \times \dots \times \sqrt[n]{s} \text{ حيث : } s < .$$

$$\text{فمثلاً : } \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{3} , \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} ,$$

$$0 = \sqrt[3]{0} \times \sqrt[3]{0} \times \sqrt[3]{0} , \dots \text{ وهكذا}$$

$$(2) \sqrt[n]{s} = \sqrt[n]{s} = \sqrt[n]{s} \times \sqrt[n]{s} \times \sqrt[n]{s} \times \dots \times \sqrt[n]{s}$$

$$\text{فمثلاً : } \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{8} , \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} ,$$

$$0 = \sqrt[3]{0} \times \sqrt[3]{0} \times \sqrt[3]{0} , \dots \text{ وهكذا}$$

(٣) كل عدد غير نسبي تقع قيمته بين عددين نسبيين

فمثلاً : لأثبت أن :

$$[1] \sqrt[3]{3} \text{ ينحصر بين } 1,7 \text{ ، } 1,8 \text{ نتبع ما يلي :}$$

$$\therefore \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{3} = (\sqrt[3]{3})^3$$

$$(\sqrt[3]{3})^3 = 3, \quad (\sqrt[3]{1,7})^3 = 1,7^3 = 4,913 , \quad (\sqrt[3]{1,8})^3 = 1,8^3 = 5,832$$

$$\therefore 4,913 < 3 < 5,832 \quad \therefore \sqrt[3]{1,7} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[3]{1,8}$$

$$\therefore 1,7 < \sqrt[3]{3} < 1,8$$

$$\text{أي أن : } \sqrt[3]{3} \text{ ينحصر بين } 1,7 \text{ ، } 1,8$$

$$[2] \sqrt[3]{10} \text{ ينحصر بين } 2,4 \text{ ، } 2,5 \text{ نتبع ما يلي :}$$

$$\therefore \sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{10} \times \sqrt[3]{10} \times \sqrt[3]{10} = (\sqrt[3]{10})^3$$

$$(\sqrt[3]{10})^3 = 10, \quad (\sqrt[3]{2,4})^3 = 2,4^3 = 13,824 , \quad (\sqrt[3]{2,5})^3 = 2,5^3 = 15,625$$

$$\therefore 13,824 < 10 < 15,625 \quad \therefore \sqrt[3]{2,4} < \sqrt[3]{10} < \sqrt[3]{2,5}$$

$$\therefore 2,4 < \sqrt[3]{10} < 2,5$$

$$\text{أي أن : } \sqrt[3]{10} \text{ ينحصر بين } 2,4 \text{ ، } 2,5$$

(٥) أثبت أن :

$$[1] \sqrt[3]{0} \text{ ينحصر بين } 2,23 \text{ ، } 2,24$$

$$[2] \sqrt[3]{11} \text{ ينحصر بين } 2,22 \text{ ، } 2,23$$

أحمد الشنتوري



يمكن بنفس فتحة الفرجار تحديد نقطة  $\sqrt{s}$  التى تمثل العدد  $-\sqrt{0}$  حيث  $\sqrt{s}$  تقع على يسار النقطة و

ملاحظات :

- (١) كل عدد غير نسبي يمكن تمثيله بنقطة على خط الأعداد
- (٢) لتمثيل العدد :  $1 + \sqrt{0}$  نتبع نفس الخطوات السابقة ، لكن نركز سن الفرجار فى النقطة التى تمثل العدد ١ ، ..... و هكذا

(٦) [١] ارسم خط الأعداد و حدد النقطة التى تمثل العدد  $\sqrt{3}$

[٢] ارسم خط الأعداد و حدد النقطة التى تمثل العدد  $-\sqrt{7}$

تمثيل العدد غير النسبي ( على الصورة  $\sqrt{s}$  ) على خط الأعداد :

توجد عدة طرق لتمثيل العدد غير النسبي على الصورة  $\sqrt{s}$  منها الطريقة التالية :

تعتمد هذه الطريقة على رسم مثلث قائم الزاوية بحيث يكون  $\sqrt{s}$  طول أحد ضلعي القائمة ويكون : طول الوتر =  $\frac{1}{r} (1 + \sqrt{s})$  ، طول الضلع الآخر للقائمة =  $\frac{1}{r} (1 - \sqrt{s})$  ،

فمثلاً : لتمثيل العدد  $\sqrt{0}$

(١) نوجد : طول الوتر =  $\frac{1}{r} (1 + 0) = 3$

، طول الضلع الآخر للقائمة =  $\frac{1}{r} (1 - 0) = 2$  ،

(٢) نرسم خط الأعداد ،

و من نقطة (و) نقيم عمود طوله ٢ وحدة طول

يصل لنقطة م

(٣) نركز بسن الفرجار

عند نقطة م و بفتحة طولها ٣ وحدة طول نرسم قوساً

يقطع خط الأعداد س على يمين نقطة (و) فيكون :

$$(و س) = (س م) - (و م) = (٣) - (٢) = ١$$

∴ و س =  $\sqrt{0}$  وحدة طول

و تكون نقطة س هى التى تمثل العدد  $\sqrt{0}$

[٣] ارسم خط الأعداد و حدد النقطة التي تمثل العدد  $1 - \sqrt{6}$

(٨) أوجد كلاً من طول ضلع و طول قطر مربع مساحته ١٠ سم<sup>٢</sup>

[٤] ارسم خط الأعداد و حدد النقطة التي تمثل العدد  $1 + \sqrt{5}$

(٧) ارسم  $\triangle PQR$  القائم الزاوية في  $P$  ، و الذي فيه  $PQ = 3$  سم ،  $PR = 4$  سم و استخدم الشكل في تحديد النقطة التي تمثل العدد  $\sqrt{13}$  على خط الأعداد

(٩) دائرة محيطها  $2\sqrt{5}\pi$  سم أوجد مساحة سطحها


أحمد الشنتوري

الدرس الرابع : مجموعة الأعداد الحقيقية  $\mathbb{R}$ 

## مجموعة الأعداد الحقيقية :

هي المجموعة الناتجة من اتحاد مجموعة الأعداد النسبية و مجموعة الأعداد غير النسبية ويرمز لها بالرمز  $\mathbb{R}$

أي أن :  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$   
كما بالشكل المقابل



و شكل فن المقابل يوضح :


$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$

(٢) أي عدد طبيعي أو صحيح

أو نسبي أو غير نسبي  
هو عدد حقيقي أي أن :

$$\mathbb{R} \supset \mathbb{Q} \supset \mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$$

(٣) كل عدد حقيقي تمثله نقطة واحدة على خط الأعداد



و يلاحظ :

(١) العدد صفر تمثله نقطة الأصل و

(٢) الأعداد الحقيقية الموجبة تمثلها جميع نقط خط الأعداد على يمين و

(٣) الأعداد الحقيقية الموجبة تمثلها جميع نقط خط الأعداد على يمين و

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^+$$

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

$$\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^- \cup \{0\}$$

$$\mathbb{R} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^- \cup \{0\}$$

$$\mathbb{R} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$$

$$\sqrt[3]{1-x} = 1-x \quad \text{لأن} \quad 1-x = (1-x) \times (1-x) \times (1-x)$$

بينما  $\sqrt{1-x} \notin \mathbb{R}$  لأنه لا يوجد عدد حقيقي إذا ضرب في نفسه كان الناتج - ١

(٩) يرمز للأعداد الحقيقية بدون الصفر بالرمز  $\mathbb{R}^*$

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$$

(١) أكمل ما يلي :

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^-$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^-$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^-$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^-$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R} - \{0\}$$

(٢) أكمل الجدول التالي بوضع علامة (✓) في المكان المناسب كما في الحالة الأولى :

العدد	عدد طبيعي	عدد صحيح	عدد نسبي	عدد غير نسبي	عدد حقيقي
0	✓	✓	✓	x	✓
$-\frac{1}{2}$					
$\sqrt{2}$					
$ 7-1 $					
$\sqrt[3]{4}$					
1,3					
$-\sqrt[3]{3}$					
$\sqrt{9-}$					
$\sqrt[3]{8-}$					

أحمد الشنتوري

(٣) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1]  $\mathbb{C} = \dots$

(  $\mathbb{Q} \cup \mathbb{R}$  ،  $\mathbb{Q} \cup \mathbb{C}$  ،  $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$  ،  $\mathbb{Q} \cup \mathbb{R}$  )

[2]  $\{s : s \in \mathbb{C}, s > 0\} = \dots$

(  $\mathbb{C}$  ،  $\mathbb{R}$  ،  $\mathbb{Q}$  ،  $\mathbb{I}$  )

[3] إذا كان :  $s$  عدداً حقيقياً سالباً فالعدد الذي يمثل عدداً موجباً من الأعداد التالية ....

(  $s^3$  ،  $s^2$  ،  $s$  ،  $\frac{1}{s}$  )

[4] إذا كان :  $\frac{1}{p}$  ،  $\frac{p}{0}$  عددين حقيقيين بين صفر ، 1

فإن :  $p = \dots$

(  $-2$  ،  $1$  ،  $\sqrt{0}$  ،  $2$  )

(٤) ضع الأعداد التالية في

أماكنها المناسبة في شكل فن المقابل


$-\sqrt{2}$  ،  $\sqrt{2}$  ،

$\pi$  ،  $0,2$  ،

$-\sqrt[3]{1}$  ،  $\sqrt[3]{2}$  ،

$\sqrt[3]{12}$  ،  $3$  ،

صفر ،



## الدرس الخامس : علاقة الترتيب في ح

إذا كانت :  $m$  ،  $n$  نقطتان تنتميان للمستقيم  $L$  فإنه وفق اتجاه السهم بالشكل المقابل يكون :  
 $m$  تلي  $n$  أي تكون على يمينها ،

$m$  تسبق  $n$  أي تكون على يسارها  
 و هكذا بالنسبة لجميع نقاط الخط المستقيم ، فإذا علمنا أن كل نقطة من  
 نقط الخط المستقيم تمثل عدداً حقيقياً فإننا نقول أن :  
 مجموعة الأعداد الحقيقية مجموعة مرتبة

## خواص الترتيب :

<b>١</b> إذا كان : $m, n$ عددين حقيقيين يمثلهما على خط الأعداد النقطتان $m, n$ ، $n$ على الترتيب فإن :		
<b>١</b> $m$ تنطبق على $n$	<b>٢</b> $m$ تسبق $n$	<b>٣</b> $m$ تلي $n$
$m = n$	$m < n$	$m < n$

أحمد الشنتوري

<b>٢</b> إذا كان : $m$ عدداً حقيقياً تمثله على خط الأعداد النقطة $m$ ، و هي نقطة الأصل التي تمثل العدد صفر فإن :		
<b>١</b> $m$ تنطبق على $n$	<b>٢</b> $m$ تقع على يمين $n$	<b>٣</b> $m$ تقع على يسار $n$
$m = n$	$m > n$	$m < n$

أحمد الشنتوري

## فمثلاً :

لترتيب الأعداد :  $\sqrt{9}$  ،  $3$  ،  $\sqrt{11}$  ،  $\sqrt{8}-3$  نتبع ما يلي :

$$\sqrt{9} = 3 \quad , \quad \sqrt{8}-3 = 2-3 = -1$$

و يكون الترتيب التصاعدي من الأصغر إلى الأكبر هو :

$$\sqrt{8}-3 \quad , \quad \sqrt{9} \quad , \quad \sqrt{11} \quad , \quad 3$$

أي :

$$\sqrt{8}-3 \quad , \quad \sqrt{9} \quad , \quad \sqrt{11} \quad , \quad 3$$

(١) رتب الأعداد تصاعدياً :

$$\sqrt[3]{1-}, \sqrt[3]{27}, 1, \sqrt[3]{20}, \sqrt[3]{-}$$

(٣) ضع العلامة المناسبة ( &gt; , = , &lt; ) :

$$\sqrt[3]{8} \dots \sqrt[3]{2} \quad [1] \quad \sqrt[3]{7} \dots 2$$

$$\sqrt[3]{0} \dots \sqrt[3]{2} + 1 \quad [4] \quad 3 - \dots \sqrt[3]{24} \quad [3]$$

$$1 - \sqrt[3]{2} \dots \sqrt[3]{2} - 1 \quad [6] \quad \sqrt[3]{0} - 3 \dots \sqrt[3]{1-} \quad [5]$$

(٤) إذا كانت :  $s \in \mathbb{R}$  فاذكر ما إذا كانت  $s$  موجبة أم سالبة  
في كل من الحالات التالية :

$$[1] \quad s < 0 \quad [2] \quad s > 0$$

$$[3] \quad s < |4 -| \quad [4] \quad 2 - > s > 0$$

$$[5] \quad |0 -| > s > 7 \quad [6] \quad |1 -| > s > |7 -|$$

(٥) أكتب عدد نسبي و أربعة أعداد غير نسبية تنحصر بين 0 ، 7

(٢) رتب الأعداد تنازلياً :

$$\sqrt[3]{27-}, \sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{-7}, \sqrt[3]{10}, \sqrt[3]{-11}$$

(٦) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن :  $\sqrt[3]{2} < \sqrt[3]{3}$

## الدرس السادس : الفترات

تمهيد :

نعلم أن : يمكن التعبير عن المجموعة :

 $S =$  مجموعة الأعداد الصحيحة الأكبر من  $-1$  و الأقل من  $0$ 

بطريقة الصفة المميزة كما يلي :

 $S = \{ p : p \in \mathbb{Z}, -1 < p < 0 \}$ 

، بطريقة السرد كما يلي :

 $S = \{ -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$ 

، تمثل على خط الأعداد كما بالشكل :

لاحظ أن : عناصر المجموعة  $S$  تمثل بنقط منفصلة أما المجموعة : $E =$  مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من  $-1$  و الأقل من  $0$ 

فيمكن التعبير عنها بطريقة الصفة المميزة كما يلي :

 $E = \{ p : p \in \mathbb{R}, -1 < p < 0 \}$ 

و لكن لا يمكن التعبير عنها بطريقة السرد لأنه يوجد بين كل عددين حقيقيين عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية بعضها أعداد نسبية و

البعض الآخر أعداد غير نسبية

و بالتالي لا يمكن تمثيلها على خط الأعداد كما سبق

لاحظ أن : عناصر المجموعة  $E$  يجب أن تمثل بنقط متصلةلذا تستخدم طريقة أخرى للتعبير عن المجموعة  $E$  تسمى الفترة :

الفترة :

هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية

أحمد الشنتوري

أولاً : الفترات المحدودة

إذا كان :  $p, b \in \mathbb{R}, p < b$  فإننا نعرف كلاً من :(١) الفترة المغلقة  $[p, b]$  $[p, b] = \{ s : s \in \mathbb{R}, p \leq s \leq b \}$ عناصرها  $p, b$  و جميع الأعداد الحقيقية بينهماتوضع دائرة مظللة عند كل من النقطتين الممثلتين للعددين  $p, b$  و تظل المنطقة بينهما على خط الأعدادو يلاحظ :  $p \in [p, b], b \in [p, b]$ (٢) الفترة المفتوحة  $(p, b)$  $(p, b) = \{ s : s \in \mathbb{R}, p < s < b \}$ عناصرها جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين  $p, b$ توضع دائرة مفتوحة عند كل من النقطتين الممثلتين للعددين  $p, b$  و تظل المنطقة بينهما على خط الأعدادو يلاحظ :  $p \notin (p, b), b \notin (p, b)$ (٣) الفترة نصف المفتوحة (أو نصف المغلقة)  $[p, b)$  $[p, b) = \{ s : s \in \mathbb{R}, p \leq s < b \}$ عناصرها العدد  $p$  ، و جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين  $p, b$ توضع دائرة مغلقة عند النقطة الممثلة للعدد  $p$  ، و دائرة مفتوحة عند النقطة الممثلة للعدد  $b$  و تظل المنطقة بينهما على خط الأعدادو يلاحظ :  $p \in [p, b), b \notin [p, b)$ 

أحمد الشنتوري

(٢) أكتب المجموعات التالية على صورة فترة و مثلها على خط الأعداد :

$$[1] \quad \{s : s \in \mathbb{R}, -4 \leq s \leq 4\} = \sim$$

$$[2] \quad \{s : s \in \mathbb{R}, 0 \leq s < 1\} = \sim$$

(٣) ضع الرمز المناسب  $\supset$  أو  $\subset$  أو  $\cap$  أو  $\cup$  :

$$[1] \quad \sqrt{2} \dots [1, 2]$$

$$[2] \quad \sqrt[3]{3} \dots [-2, 1]$$

$$[3] \quad 4 \dots [-4, 4]$$

$$[4] \quad 0 \dots [-5, 3]$$

$$[5] \quad |0| \dots [4, 6]$$

$$[6] \quad \{7, 2\} \dots [2, 7]$$

$$[7] \quad \{7, 2\} \dots [2, 7]$$

$$[8] \quad [0, 3] \dots [2, 5]$$

$$[9] \quad [2, 1] \dots [-3, 3]$$

$$[2] \quad [p, b] = \{s : s \in \mathbb{R}, p < s \leq b\}$$

عناصرها العدد  $b$  ، وجميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين  $p$  ،  $b$  .  
توضع دائرة مفتوحة عند النقطة الممثلة للعدد  $p$  ، و دائرة مغلقة عند النقطة الممثلة للعدد  $b$  و تظل المنطقة بينهما على خط الأعداد و يلاحظ :  $p \notin [p, b]$  ،  $b \in [p, b]$

فمثلاً :

(١) الفترة  $[-2, 3]$  تكتب بطريقة الصفة المميزة كما يلي :

$$[-2, 3] = \{s : s \in \mathbb{R}, -2 \leq s \leq 3\}$$

و تمثل على خط الأعداد كما بالشكل المقابل

$$[2] \quad \{s : s \in \mathbb{R}, 1 < s \leq 6\} = \sim$$

تكتب على صورة كما يلي :  $\sim = [1, 6]$

و تمثل على خط الأعداد كما بالشكل المقابل

(١) أكتب الفترات التالية بطريقة الصفة المميزة و مثلها على خط الأعداد :

$$[1] \quad [-3, 4]$$

$$[2] \quad [2, 7]$$



## ثانياً : الفترات غير المحدودة

نعلم أن خط الأعداد مهما أمتد من جهتيه فإنه يوجد أعداد حقيقية موجبة من جهة اليمين و أعداد سالبة من جهة اليسار تقع على هذا الخط لذا فإنه :

١ الرمز  $\infty$  يقرأ ( لانهاية ) و يعنى أنه أكبر من أى عدد حقيقى يمكن تصوره ،  $\infty \notin \mathbb{R}$

٢ الرمز  $-\infty$  يقرأ ( سالب لانهاية ) و يعنى أنه أصغر من أى عدد حقيقى يمكن تصوره ،  $-\infty \notin \mathbb{R}$

٣ الرمز  $\infty$  ،  $-\infty$  لا توجد نقط تمثلهما على خط الأعداد الحقيقية ، و هما امتداد لخط الأعداد من جهتيه



و إذا كان :  $p \in \mathbb{R}$  فإننا نعرف كلاً من :

$$(1) \quad \{s : s \in \mathbb{R}, s \leq p\} = ]-\infty, p]$$

و هى تعبر عن العدد  $p$   
و جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من  $p$   
و يلاحظ أن :  $p \in ]-\infty, p]$

$$(2) \quad \{s : s \in \mathbb{R}, s < p\} = ]-\infty, p[$$

و هى تعبر عن جميع الأعداد  
الحقيقية الأكبر من  $p$   
و يلاحظ أن :  $p \notin ]-\infty, p[$

$$(3) \quad \{s : s \in \mathbb{R}, s \geq p\} = [p, \infty[$$

و هى تعبر عن العدد  $p$   
و جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من  $p$   
و يلاحظ أن :  $p \in [p, \infty[$

$$(4) \quad \{s : s \in \mathbb{R}, s > p\} = ]p, \infty[$$

و هى تعبر عن جميع الأعداد  
الحقيقية الأكبر من  $p$   
و يلاحظ أن :  $p \notin ]p, \infty[$

## ملاحظات :

$$(1) \quad \text{مجموعة الأعداد الحقيقية } \mathbb{R} = ]-\infty, \infty[$$

$$(2) \quad \text{مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة } \mathbb{R}_+ = ]0, \infty[$$

$$(3) \quad \text{مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة } \mathbb{R}_- = ]-\infty, 0]$$

$$(4) \quad \text{مجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة } = ]0, \infty[$$

$$(5) \quad \text{مجموعة الأعداد الحقيقية غير الموجبة } = ]-\infty, 0]$$

(٤) أكتب الفترات التالية بطريقة الصفة المميزة و مثلها على خط الأعداد :

$$(1) \quad ]-\infty, 4[$$

$$(2) \quad ]-\infty, 2[$$

(٥) أكتب المجموعات التالية على صورة فترة و مثلها على خط الأعداد :

$$[1] \quad S = \{s : s \in \mathbb{R}, s \leq 4\}$$

$$[2] \quad S = \{s : s \in \mathbb{R}, s > 1\}$$

(٦) ضع الرمز المناسب  $\supset$  أو  $\subset$  أو  $\supsetneq$  أو  $\subsetneq$  :

$$[1] \quad \mathbb{R} \supset [4, \infty)$$

$$[2] \quad \mathbb{R} \supset [4, \infty)$$

$$[3] \quad \mathbb{R} \supset [4, \infty)$$

$$[4] \quad \mathbb{R} \supset [0, \infty)$$

$$[5] \quad \mathbb{R} \supset [0, \infty)$$

$$[6] \quad \mathbb{R} \supset [3, 0]$$

$$[7] \quad \mathbb{R} \supset [1, 3]$$

$$[8] \quad \mathbb{R} \supset [1, 2]$$

$$[9] \quad \mathbb{R} \supset [1, 2]$$

العمليات على الفترات :

تذكر :

العمليات على المجموعات :

(١) تقاطع مجموعتين :

هو مجموعة جميع العناصر المشتركة بين المجموعتين

(٢) اتحاد مجموعتين :

هو مجموعة تحوي جميع العناصر الموجودة في المجموعتين أو كليهما

(٣) مجموعة الفرق بين المجموعتين  $S$  ،  $V$  :

هي مجموعة العناصر التي تنتمي للمجموعة  $S$  ولا تنتمي

للمجموعة  $V$  ويرمز لها بالرمز  $S - V$

(٤) مكمل المجموعة  $S$  بالنسبة للمجموعة  $S$  :

هي مجموعة العناصر التي تنتمي للمجموعة  $S$  ولا تنتمي

للمجموعة  $S$  ويرمز لها بالرمز  $S'$

فمثلاً :

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = S$$

$$S = \{1, 2, 3\}, V = \{2, 3, 5\} \text{ فإن :}$$

$$[1] \quad S \cap V = \{2, 3\}$$

$$[2] \quad S \cup V = \{1, 2, 3, 5, 6\}$$

$$[3] \quad S - V = \{1, 4\}$$

$$[4] \quad V - S = \{2, 3, 5\}$$

$$[5] \quad S' = \{5, 6\}$$

$$[6] \quad V' = \{1, 4, 6\}$$

أحمد الشنتوري

## العمليات على الفترات :

حيث أن الفترات هي مجموعات جزئية من الأعداد الحقيقية فإنه يمكن إجراء عمليات التقاطع و الاتحاد و الفرق و المكمل عليها  
فمثلاً :

(١) إذا كانت :  $\text{س} = [٤, ١ -]$  ،  $\text{ص} = [١, ٣ -]$  فإن :

$$\text{س} \cap \text{ص} = [١, ١ -] = \text{س} \cap \text{ص}$$

$$\text{س} \cup \text{ص} = [٤, ٣ -] = \text{س} \cup \text{ص}$$

$$\text{س} - \text{ص} = [٤, ١ [ = \text{س} - \text{ص}$$

$$\text{ص} - \text{س} = [١, ٣ -] = \text{ص} - \text{س}$$

(٢) إذا كانت :  $\text{س} = [١, \infty -]$  فإن :

$$\text{س}' = ]١, \infty -[ = \text{س}'$$

(٣) إذا كانت :  $\text{س} = [٥, ٢]$  ،  $\text{ص} = [١, ٣ -]$  فإن :

$$\text{س} \cap \text{ص} = \emptyset$$

لاحظ أن :

$\text{س}$  ،  $\text{ص}$  متباعدتان

(٧) إذا كانت :  $\text{س} = [٣, ٢ -]$  ،  $\text{ص} = [٠, ٤ -]$

أوجد مستعيناً بخط الأعداد كلاً من :

[١]  $\text{س} \cap \text{ص} = \dots$

[٢]  $\text{س} \cup \text{ص} = \dots$

[٣]  $\text{س} - \text{ص} = \dots$

[٤]  $\text{ص} - \text{س} = \dots$

(٨) إذا كانت :  $\text{س} = [٣, \infty -]$  ،  $\text{ص} = [٤, \infty -]$

أوجد مستعيناً بخط الأعداد كلاً من :

[١]  $\text{س} \cap \text{ص} = \dots$

[٢]  $\text{س} \cup \text{ص} = \dots$

[٣]  $\text{س}' = \dots$

[٤]  $\text{ص}' = \dots$

(٩) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$[1] \quad \dots = \{3\} - [0, 3]$$

$$([0, 3], [0, 3], [0, 3[, [0, 3[)$$

$$[2] \quad \dots = \{0, 3\} - [0, 3]$$

$$([0, 3], [0, 3], [0, 3[, [0, 3[)$$

$$[3] \quad \dots = ]0, 3[ - [0, 3]$$

$$(\{0, 3\}, \{3\}, [0, 3[, \emptyset)$$

$$[4] \quad \dots = [4, 1] \cup ]1, 1 - [$$

$$(\emptyset, [4, 1 - [, [4, 1 - [, ]4, 1 - [)$$

$$[5] \quad \dots = [4, 2[ \cap ]1, 1 - [$$

$$(\emptyset, ]2, 1 - [, [4, 1 - [, ]2, 1 - [)$$

$$[6] \quad \dots = ]1, 4 - [ \cap ]1, 4 - [$$

$$(\emptyset, [1, 0[, [4, 1 - [, ]1, 4 - [)$$

$$[7] \quad \dots = ]\infty, 3[ = ]\infty, 3[ \text{ فإن : } \dots = ]\infty, 3[$$

$$([3, \infty[, [3, \infty[, ]3, \infty[, ]3, \infty[)$$

$$[8] \quad \dots = ]\infty, 3[ \text{ فإن : } ]4, 3[ = [7, 2] \cap ]\infty, 3[$$

$$([4, 2[, [7, 3], [7, 2], ]4, 3[)$$

$$[9] \quad \text{مجموع الأعداد الحقيقية في } ]1, 1 - [ \text{ هو } \dots$$

$$(-1, 1, 2, \text{ صفر})$$

(١٠) أكمل ما يلي :

$$[1] \quad \text{إذا كانت : } s \in [9, 1] \text{ فإن : } \sqrt{s} \in \dots$$

$$[2] \quad \text{إذا كانت : } s \in [3, 2 - ] \text{ فإن : } s' \in \dots$$

$$[3] \quad \text{إذا كانت : } s' \in [4, 0] \text{ فإن : } s^3 \in \dots$$

$$[4] \quad \text{إذا كان : } s \in ]1, 4 - [ \text{ وكان : } s < s' \text{ فإن : } s \in \dots$$

$$[5] \quad \text{إذا كانت : } s \in 2 + [4, 1] \text{ فإن : } 2s \in \dots$$

$$[11] \quad \text{إذا كان : } s \cap s' = [7, 4], s \cup s' = [7, 3]$$

$$s \supset s' \text{ فأوجد : } s, s', s - s'$$

$$[12] \quad \text{إذا كان : } s \cap s' = [4, 2], s \cup s' = [6, 1]$$

$$s - s' = [6, 4] \text{ فأوجد : } s, s'$$

## الدرس السابع : العمليات على الأعداد الحقيقية

أولاً : جمع الأعداد الحقيقية :

تمهيد : نعلم أن :

(١)  $٣ س ، ٤ س$  حدان جبريان متشابهان

مجموعهما هو حد جبري مشابه لهما

أي :  $٣ س + ٤ س = (٣ + ٤) س = ٧ س$ 

بالمثل يمكن استنتاج أن :

$$\sqrt[٢]{٧} = \sqrt[٢]{(٣ + ٤)} = \sqrt[٢]{٣} + \sqrt[٢]{٤}$$

لاحظ أن :

العدد الحقيقي  $\sqrt[٢]{٣}$  ينتج من حاصل ضرب العدد النسبي ٣في العدد غير النسبي  $\sqrt[٢]{١}$ (٢)  $٣ س ، ٤ ص$  حدان جبريان غير متشابهينمجموعهما هو مقدار جبري أبسط صورة له هي :  $٣ س + ٢ ص$ بالمثل : العددان الحقيقيين  $\sqrt[٢]{٣} ، \sqrt[٢]{٤}$  مجموعهما هوعد حقيقي أبسط صورة له هي :  $\sqrt[٢]{٣} + \sqrt[٢]{٤}$ 

(١) أوجد ناتج :

$$[١] \quad \dots = \sqrt[٥]{٥} + \sqrt[٥]{٤} - \sqrt[٥]{٣}$$

$$[٢] \quad \dots = \sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٢]{٥} + \sqrt[٢]{١} - \sqrt[٣]{١}$$

خواص جمع الأعداد الحقيقية :

[١] الانغلاق :

إذا كان :  $٢ ، ٣$  ،  $٣ \in \mathbb{R}$  يكون :  $(٢ + ٣) \in \mathbb{R}$ 

أي أن : مجموع أي عددين حقيقيين هو عدد حقيقي

وبالتالي :  $\mathbb{R}$  مغلقة تحت عملية الجمع

فمثلاً :

ناتج جمع كل من  $٣ + ٤ ، ٧ + \sqrt[٢]{٢}$  هو عدد حقيقي

[٢] الإبدال :

إذا كان :  $٢ ، ٣$  ،  $٣ \in \mathbb{R}$  فإن :  $٢ + ٣ = ٣ + ٢$ أي أن : عملية الجمع إبدالية في  $\mathbb{R}$ 

فمثلاً :

$$٧ + \sqrt[٢]{٢} = \sqrt[٢]{٢} + ٧$$

[٣] الدمج :

إذا كان :  $٢ ، ٣ ، ٤$  ،  $٤ \in \mathbb{R}$  يكون :

$$(٢ + ٣) + ٤ = (٢ + ٤) + ٣ = ٢ + (٣ + ٤)$$

فمثلاً :

$$\text{الدمج} \quad (٤ + \sqrt[٢]{٢}) + ٣ = ٤ + (\sqrt[٢]{٢} + ٣)$$

$$\text{الإبدال} \quad (\sqrt[٢]{٢} + ٤) + ٣ =$$

$$\text{الدمج} \quad \sqrt[٢]{٢} + (٤ + ٣) =$$

$$\sqrt[٢]{٢} + ٧ =$$

[٤] العنصر المحايد الجمعي :

الصفر هو المحايد الجمعي في  $\mathbb{R}$  لأن :  $٢ = ٢ + ٠ = ٠ + ٢$ 

أحمد الشنتوري

فمثلاً :

$$\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3} + 0 = 0 + \sqrt[3]{3}$$

[٥] وجود معكوس جمعي لكل عد حقيقي :

لكل  $p \in \mathbb{R}$  يوجد  $(-p) \in \mathbb{R}$  حيث :  
 $p + (-p) = 0$  ( صفر ) ( المحايد الجمعي )

فمثلاً :

المعكوس الجمعي للعدد  $\sqrt[3]{3}$  هو :  $-\sqrt[3]{3}$  و العكس صحيح

$$0 = (\sqrt[3]{3} -) + \sqrt[3]{3}$$

ملاحظات :

(١) المعكوس الجمعي للعدد :  $3 + \sqrt[3]{2}$  هو :

$$-(3 + \sqrt[3]{2}) = -3 - \sqrt[3]{2}$$

(٢) المعكوس الجمعي للعدد :  $3 - \sqrt[3]{2}$  هو :

$$-(3 - \sqrt[3]{2}) = -3 + \sqrt[3]{2}$$

(٣) المعكوس الجمعي للعدد صفر هو نفسه

ثانياً : طرح الأعداد الحقيقية :

حيث أن لكل عدد حقيقي معكوس جمعي فإن عملية الطرح ممكنة دائماً  
 في  $\mathbb{R}$  و تعرف كما يلي :

لكل  $p, b \in \mathbb{R}$  يكون :  $p - b = p + (-b)$  أي أن :  
 عملية الطرح  $(p - b)$  تعني جمع  $p$  مع المعكوس الجمعي للعدد  $b$   
 و يلاحظ أن :

عملية الطرح في  $\mathbb{R}$  ليست إبدالية و ليست دمجية

(٢) أكمل ما يلي :

$$[1] \quad \dots = \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{7}$$

$$[2] \quad \dots + 4 = 4 + \sqrt[3]{3}$$

$$[3] \quad \dots = (\sqrt[3]{0} -) + \sqrt[3]{0}$$

$$[4] \quad (\sqrt[3]{11} + \dots) + 4 = \sqrt[3]{11} + 6$$

$$[5] \quad \dots = \sqrt[3]{9} 4 - \sqrt[3]{9} 8$$

$$[6] \quad \dots = \sqrt[3]{2} 2 + \sqrt[3]{2} 3 - \sqrt[3]{2} 3 - \sqrt[3]{2} 3$$

$$[7] \quad \dots = \sqrt[3]{6} \frac{2}{3} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{6} \frac{1}{3}$$

$$[8] \quad \dots \text{ المعكوس الجمعي للعدد : } \sqrt[3]{8} - \text{ هو } \dots$$

$$[9] \quad \dots \text{ المعكوس الجمعي للعدد : } 1 - \sqrt[3]{2} \text{ هو } \dots$$

$$[10] \quad \dots \text{ المعكوس الجمعي للصفر هو } \dots$$

$$[11] \quad \dots \text{ العدد المحايد الجمعي في } \mathbb{R} \text{ هو } \dots$$

أحمد الشنتوي

ثالثاً : ضرب الأعداد الحقيقية :

تمهيد : نعلم أن :

$$(1) \quad 3 \times 4 = 12 \quad (4 \times 3) = 12$$

بالمثل يمكن استنتاج أن :

$$\sqrt{12} = \sqrt{(4 \times 3)} = \sqrt{4} \times \sqrt{3}$$

$$(2) \quad 3 \times 4 = (3 \times 3) \times 4 = 12$$

بالمثل يمكن استنتاج أن :

$$(\sqrt{3} \times \sqrt{4}) \times 3 = \sqrt{3} \times \sqrt{4} \times 3$$

$$12 = 3 \times 4 =$$

(٣) أوجد ناتج :

$$[1] \quad \dots = (\sqrt{0} - \sqrt{0}) \times 2$$

$$[2] \quad \dots = \sqrt{0} \times \sqrt{0}$$

خواص جمع الأعداد الحقيقية :

[١] الانغلاق :

إذا كان :  $a, b \in \mathbb{R}$  يكون :  $(a \times b) \in \mathbb{R}$   
 أي أن : حاصل ضرب أي عددين حقيقيين هو عدد حقيقي  
 وبالتالي :  $\mathbb{R}$  مغلقة تحت عملية الضرب  
 فمثلاً :

$$\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{12} \times \sqrt{3}, \quad 12 = 4 \times 3, \quad \sqrt{12} = \sqrt{4} \times \sqrt{3}, \quad \text{هو عدد حقيقي}$$

[٢] الإبدال :

إذا كان :  $a, b \in \mathbb{R}$  فإن :  $a \times b = b \times a$   
 أي أن : عملية الضرب إبدالية في  $\mathbb{R}$   
 فمثلاً :

$$\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{12} \times \sqrt{3}$$

[٣] الدمج :

إذا كان :  $a, b, c \in \mathbb{R}$  يكون :

$$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

فمثلاً :

$$\text{الدمج} \quad (\sqrt{12} \times \sqrt{3}) \times \sqrt{2} = \sqrt{12} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2}$$

$$\text{الإبدال} \quad (\sqrt{3} \times \sqrt{12}) \times \sqrt{2} =$$

$$\text{الدمج} \quad 3 \times (\sqrt{12} \times \sqrt{2})$$

$$12 = 3 \times 4 =$$

[٤] العنصر المحايد الضربي :

الواحد هو المحايد الجمعي في  $\mathbb{R}$  لأن :  $a \times 1 = 1 \times a = a$ 

فمثلاً :

$$\sqrt{12} = \sqrt{12} \times 1 = 1 \times \sqrt{12}$$

[٥] وجود معكوس ضربي لكل عد حقيقي :

لكل عدد حقيقي  $a \neq 0$  صفر يوجد عدد حقيقي  $\frac{1}{a}$  حيث :

$$1 = \frac{1}{a} \times a \quad (\text{المحايد الضربي})$$

أحمد الشنتوري

فمثلاً :

المعكوس الضربي للعدد  $\overline{0}$  هو :  $\frac{1}{\overline{0}}$  و العكس صحيحلأن :  $1 = \frac{1}{\overline{0}} \times \overline{0}$ 

ملاحظات :

(١) العدد و معكوسه الضربي لهما نفس الإشارة

فمثلاً :

المعكوس الضربي للعدد  $-\frac{2}{\overline{0}}$  هو :  $-\frac{\overline{0}}{2}$ 

(٢) المعكوس الضربي للعدد : ١ هو نفسه

، و المعكوس للعدد : - ١ هو نفسه

(٣) لا يوجد معكوس ضربي للعدد صفر لأن :  $\frac{1}{0}$  ليس لها معنى

$$(٤) \quad 1 = \frac{\overline{0}}{\overline{0}} = \frac{\overline{3}}{\overline{3}} = \frac{\overline{2}}{\overline{2}} = \dots$$

(٥) يفضل أن يكون مقام العدد الحقيقي عدداً صحيحاً

فمثلاً :

$$\overline{0} = \frac{\overline{0} \cdot \overline{0}}{\overline{0}} = \frac{\overline{0}}{\overline{0}} \times \frac{\overline{0}}{\overline{0}} = \frac{\overline{0}}{\overline{0}}$$

$$\overline{2}^3 \overline{3} = \frac{\overline{2}^3 \overline{1}}{\overline{2}} = \frac{\overline{2}^3}{\overline{2}^3} \times \frac{\overline{2}^3}{\overline{2}^3} \times \frac{\overline{1}}{\overline{2}^3} = \frac{\overline{1}}{\overline{2}^3}$$

[٦] توزيع الضرب على الجمع :

لأي ثلاثة أعداد حقيقية  $\overline{a}$  ،  $\overline{b}$  ،  $\overline{c}$  يكون :

$$\overline{a} \overline{b} + \overline{a} \overline{c} = (\overline{a} \times \overline{b}) + (\overline{a} \times \overline{c}) = (\overline{a} + \overline{b}) \times \overline{c}$$

$$\overline{a} \overline{b} + \overline{c} \overline{b} = (\overline{a} \times \overline{b}) + (\overline{c} \times \overline{b}) = \overline{b} \times (\overline{a} + \overline{c})$$

فمثلاً :

$$\overline{0} \times \overline{0}^3 + \overline{2} \times \overline{0}^3 = (\overline{0} + \overline{2}) \overline{0}^3$$

$$10 + \overline{0}^3 \overline{12} = \overline{0} \times \overline{3} + \overline{0}^3 \overline{2} \times \overline{3} =$$

رابعاً : قسمة الأعداد الحقيقية :

حيث أن لكل عدد حقيقي لا يساوي الصفر معكوس ضربي فإن عملية القسمة على أي عدد حقيقي خلاف الصفر ممكنة دائماً في  $\mathbb{R}$  و تعرف كما يلي :لكل  $\overline{a} \in \mathbb{R}$  ،  $\overline{b} \in \mathbb{R} - \{0\}$  يكون :  $\frac{\overline{a}}{\overline{b}} \times \overline{b} = \overline{a}$  (  $\overline{b} \neq 0$  )  
أي أن :عملية القسمة  $(\frac{\overline{a}}{\overline{b}})$  تعني ضرب  $\overline{a}$  في المعكوس الضربي للعدد  $\overline{b}$  و يلاحظ أن :عملية القسمة في  $\mathbb{R}$  ليست إبدالية و ليست دمجية

(٤) أكمل ما يلي :

$$[1] \quad \dots = \overline{7} \times \overline{7}$$

$$[2] \quad \dots + \overline{2} = \overline{2} \times \overline{3}$$

$$[3] \quad \dots = \overline{2} \times \dots = \overline{2} + \overline{2} + \overline{2}$$

$$[4] \quad \dots = \overline{0}^2 \times \overline{0}^3$$

$$[5] \quad \dots = \overline{2}^3 \times \overline{2}^3 \times \overline{2}^3$$



$$[٦] \quad \dots = (\sqrt{2} + \sqrt{5}) \sqrt{5}$$

$$[٧] \quad \dots = (\sqrt{3} - \sqrt{3}\sqrt{2}) \sqrt{3}$$

$$[٨] \quad \dots = (\sqrt{2} - \sqrt{5})(\sqrt{2} + \sqrt{5})$$

$$[٩] \quad \dots = (\sqrt{2} + \sqrt{5})$$

$$[١٠] \quad \dots \text{ هو } \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ المعكوس الضربي للعدد}$$

$$[١١] \quad \dots \text{ هو العدد المحايد الضربي في } \mathbb{R}$$

$$(٥) \quad \text{إذا كان : } \sqrt{2} + \sqrt{3} = س , \sqrt{2} - \sqrt{3} = ص \text{ أوجد قيمة :}$$

$$[١] \quad س + ص \quad [٢] \quad س ص \quad [٣] \quad س - \sqrt{2} - \sqrt{3} + ص$$

$$(٦) \quad \text{أكمل لتقدير ناتج } (\sqrt{10} + ٥)(\sqrt{3} - ٣)$$

و تحقق من صحة التقدير باستخدام الآلة الحاسبة

$$\text{تقدير } \sqrt{10} \text{ هو : } \dots \text{ لأن : } \sqrt{9} = \dots$$

$$\therefore \text{ تقدير } (\sqrt{10} + ٥) \text{ هو : } \dots + ٥ = \dots$$

$$\text{, تقدير } \sqrt{3} \text{ هو } \dots \text{ لأن : } \sqrt{٨} = \dots$$

$$\therefore \text{ تقدير } (\sqrt{3} - ٣) \text{ هو : } \dots - ٣ = \dots$$

$$\therefore \text{ تقدير } (\sqrt{10} + ٥)(\sqrt{3} - ٣) \text{ هو : } \dots \times \dots = \dots$$

و باستخدام الآلة الحاسبة نجد أن الناتج هو ....

أي أن التقدير ....

$$(٧) \quad \text{أعط تقديرًا لناتج } (\sqrt{10} + ٢)(\sqrt{3} - ٤)$$

و تحقق من صحة التقدير باستخدام الآلة الحاسبة

أحمد الشنتوري

(٨) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$[1] \dots = \sqrt{0} + \sqrt{0}$$

$$(\sqrt{1}, \sqrt{2}, 1, 0)$$

$$[2] \dots = (\sqrt{2}, 2)$$

$$(\sqrt{8}, \sqrt{4}, 8, 4)$$

$$[3] \dots = (\sqrt[3]{0}, \sqrt[3]{2})$$

$$(\sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{4}, 2, 4)$$

[٤] المعكوس الجمعي للعدد  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  هو ....

$$(\sqrt{3}-, \sqrt{2}-, \sqrt{3}, \sqrt{2})$$

[٥] المعكوس الجمعي للعدد  $(\sqrt{2}-\sqrt{0})$  هو ....

$$(\sqrt{2}-\sqrt{0}-, \sqrt{2}+\sqrt{0}, \sqrt{2}-\sqrt{0}, \sqrt{0}-\sqrt{2})$$

$$[6] \dots = \frac{10}{\sqrt[3]{0}}$$

$$(\sqrt{0}, \sqrt[3]{0}, \sqrt{0}, \sqrt[3]{10})$$

$$[7] \dots = \frac{\sqrt[3]{-1}}{\sqrt[3]{3}}$$

$$(1+\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}+1, 1-\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}-1)$$

[٨] المعكوس الضربي للعدد  $\frac{3-}{\sqrt[3]{3}}$  هو ....

$$(\sqrt[3]{3}-, \sqrt[3]{-}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{3})$$

$$[9] (\sqrt{3}-\sqrt{0}) = 14 - \dots$$

$$(\sqrt{9}, \sqrt{7}, \sqrt{4}, \sqrt{2})$$

[١٠] إذا كان بعدا مستطيل هما  $(\sqrt{2}+1)$  سم ،  $(\sqrt{2}-1)$  سم

فإن محيطه = .... سم

$$(\sqrt{2}, \sqrt{4}, 2, 4)$$

[١١] إذا كان بعدا مستطيل هما  $(\sqrt{0}+1)$  سم ،  $(\sqrt{0}-1)$  سمفإن مساحته = .... سم<sup>٢</sup>

$$(\sqrt{1}, 3, 31, 41)$$

[١٢] إذا كان :  $\sqrt{1} + \sqrt{2} = \sqrt{s}$  فإن :  $s = \dots$ 

$$(\sqrt{3}+\sqrt{2}, \sqrt{3}+2, \sqrt{3}-\sqrt{2}, \sqrt{3}-2)$$

[١٣] إذا كان :  $s = (\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ فإن :  $s = \dots$ 

$$(\sqrt{3} \pm, \sqrt[3]{\pm}, \sqrt[3]{-}, \sqrt[3]{-})$$

[١٤] إذا كان :  $s - \sqrt{1} = 17$  ،  $\sqrt{2} = s - \sqrt{v}$ فإن :  $s + v = \dots$ 

$$(\sqrt{32}, \sqrt{14}, \sqrt{8}, \sqrt{4})$$

[١٥] إذا كان : المعكوس الضربي للعدد  $\sqrt{s} - 1$  هو العدد

$$\frac{1}{4} (1 + \sqrt{s}) \text{ فإن : } s = \dots$$

$$(2, 3, 4, 0)$$

## الدرس الثامن : العمليات على الجذور التربيعية

إذا كان :  $p$  ،  $b$  عددين حقيقيين غير سالبين فإن :

$$\sqrt{pb} = \sqrt{b} \times \sqrt{p} \quad (1)$$

$$\sqrt{10} = \sqrt{0 \times 2} = \sqrt{0} \times \sqrt{2} \quad \text{فمثلاً :}$$

$$\sqrt{b} \times \sqrt{p} = \sqrt{b \times p} \quad (2)$$

$$\sqrt{3} \times \sqrt{4} = \sqrt{3 \times 4} = \sqrt{12} \quad \text{فمثلاً :}$$

تستخدم هذه القاعدة لكتابة العدد على الصورة :  $\sqrt{a}$  حيث  $a$  أصغر قيمة ممكنة :  
لاحظ : يجب أن يكون أحد العددين مربع كامل بخلاف الواحد(1) ضع كل مما يلي على صورة  $\sqrt{a}$  حيث  $a$  أصغر قيمة ممكنة :  
صحيحان ،  $a$  أصغر قيمة ممكنة :

$$\dots = \sqrt{8} \quad [1]$$

$$\dots = \sqrt{20} \quad [2]$$

$$\dots = \sqrt{48} \quad [3]$$

$$\dots = \sqrt{50} \times 2 \quad [4]$$

$$\dots = \sqrt{72} \div \frac{1}{2} \quad [5]$$

$$\sqrt{\frac{p}{b}} = \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{b}} \quad \text{حيث : } b \neq 0 \quad (3)$$

فمثلاً :

$$\sqrt{\frac{0}{2}} = \frac{\sqrt{0}}{\sqrt{2}} = \frac{0}{\sqrt{2}} = \frac{0}{2}$$

$$\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{6}{2}}$$

$$\sqrt{\frac{p}{b}} = \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{b}} \quad \text{حيث : } b \neq 0 \quad (4)$$

فمثلاً :

$$3 = \sqrt{9} = \sqrt{\frac{18}{2}} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$$

(2) اختصر إلى أبسط صورة :

$$\dots = \sqrt{0} + \sqrt{8} \quad [1]$$

$$\dots = \sqrt{20} - \sqrt{2} \quad [2]$$

$$\dots = \sqrt{\frac{1}{2}} \times 3 - \sqrt{2} \times 2 \quad [3]$$

$$\dots = \sqrt{32} + \sqrt{18} - \sqrt{128} - \sqrt{98} \quad [4]$$

## العددان المترافقان :

إذا كان :  $p$  ،  $b$  عددين نسبيين موجبين فإن :  
كلًا من العددين :  $(\sqrt{b} + \sqrt{p})$  ،  $(\sqrt{b} - \sqrt{p})$   
هو مرافق للعدد الآخر

و يكون مجموعهما  $(\sqrt{b} - \sqrt{p}) + (\sqrt{b} + \sqrt{p}) =$

$$2\sqrt{b} = \text{ضعف الحد الأول}$$

و حاصل ضربهما  $(\sqrt{b} - \sqrt{p}) \times (\sqrt{b} + \sqrt{p}) =$

$$b - p = (\sqrt{b})^2 - (\sqrt{p})^2 =$$

$$= \text{مربع الحد الأول} - \text{مربع الحد الثاني}$$

**ملاحظة :** حاصل ضرب العددين المترافقين هو دائماً عدد نسبي

**فمثلاً :** مرافق العدد  $(\sqrt{2} - \sqrt{3})$  هو  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})$  و

يكون : مجموعهما  $2\sqrt{2}$  ، و حاصل ضربهما  $2 - 3 = -1$

## (٣) أكمل ما يلي :

[١] مرافق العدد  $(\sqrt{2} + \sqrt{5})$  هو ....

و مجموعهما = .... و حاصل ضربهما = ....

[٢] مرافق العدد  $(\sqrt{7} - 3)$  هو ....

و مجموعهما = .... و حاصل ضربهما = ....

[٣] مرافق العدد  $(\sqrt{6} + 3\sqrt{2})$  هو ....

و مجموعهما = .... و حاصل ضربهما = ....

## ملاحظة :

إذا كان لدينا عدد حقيقي مقامه على الصورة  
 $(\sqrt{b} + \sqrt{p})$  أو  $(\sqrt{b} - \sqrt{p})$  فيجب وضعه  
في أبسط صورة و ذلك بضرب البسط و المقام في مرافق المقام

**فمثلاً :** لكتابة العدد  $\frac{3}{\sqrt{2} - \sqrt{5}}$  في أبسط صورة نتبع ما يلي :

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \times \frac{3}{\sqrt{2} - \sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{2} - \sqrt{5}}$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{5} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{5})^3}{2 - 5} =$$

(٤) أكتب ما يلي في أبسط صورة :

$$[1] \quad \dots = \frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{7}}$$

$$[2] \quad \dots = \frac{\sqrt{3} + 2}{\sqrt{3} - 2}$$

$$(٥) \text{ إذا كان : } \sqrt{5} - \sqrt{3} = \text{س} , \sqrt{5} + \sqrt{2} = \text{ص} ,$$

أثبت أن : س ، ص مترافقان ثم أوجد قيمة كل من :

$$[١] \text{ س} + ٢ \text{س ص} + \text{ص}^٢$$

$$[٢] \text{ س} - \text{س ص} + \text{ص}^٢$$

$$(٦) \text{ إذا كان : } \sqrt{13} + \sqrt{6} = \text{س} , \sqrt{7} = \text{ص} ,$$

أوجد قيمة كل من :

$$[١] \frac{\text{س} + \text{ص}}{\text{س ص} - ٥}$$

$$[٢] \text{س}^٢ \text{ص}^٢$$

أحمد الشنتوري

اكتب ذاكروني في البحث وانضم لجروبات ذاكروني  
مع رياض الأطفال للصف الثالث الإعدادي

$$[10] \quad \dots = (\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})$$

$$(\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1)$$

(٨) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] المعكوس الضربي للعدد  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})$  في أبسط صورة هو ....

[2] إذا كان :  $\sqrt{2} - \sqrt{5} = س$  ،  $\sqrt{2} + \sqrt{5} = ص$  ، فإن :  $(س ص ، س + ص) = \dots$

[3] إذا كان :  $\sqrt{5} + 2 = س$  ،  $\sqrt{5} - 2 = ص$  ، ص العدد المرافق للعدد س فإن :  $(س - ص) = \dots$

[4] مساحة المثلث الذي طول قاعدته  $(2 + 2\sqrt{8})$  سم ، ارتفاعه  $(1 - \sqrt{7})$  سم تساوى .... سم

[5] إذا كان :  $\sqrt{2} - 1 = س$  ،  $1 - \sqrt{2} = ص$  ، فإن :  $ص = \dots$

$$[6] \quad \dots = \sqrt{18} - \sqrt{8} + \sqrt{2} \times 4$$

$$[7] \quad \dots = \frac{3}{4}\sqrt{8} - \frac{2}{3}\sqrt{6} + \frac{1}{4}\sqrt{12}$$

(٧) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$[1] \quad \dots = \sqrt{3} - \sqrt{12} \quad (\sqrt{3}, \sqrt{3} - 2, 9, 3)$$

$$[2] \quad \dots = \sqrt{2} - \sqrt{8} - \sqrt{50} \quad (\sqrt{2}, \sqrt{30}, \sqrt{2}, \sqrt{2} - 2)$$

$$[3] \quad \dots = (\sqrt{5} + \sqrt{7})(\sqrt{5} - \sqrt{7}) \quad (\sqrt{5} - 2, \sqrt{7} - 2, 12, 2)$$

$$[4] \quad \dots = (\sqrt{2} + \sqrt{8}) \quad (\sqrt{18}, \sqrt{10}, 18, 10)$$

$$[5] \quad \dots = \frac{1}{4}\sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2} \quad (\sqrt{2} - \frac{1}{4}, \sqrt{2}, \frac{1}{4}\sqrt{2}, 1)$$

[6] المعكوس الضربي للعدد  $\sqrt{50}$  هو ....  
 $(\sqrt{2} - \frac{1}{5}, \sqrt{2} - \frac{1}{5}, \sqrt{2} - \frac{1}{5}, \sqrt{2} - \frac{1}{5})$

[7] العدد التالي في النمط :  $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}$  هو ....  
 $(\sqrt{40}, \sqrt{72}, \sqrt{50}, \sqrt{38})$

$$[8] \quad \dots \times 2 = \sqrt{48} - \frac{1}{4} \quad (\sqrt{2} - 3, \sqrt{3} - 2, \sqrt{3}, \sqrt{2})$$

[9] إذا كان :  $\sqrt{3} - \sqrt{2} = س$  ،  $\sqrt{3} + \sqrt{2} = ص$  ، فإن :  $ص = \dots$   
 $(3 - 2, 2 - 3, 3, 2)$

أحمد الشنتوري

$$(٣) \quad \sqrt[p]{\frac{p}{b}} = \frac{\sqrt[p]{p}}{\sqrt[p]{b}} \quad \text{حيث : } b \neq \text{صفر}, p, b \in \mathbb{C}$$

أحمد الشنتوري

فمثلاً :

$$2 = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{\frac{24}{3}} = \frac{\sqrt[3]{24}}{\sqrt[3]{3}}$$

$$(٤) \quad \sqrt[p]{\frac{p}{b}} = \sqrt[p]{\frac{p}{b}} \quad \text{حيث : } b \neq \text{صفر}, p, b \in \mathbb{C}$$

أحمد الشنتوري

فمثلاً :

$$\sqrt[3]{\frac{1}{12}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{12}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{6}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{12}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{12}}$$

(٢) اختصر إلى أبسط صورة :

$$.... = \sqrt[3]{20} - \sqrt[3]{54} \quad [1]$$

$$.... = \sqrt[3]{32} + \sqrt[3]{1.8} \quad [2]$$

$$.... = \sqrt[3]{\frac{1}{9}} - \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{81} \quad [3]$$

$$.... = \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{128} \times 2 - \sqrt[3]{20} \quad [4]$$

## الدرس التاسع : العمليات على الجذور التكعيبية

إذا كان :  $p, b$  عددين حقيقيين فإن :  $\sqrt[p]{\frac{1}{b}}$ 

$$(1) \quad \sqrt[p]{\frac{1}{b}} = \sqrt[p]{\frac{1}{b}} \times \sqrt[p]{b} = \sqrt[p]{\frac{1}{b} \times b} = \sqrt[p]{1} = 1$$

$$\text{فمثلاً : } \sqrt[3]{\frac{1}{10}} = \sqrt[3]{\frac{1}{10}} \times \sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{\frac{1}{10} \times 10} = \sqrt[3]{1} = 1$$

$$(2) \quad \sqrt[p]{b} \times \sqrt[p]{p} = \sqrt[p]{b \times p}$$

$$\text{فمثلاً : } \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{3 \times 8} = \sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{24}$$

تستخدم هذه القاعدة لكتابة العدد على الصورة :  $\sqrt[p]{s}$  حيث  $s$  عددان  
لاحظ : يجب أن يكون أحد العددين مكعب كامل بخلاف الواحد

(1) ضع كل مما يلي على صورة  $\sqrt[p]{s}$  حيث  $s$  ، ص عددان صحيحان ، ص أصغر قيمة ممكنة :

$$.... = \sqrt[3]{16} \quad [1]$$

$$.... = \sqrt[3]{\frac{1}{20}} \quad [2]$$

$$.... = \sqrt[3]{81} \times 2 \quad [4]$$

$$.... = \sqrt[3]{20} \times \frac{1}{5} \quad [5]$$

(٣) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$.... = \sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{81} \quad [1]$$

$$(\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{07}, \sqrt[3]{3})$$

$$.... = \sqrt[3]{20} + \sqrt[3]{130} \quad [2]$$

$$(\sqrt[3]{170}, \sqrt[3]{0}, \sqrt[3]{0}, \sqrt[3]{0})$$

$$.... = \sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{3} \quad [3]$$

$$(\sqrt[3]{27}, \sqrt[3]{27}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{1})$$

$$.... = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2} \quad [4]$$

$$(\sqrt[3]{16}, \sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$$

$$.... = \sqrt[3]{\frac{1}{9}} - \sqrt[3]{24} \quad [5]$$

$$(\sqrt[3]{9}, \sqrt[3]{12}, \sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{-8})$$

(٤) أختصر كلاً مما يلي لأبسط صورة :

$$.... = \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{98} - \sqrt[3]{04} + \sqrt[3]{18} \quad [1]$$

$$.... = \sqrt[3]{73} + \sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{28} - \sqrt[3]{81} \quad [2]$$

$$(0) \text{ إذا كان : } \sqrt[3]{7} + 3 = \text{س} , \sqrt[3]{7} - 3 = \text{ص} ,$$

أوجد قيمة كل من :

$$[2] (\text{س} + \text{ص})$$

$$[1] (\text{س} - \text{ص})$$

أحمد الشنتوري



## الدرس العاشر : تطبيقات على الأعداد الحقيقية

## الدائرة :

محيط الدائرة =  $2\pi r$  في وحدة طوليةمساحة سطح الدائرة =  $\pi r^2$  في وحدة مربعةحيث :  $r$  في طول نصف قطر الدائرة ، $\pi$  هي النسبة التقريبية بين محيط الدائرة و طول القطر

$$\pi = \frac{22}{7} \text{ أو } 3,14$$

## فمثلاً :

لايجاد مساحة دائرة محيطها ٣١,٤ سم ، (  $3,14 = \pi$  ) نتبع ما يلي :بما أن : محيط الدائرة =  $2\pi r$  في

$$\text{إذن : } 31,4 = 2 \times 3,14 \times r \Rightarrow r = 5 \text{ في}$$

$$\text{إذن : } 0 = 31,4 \div 6,28 = 5 \text{ سم}$$


$$\text{مساحة سطح الدائرة} = \pi r^2 = 3,14 \times 5 \times 5 = 78,5 \text{ سم}^2$$

$$(1) \text{ دائرة محيطها } 88 \text{ سم أوجد مساحة سطحها ( } \pi = \frac{22}{7} \text{ )}$$



أحمد الشنتوري

$$(2) \text{ دائرة مساحة سطحها } 314 \text{ سم}^2 \text{ أوجد محيطها ( } \pi = 3,14 \text{ )}$$



(3) في الشكل المقابل :

أ ب د مربع مرسوم داخل دائرة م


فإذا كان محيط الجزء المظلل ٢٥ سم أوجد :

مساحة المربع ، مساحة الدائرة (  $\frac{22}{7} = \pi$  )

## متوازي المستطيلات :

هو مجسم جميع أوجهه مستطيلة الشكل  
و كل وجهين متقابلين متطابقان

إذا كانت أطوال أحرفه س ، ص ، ع فإن :



$$\text{المساحة الجانبية} = \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= 2(s + v) \times e \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{المساحة الكلية} = \text{المساحة الجانبية} + 2 \times \text{مساحة القاعدة}$$


$$= 2(s + v + e) \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{الحجم} = \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= s \times v \times e \text{ وحدة مكعبة}$$

## حالة خاصة : المكعب

هو متوازي مستطيلات أطوال أحرفه متساوية  
إذا كان طول حرفه = ل وحدة طول فإن :



$$\text{مساحة كل وجه} = ل^2 \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{المساحة الجانبية} = 4ل^2 \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{المساحة الكلية} = 6ل^2 \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{الحجم} = ل^3 \text{ وحدة مكعبة}$$

(٤)

متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل ، و حجمه ٧٢ سم<sup>٣</sup>  
و ارتفاعه ٥ سم أوجد حجمه

(٥)

مكعب حجمه ١٢٥ سم<sup>٣</sup> أوجد مساحته الكلية


أحمد الشنتوري

(٦) أيهما أكبر حجماً مكعب مساحته الكلية ٢٩٤ سم<sup>٢</sup> أم متوازي مستطيلات أبعاده  $\sqrt{٧}$  ،  $\sqrt{٥}$  ، ٥ سم

(٨) مكعب حجمه ١٧٢٨ سم<sup>٣</sup> ، قطع عند أحد أحرافه متوازي مستطيلات أبعاده ٣ سم ، ٢ سم ، ١ سم أوجد المساحة الكلية للجزء المتبقى من المكعب

أحمد الشنتوري


(٧) قطعة من الورق المقوى مستطيلة الشكل بعدها ٢٥ سم ، ١٥ سم قطع من كل ركن من أركانها الأربعة مربع طول ضلعه ٤ سم ثم طويت الأجزاء البارزة لتكون حوضاً على شكل متوازي مستطيلات أوجد حجمه و مساحته الكلية



(٩) متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل و إرتفاعه ٣ سم فإذا كان مجموع أطوال أحرافه ٥٢ سم أوجد حجمه

## الأسطوانة الدائرية القائمة :

هي مجسم له قاعدتان متوازيتان و متطابقتان كل منهما عبارة سطح دائرة أما السطح الجانبي فهو سطح منحني يسمى سطح الأسطوانة في الشكل المقابل :



إذا كان :  $r$  ،  $r'$  مركزي قاعدتي الأسطوانة فإن :  
 $r = r'$  هو ارتفاع الأسطوانة ،  $p = p'$   
 كل منهما = طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة

،  $p = p'$  و إذا قطعنا سطح

الأسطوانة الجانبي عند  $p$  و بسطنا هذا السطح نحصل على سطح المستطيل

$p = p'$  و يكون :  $p = h$  ارتفاع

الأسطوانة ،  $p = p'$  محيط قاعدة الأسطوانة

، مساحة المستطيل  $p = p'$  = المساحة الجانبية للأسطوانة

المساحة الجانبية للأسطوانة = محيط القاعدة  $\times$  الارتفاع  
 $\pi r^2 = \pi r \times h$  وحدة مربعة

المساحة الكلية للأسطوانة = المساحة الجانبية +  $2 \times$  مساحة القاعدة  
 $\pi r^2 = \pi r \times h + 2 \times \pi r^2$  وحدة مربعة

حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة  $\times$  الارتفاع  
 $\pi r^2 = \pi r^2 \times h$  وحدة مكعبة

أحمد الشنتوري

(١٠)

قطعة من الورق المقوى على شكل مستطيل  $p$  ب د ع فيه  $p$  ب =  
 ١٠ سم ، ب د = ٢٢ سم ، طويت على شكل أسطوانة دائرية قائمة  
 بحيث ينطبق  $p$  ب على ع د أوجد حجم الأسطوانة الناتجة  
 $(\pi = \frac{22}{7})$

أحمد الشنتوري

(١١)

أسطوانة دائرية قائمة محيط قاعدتها = ٤٤ سم ، حجمها = ٣٨٥٠  
 سم<sup>٣</sup> أوجد ارتفاعها  $(\pi = \frac{22}{7})$

(١٢) أسطوانة دائرية قائمة حجمها ٧٥٣٦ سم<sup>٣</sup> و ارتفاعها ٢٤ سم  
أوجد مساحتها الكلية (  $3,14 = \pi$  )

(١٤) قطعة من الشيكولاتة على شكل أسطوانة دائرية قائمة طول نصف  
قطر قاعدتها ١١ سم و ارتفاعها ١٠,٥ سم صهرت و حولت إلى ٣  
مكعبات متساوية الحجم أوجد طول حرف المكعب الواحد  
(  $\frac{22}{7} = \pi$  )

أحمد الشنتوري

(١٣) أيهما أكبر حجماً أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها  
٧ سم و ارتفاعها ١٠ سم أم مكعب طول حرفه ١١ سم ؟  
(  $\frac{22}{7} = \pi$  )

(١٥) أسطوانة دائرية قائمة ارتفاعها يساوي طول نصف قطر قاعدتها و  
حجمها يساوي ٢٧  $\pi$  سم<sup>٣</sup> أوجد مساحتها الجانبية بدلالة  $\pi$

## الكرة :

هي مجسم سطحه منحنى جميع نقاط سطحه على أبعاد متساوية ( نـ ) من نقطة ثابتة داخله ( مركز الكرة ) إذا قطعت الكرة بمستوى مار بمركزها فإن المقطع دائرة مركزها هو مركز الكرة ، وطول نصف قطرها هو طول نصف قطر الكرة ( نـ )



مساحة سطح الكرة =  $\pi \times 4$  نـ<sup>٢</sup> وحدة مربعة

حجم الكرة =  $\frac{4}{3} \pi \times 3$  نـ<sup>٣</sup> وحدة مكعبة

(١٦) كرة مساحة سطحها ١٢٥٦ سم<sup>٢</sup> أوجد حجمها (  $\pi = ٣,١٤$  )

(١٨)

متوازي مستطيلات من الرصاص أطوال أحرفه ٧٧ ، ٢٤ ، ٢١ سم شكلت منه مادة لتكوين كرة أوجد طول نصف قطر الكرة (  $\frac{٢٢}{٧} = \pi$  )

أحمد الشنتوري

(١٩) كرة حجمها  $36\pi$  سم<sup>٣</sup> وضعت داخل مكعب فمست أوجهه الستة أوجد مساحة سطح الكرة ثم أوجد حجم المكعب

(٢١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] حجم الكرة التي طول نصف قطرها  $\sqrt[3]{3}$  سم يساوى .... سم<sup>٣</sup>

(  $\pi \frac{9}{4}$  ،  $\pi \frac{4}{9}$  ،  $\pi \sqrt[3]{3}$  ،  $\pi \frac{4}{3}$  )

[٢] طول نصف قطر الكرة التي مساحتها  $9\pi$  سم<sup>٢</sup> يساوى .... سم

( ٩ ، ٦ ، ٣ ، ١,٥ )

[٣] المساحة الكلية لمكعب حجمه ٨ سم<sup>٣</sup> تساوى .... سم<sup>٢</sup>

( ٢٤ ، ١٦ ، ٤ ، ٢ )

[٤] طول نصف قطر دائرة مساحتها  $2\pi$  سم<sup>٢</sup> يساوى .... سم

( ٤ ،  $\sqrt{2}$  ، ٢ ، ١ )

[٥] ارتفاع متوازي المستطيلات الذي مساحته الجانبية ٢٤ سم<sup>٢</sup>

و قاعدته على شكل مربع طول ضلعه ٦ سم يساوى .... سم

( ١٠ ، ٦ ، ٥ ، ٣ )

[٦] إذا كانت المساحة الجانبية لأسطوانة دائرية قائمة طول نصف

قطرها ٨ سم هي  $8\pi$  سم<sup>٢</sup> فإن ارتفاعها = .... سم

( ٨ ، ٤ ، ١٠ ، ١٦ )

(٢٠) كرة معدنية جوفاء طولاً نصفى قطريها الداخلى و الخارجى ٢,١ سم ، ٣,٥ سم على الترتيب أوجد كتلتها علماً بأن السنتيمتر المكعب من هذا المعدن كتلته ٢٠ جرام (  $\frac{22}{7} = \pi$  )

لأمانة العلمية  
يرجى عدم حذف أسمى نهائياً  
يسمح فقط بإعادة النشر  
دون أى تعديل

الدرس الحادي عشر : حل المعادلات و المتباينات من الدرجة الأولى  
في متغير واحد في ح

أولاً : حل المعادلات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح  
نعلم أن :

(١) المعادلة هي :

جملة رياضية تحتوي على متغير أو أكثر وتحتوي علاقة التساوي  
بين عبارتين رياضيتين

فمثلاً :

الجملة الرياضية :  $7 = 1 - 2s$  تسمى معادلة حيث :

تحتوي على المتغير أو المجهول ( $s$ ) ، علاقة التساوي ( $=$ )  
بين العبارتين ( $1 - 2s$ ) بالطرف الأيمن ، ( $7$ ) بالطرف الأيسر

(٢) درجة المعادلة هي :

أعلى درجة حد جبري تحتوي عليه المعادلة  
فمثلاً :

المعادلة :  $7 = 1 - 2s$  من الدرجة الأولى ،

المعادلة :  $9 = 0 + s^2$  من الدرجة الثانية ، .... و هكذا

(٣) حل المعادلة هو :

إيجاد قيمة المتغير ( المجهول ) التي تحقق تساوي طرفي المعادلة

(٤) مجموعة حل المعادلة :

هي المجموعة التي تحقق عناصرها المعادلة

ملاحظة :

في حالة المعادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد :  
للمجهول قيمة واحدة

(٥) خواص علاقة التساوي :

إذا كان :  $s$  ،  $v$  ،  $e$  أعداداً حقيقية فإن :

[١] إذا كان :  $s = v$  فإن :  $s \pm e = v \pm e$

[٢] إذا كان :  $s = v$  فإن :  $s \times e = v \times e$

[٣] إذا كان :  $s \times e = v \times e$  فإن :  $s = v$  ،  $e \neq 0$

كيفية حل المعادلات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح :

(١)  $7 = 1 - 2s$  بإضافة (١) للطرفين ينتج :

$8 = 2s$  بقسمة طرفي المعادلة على (٢) ينتج :

$s = 4$   $\therefore$  مجموعة الحل = { ٤ }

ملاحظة :

يمكن ضرب طرفي المعادلة :  $8 = 2s$  في المعكوس الضربي

لمعامل  $s$  و هو  $\frac{1}{2}$  كما يلي :

$$\frac{1}{2} \times 8 = \frac{1}{2} \times 2s \quad \therefore s = 4$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي :



(٢)  $0 = 1 + s$  بإضافة (١ -) للطرفين ينتج :

$0 = s$  بضرب طرفي المعادلة في  $\frac{1}{0}$  ينتج :

$$0 = s \quad \frac{0}{0} = \frac{0}{0} \times \frac{0}{0} = \frac{0}{0} = s$$




$$[4] \sqrt{3} \text{ س} - 2 = 1$$

$$[5] \sqrt{2} \text{ س} - 1 = 2$$

$$[6] \sqrt{7} \text{ س} - \sqrt{7} = \sqrt{7}$$

∴ مجموعة الحل =  $\{ \sqrt{0} \}$   
و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي



(1) أوجد في ح مجموعة الحل لكل من المعادلات التالية و مثل الحل على خط الأعداد :

$$[1] 3 \text{ س} + 7 = 1$$

$$[2] 2 \text{ س} + 4 = 4$$

$$[3] 2 \text{ س} + 2 = 0$$

ثانياً : حل المتباينات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح

نعلم أن :

(١) المتباينة :

هي جملة رياضية تتضمن علامة التباين بين عبارتين رياضيتين

ملاحظة :

علامات التباين هي :

$<$  : أكبر من ،  $>$  : أقل من  
 $\leq$  : أكبر من أو يساوي ،  $\geq$  : أقل من أو يساوي

فمثلاً :

الجملة الرياضية :  $s - 1 > 7$  تسمى متباينة حيث :

تحتوي على المتغير أو المجهول (س) ، علاقة التساوي ( $>$ )  
 بين العبارتين (س - 1) بالطرف الأيمن ، (7) بالطرف الأيسر

(٢) درجة المتباينة هي :

أعلى درجة حد جبرى تحتوى عليه المتباينة

فمثلاً :

المتباينة :  $s - 1 < 7$  من الدرجة الأولى ،

المتباينة :  $s + 9 \geq 0$  من الدرجة الثانية ، .... و هكذا

(٣) حل المتباينة هو :

إيجاد قيم المتغير (المجهول) التي تحقق تساوى طرفى المعادلة

(٤) مجموعة حل المعادلة :

هي مجموعة العناصر التي يحقق كل منها المتباينة

و تكتب في صورة فترة

ملاحظة : في حالة المتباينة من الدرجة الأولى في مجهول واحد :  
 للمجهول قيمة واحدة أو أكثر

(٥) خواص علاقة التباين :

إذا كان : س ، ص ، ع أعداداً حقيقية و كان  $s > v$  فإن :

$$[1] \quad s + e > v + e$$

سواء كانت ع موجبة أو سالبة (خاصية الإضافة)

$$[2] \quad \text{إذا كان : } e < 0 \text{ فإن : } s \times e > v \times e$$

خاصية الضرب فى عدد حقيقى موجب

$$[3] \quad \text{إذا كان : } e > 0 \text{ فإن : } s \times e < v \times e$$

خاصية الضرب فى عدد حقيقى سالب

أى أن : عند ضرب (أو قسمة) طرفى المتباينة فى (على)

عدد سالب يتغير اتجاه علامة التباين

ملاحظة :

يمكن استنتاج خواص علاقة التباين السابقة فى جميع علاقات

التباين :  $>$  أو  $<$  أو  $\leq$  أو  $\geq$

كيفية حل المعادلات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح :


$$[1] \quad 3s + 1 > 10 \quad \text{بإضافة ( - 1 ) للطرفين}$$

$$3s > 9$$

بضرب طرفى المتباينة فى ( $\frac{1}{3}$ ) ينتج :

$$s > 3 \quad \therefore \text{مجموعة الحل} = ]3, \infty[$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالى :



(٢) أوجد في ح مجموعة الحل لكل من المتباينات التالية و مثل الحل على خط الأعداد :

$$[1] \quad 3 \leq 2 - x < 1$$


$$(٢) \quad 3 - x \geq 1 \quad \text{إضافة ( ٣ - ) للطرفين}$$

$$2 - x \geq 2$$

بضرب طرفي المتباينة في  $(-\frac{1}{x}) > 0$  ينتج :

$$x \leq 1 \quad \therefore \text{مجموعة الحل} = ]-\infty, 1]$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي :



$$[2] \quad 3 - x \leq 4 - 0$$

$$(٣) \quad 0 - x > 3 - 2 \geq 7 \quad \text{إضافة ( ٢ ) للأطراف}$$

بالبضرب في  $(-\frac{1}{x}) > 0$  ينتج :

$$-x > 3 \geq 1 \quad \therefore \text{مجموعة الحل} = ]-\infty, -3]$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي :



$$[3] \quad 0 \geq 1 - x > 3 -$$


$$(٤) \quad 2 + x \geq 3 + x \geq 2 + x \geq 8 + x \quad \text{إضافة ( x - )}$$

$$8 \geq 2 + x \geq 2 \quad \text{إضافة ( ٢ - )}$$

$$8 \geq x \geq 0 \quad \text{بالبضرب في } (-\frac{1}{x}) > 0$$

$$4 \geq x \geq 0 \quad \therefore \text{مجموعة الحل} = [0, 4]$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي :



أحمد الشنتوري

$$[4] \quad \frac{1}{4} \leq 1 + s \leq 2$$

$$[7] \quad |2 - s| > 3 - s \geq 1$$

$$[5] \quad 2 - s \geq 3 - s \geq 0$$

$$[8] \quad \sqrt[3]{8 - s} > 1 + s \geq \sqrt[3]{9}$$

$$[6] \quad 1 - s \geq 3 - s \geq 0 + s$$

(٣) إذا كانت :  $[4, 7]$  هي مجموعة حل المتباينة :  
 $p \leq 3 - s \leq b$  أوجد قيمة كل من :  $p, b$

أحمد الشنتوري

(٤) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] مجموعة حل المعادلة :  $2x - 3 = 7$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $\emptyset$  ،  $\{0\}$  ،  $\{1\}$  ،  $\{2\}$  )

[2] مجموعة حل المعادلة :  $\sqrt{x} = 2$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $\emptyset$  ،  $\{\sqrt{2}\}$  ،  $\{\sqrt{2}, 2\}$  ،  $\{\sqrt{2}, 4\}$  )

[3] مجموعة حل المعادلة :  $\sqrt{x} = \sqrt{3} - \sqrt{3}$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $\emptyset$  ،  $\{0\}$  ،  $\{\sqrt{3}\}$  ،  $\{\sqrt{3}, 2\}$  )

[4] مجموعة حل المتباينة :  $x < 7$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $]-\infty, 7[$  ،  $]-\infty, 7]$  ،  $]-\infty, 7[$  ،  $]-\infty, 7]$  )

[5] مجموعة حل المتباينة :  $1 - x > 1$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $]-1, 1[$  ،  $]-1, 1]$  ،  $]-1, 1[$  ،  $]-1, 1]$  )

[6] مجموعة حل المتباينة :  $1 - x \geq 1$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $]-1, 1[$  ،  $]-1, 1]$  ،  $]-1, 1[$  ،  $]-1, 1]$  )

[7] إذا كان :  $2 < x < 3$  فإن  $2x + 3 \geq \dots$

(  $]-1, 7[$  ،  $]-1, 7]$  ،  $]-1, 7[$  ،  $]-1, 7]$  )

[8] العدد :  $2 \in$  مجموعة حل المتباينة ....

(  $x < 2$  ،  $x > 2$  ،  $x \leq 2$  ،  $x \geq 2$  )

[9] إذا كان :  $x \in ]-\infty, 2]$

فإن : العبارة تمثل المتباينة ....

(  $x \geq 2$  ،  $x \leq 2$  ،  $x > 2$  ،  $x < 2$  )

أحمد الشنتوري

(٥) أكمل ما يلي لتحصل على عبارة صحيحة حيث  $x \in \mathbb{R}$  :

[1] إذا كان :  $x + 5 = 11$  فإن :  $x = \dots$

[2] إذا كان :  $3x = 6$  فإن :  $x + 1 = \dots$

[3] إذا كان :  $2x - 1 = 7$  فإن :  $\frac{1}{x} = \dots$

[4] إذا كانت مجموعة حل المعادلة :  $x + 4 = 3$  هي  $\{3\}$

فإن :  $x = \dots$

[5] إذا كانت مجموعة حل المعادلة :  $3x + 2 = 0$  هي

$\{1\}$  فإن :  $x = \dots$

[6] مجموعة حل المعادلة :  $x + \dots = 7$  هي  $\{-2\}$

[7] مجموعة حل المتباينة :  $x > 3$  هي ....

[8] مجموعة حل المتباينة :  $x \leq 1$  هي ....

[9] مجموعة حل المتباينتين :  $x > 3$  ،  $x \leq 1$  معاً هي ....

[10] إذا كان :  $m > p$  فإن :  $p - 3 \dots 3 - p$

[11] إذا كان :  $m > p$  ،  $x = 3$  فإن :  $p \dots x$

[12] إذا كان :  $m > p$  ،  $x = 3$  فإن :  $p \dots x$

[13] إذا كان :  $1 < x < 2$  فإن :  $x + 1 \in \dots$

## الوحدة الثانية

## العلاقة بين متغيرين

## الدرس الأول : العلاقة بين متغيرين

تمهيد :

أشترى محمد كراسات و أقلام فإذا كان ثمن الكراسة ستة جنيهاً ، و ثمن القلم أربعة جنيهاً ، و دفع للبائع ٥٠ جنيهاً فما هي الإمكانيات المختلفة لعدد الأقلام و الكراسات التي اشتراها محمد ؟  
لدراسة الإمكانيات المختلفة

نفرض أن : عدد الأقلام = س ، عدد الكراسات = ص  
∴ ٦س + ٤ص = ٥٠

تسمى هذه العلاقة : **معادلة من الدرجة الأولى في متغيرين**  
يمكن قسمة طرفي المعادلة على ٢ فنحصل على معادلة مكافئة لها  
و هي : ٣س + ٢ص = ٢٥ و يمكن كتابتها على الصورة :  
٢ص = ٢٥ - ٣س أي أن :  $ص = \frac{٢٥ - ٣س}{٢}$

لاحظ أن :

س ، ص أعداد طبيعية  
وفي هذه الحالة تكون س عدداً فردياً  
يمكن تكوين الجدول المقابل لمعرفة الإمكانيات المختلفة

س	ص	( س ، ص )
١	١١	( ١ ، ١١ )
٣	٨	( ٣ ، ٨ )
٥	٥	( ٥ ، ٥ )
٧	٢	( ٧ ، ٢ )
٩	سالبة	لا تصلح

(١) مع مؤمن أوراق مالية فئة ٥ جنيهاً ، و أوراق مالية فئة ٢٠ جنيهاً  
أشترى مؤمن من مركز تجاري بما قيمته ٨٥ جنيهاً ، ما الإمكانيات المختلفة لدفع هذا المبلغ باستخدام نوعي الأوراق المالية التي معه ؟

(٢) مثلث متساوي الساقين محيطه ١٩ سم ، ما الإمكانيات المختلفة لأطوال أضلاعه ، علماً بأن أطوال أضلاعه  $\in \mathbb{N}$   
تذكر : مجموع طولى ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع الثالث

أحمد الشنتوري

## دراسة العلاقة بين متغيرين

العلاقة :  $٣س + ب ص = ح$  حيث :  $٣ \neq ٠$  ،  $ب \neq ٠$  .  
تسمى علاقة خطية بين المتغيرين  $س$  ،  $ص$  ، و يمكن  
إيجاد مجموعة من الأزواج المرتبة  $(س ، ص)$  تحقق هذه العلاقة  
فمثلاً :

لدراسة العلاقة :  $٣س + ص = ٢$   
نوجد الأزواج المرتبة بوضع قيمة  $س$  وإيجاد قيمة  $ص$  المناظرة  
أو العكس كما يلي :

$$\text{بوضع } س = ٠ : \therefore ٣ \times ٠ + ص = ٢$$

$$\therefore ص = ٢ \quad \therefore (٠ ، ٢) \text{ يحقق العلاقة}$$

$$\text{بوضع } س = ١ : \therefore ٣ \times ١ + ص = ٢$$

$$\therefore ص = ١ - ٣ = -٢ \quad \therefore (١ ، -٢) \text{ يحقق العلاقة}$$

$$\text{بوضع } س = ١ - ١ = ٠ : \therefore ٣ \times ٠ + ص = ٢$$

$$\therefore ص = ٢ \quad \therefore (٠ ، ٢) \text{ يحقق العلاقة}$$

و هكذا نجد أن هناك عدداً لا نهائياً من الأزواج المرتبة  $(س ، ص)$   
التي تحقق هذه العلاقة

ملاحظة :

يمكن كتابة العلاقة :  $٣س + ص = ٢$  كما يلي :

$ص = ٢ - ٣س$  أي : وضع أحد المتغيرين في طرف مستقل

ثم إيجاد الأزواج المرتبة التي تحقق هذه العلاقة

(٣) أوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق كلاً من العلاقات التالية :

$$[١] س - ٢ ص = ٥$$

$$[٢] ٢س + ٥ ص = ١٠$$

أحمد الشنتوري

(٤) بين أي الأزواج المرتبة التالية يحقق العلاقة :  $٢س - ص = ١$   
كما بالمثال :

مثال : (١ ، ١)

نضع :  $س = ١$  ،  $ص = ١$

$$\therefore ٢س - ص = ١ - ١ \times ٢ = ١ - ٢ = -١$$

$\therefore$  (١ ، ١) يحقق العلاقة

[١] (٣ ، ٥)

[٢] (٥ ، ٣)

[٣] (٢ - ، ٥ -)

(٥) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] إذا كان : (١ ، ٢ -) يحقق العلاقة :  $٣س + ٤ص = ١$

فإن :  $٤ = \dots$

[ ٥ - ، ٥ ، ٧ - ، ٧ ]

[٢] إذا كان : (٥ - ، ٢ -) يحقق العلاقة :  $٣س - ص + ٤ = ٠$

فإن :  $٤ = \dots$

[ ١١ - ، ١١ ، ١ - ، ١ ]

[٣] إذا كان : (٢ ، ٤) يحقق العلاقة :  $٥س - ص = ٦$

فإن :  $٤ = \dots$

[ ٢ - ، ١ - ، ٢ ، ١ ]

[٤] الزوج المرتب الذي يحقق العلاقة :  $٢س + ص = ٥$

هو ....

[ (٣ - ، ١) ، (٣ ، ١) ، (١ ، ٣) ، (٣ ، ١ -) ]

[٥] الزوج المرتب الذي يحقق العلاقتين :  $٢س + ص = ٥$  ،

$٢س + ص = ٧$  معاً هو ....

[ (٣ - ، ٢) ، (٢ ، ٣) ، (٣ ، ٢) ، (٣ ، ٢ -) ]

[٦] الجدول التالي يبين

العلاقة بين  $س$  ،

$ص$  و هي ....

[  $ص = ٧ + س$  ،  $ص = ٧ - س$  ،

$ص = ٣س + ١$  ،  $ص = ١ + س$  ]

أحمد الشنتوري




## التمثيل البياني للعلاقة بين متغيرين

العلاقة :  $p = s + b$  حيث :  $p \neq 0$  ،  $b \neq 0$   
تسمى علاقة خطية بين المتغيرين  $s$  ،  $v$  و يمثلها بيانياً خط مستقيم  
فمثلاً :

لتمثيل العلاقة :  $3s + v = 2$  بيانياً  
نوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق هذه العلاقة كما سبق و يمكن وضعها في جدول كالتالي :

$s$	$0$	$1$	$2$
$v$	$2$	$1$	$0$

و نعين في النظام الإحداثي المتعامد النقط التي تمثل الأزواج المرتبة :  $(0, 2)$  ،  $(1, 1)$  ،  $(2, 0)$



ونرسم الخط المستقيم المار بها فيكون هو التمثيل البياني لهذه العلاقة  
( الخط المستقيم باللون الأزرق يمثل العلاقة )  
لاحظ أن :

جميع نقط المستقيم الممثل للعلاقة تعين أزواج مرتبة تحقق هذه العلاقة

أحمد الشنتوري

## حالات خاصة :

(١) إذا كان :  $p = 0$  .

فتصبح العلاقة على الصورة :

$$b = v$$

فمثلاً :

$$3 = v$$

$$v = \frac{3}{1}$$

يمثلها الخط المستقيم باللون الأحمر

و هو يمر بالنقطة  $(0, 3)$  ،  $(1, 3)$  ،  $(2, 3)$

و يكون موازياً لمحور السينات

ملاحظة : العلاقة :  $v = 0$  . يمثلها محور السينات

(٢) إذا كان :  $b = 0$  .

فتصبح العلاقة على الصورة :

$$p = s$$

فمثلاً :

$$1 - = s$$



$$s = -\frac{1}{1}$$

يمثلها الخط المستقيم باللون الأخضر


و هو يمر بالنقطة  $(0, -1)$  ،  $(1, -1)$  ،  $(2, -1)$

و يكون موازياً لمحور الصادات

ملاحظة : العلاقة :  $s = 0$  . يمثلها محور الصادات



أحمد الشنتوري




أحمد الشنتوري

ملاحظات :

- (١) يمكن تكوين الجدول مباشرة
- (٢) يمكن إيجاد نقطة تقاطع المستقيم الممثل للعلاقة :  

$$٣س + ٢ص = ٦$$
 مع محور السينات بوضع :  $ص = ٠$   
 ، و مع محور الصادات بوضع :  $س = ٠$   
**فمثلاً :** العلاقة :  $٣س + ٢ص = ٦$   
 بوضع :  $ص = ٠$  ينتج :  $٣س = ٦$   
 ∴ نقطة تقاطع المستقيم مع محور السينات هي ( ٢ ، ٠ )  
 بوضع :  $س = ٠$  ينتج :  $٢ص = ٦$   
 ∴ نقطة تقاطع المستقيم مع محور الصادات هي ( ٠ ، ٣ )

أحمد الشنتوري



(٣) إذا كان :  $ص = ٠$   
 فتصبح العلاقة على الصورة :

$$٣س + ٢ \times ٠ = ٦$$

فمثلاً :

$$٣س = ٦ \quad \therefore س = ٢$$

أي :  $ص = ٠$  ،  $س = ٢$ 

يمثلها الخط المستقيم باللون البنّي

و هو يمر بنقطة الأصل ( ٠ ، ٠ )

كما بالشكل المقابل :

س	٠	١	-١
ص	٠	-٢	٢

(٦) مثل بيانياً العلاقة :  $٣س = ٦ - ٢ص$ 

- |   |   |
|---|---|
| بوضع س = ....                           | ∴ $٣ \times \dots - ٢ \times \dots = ٦$ |
| ∴ $٣ \times \dots = ٦ + ٢ \times \dots$ | ∴ $٣ \times \dots = ٦ + ٢ \times \dots$ |
| بوضع س = ....                           | ∴ $٣ \times \dots - ٢ \times \dots = ٦$ |
| ∴ $٣ \times \dots = ٦ + ٢ \times \dots$ | ∴ $٣ \times \dots = ٦ + ٢ \times \dots$ |
| بوضع س = ....                           | ∴ $٣ \times \dots - ٢ \times \dots = ٦$ |
| ∴ $٣ \times \dots = ٦ + ٢ \times \dots$ | ∴ $٣ \times \dots = ٦ + ٢ \times \dots$ |


س	٠	١	-١
ص	٠	-٢	٢

أحمد الشنتوري




(٩) ارسم المستقيم الممثل للعلاقة :  $٢س + ٣ص = ٦$  ، و إذا كان هذا المستقيم يقطع محور السينات في النقطة  $٨$  ، و يقطع محور الصادات في النقطة  $ب$  ، أوجد مساحة المثلث و  $٨$  ب حيث ( و ) نقطة الأصل

س	.	....	....
ص	....	.	....



(٧) أوجد نقط تقاطع المستقيم :  $٢س - ص = ٤$  مع محوري الإحداثيات ثم أرسم هذا المستقيم

س	.	....	....
ص	....	.	....



(٨) إذا كان المستقيم الممثل للعلاقة :  $٢س - ص = ٨$  يقطع محور السينات في النقطة ( ٣ ، ٢ ) أوجد قيمة كل من :  $٨$  ، ٢

## الدرس الثاني : ميل الخط المستقيم و تطبيقات حياتية

تمهيد :

إذا تحركت نقطة على خط مستقيم  
ل من الموضع م (س<sub>١</sub> ، ص<sub>١</sub>)  
إلى الموضع ب (س<sub>٢</sub> ، ص<sub>٢</sub>)  
حيث : س<sub>٢</sub> < س<sub>١</sub> ، و كل من  
م ، ب ∈ المستقيم ل فإن :  
(١) التغير في الإحداثي السيني

$$= س_٢ - س_١$$

و يسمى بالتغير الأفقي

(٢) التغير في الإحداثي الصادي = ص<sub>٢</sub> - ص<sub>١</sub>

و يسمى بالتغير الرأسى

(من الممكن أن يكون موجباً أو سالباً أو مساوياً للصفر)

(٣) النسبة بين التغير في الإحداثي الصادي و التغير في الإحداثي السيني

تسمى ميل الخط المستقيم و يرمز له بالرمز ( م )

مما سبق نستنتج :

$$\text{ميل الخط المستقيم} = \frac{\text{التغير في الإحداثي الصادي}}{\text{التغير في الإحداثي السيني}} = \frac{\text{التغير الرأسى}}{\text{التغير الأفقى}}$$

$$م = \frac{ص_٢ - ص_١}{س_٢ - س_١} \quad \text{حيث : } س_٢ < س_١$$

الحالات المختلفة للتغير الرأسى ( ص<sub>٢</sub> - ص<sub>١</sub> ) :

(١) إذا كانت : م (٢ ، ١) ،

ب (٣ ، ٤) فإن :

$$\text{ميل } \vec{MB} = \frac{٢ - ٣}{١ - ٤} = \frac{١}{٣}$$

نلاحظ :



(١) تحركت نقطة م على

الخط المستقيم لأعلى

لتصل إلى نقطة ب

(٢) ص<sub>٢</sub> < ص<sub>١</sub> أى أن : ص تزداد بزيادة س

(٣) ميل المستقيم = عدد موجب ( ٢ &lt; ٠ )



(٢) إذا كانت : م (٤ ، ٠) ،

ب (١ ، ٢) فإن :

$$\text{ميل } \vec{MB} = \frac{٤ - ١}{٠ - ٢} = -\frac{٣}{٢}$$

نلاحظ :

(١) تحركت نقطة م على

الخط المستقيم لأسفل

لتصل إلى نقطة ب

(٢) ص<sub>٢</sub> > ص<sub>١</sub> أى أن : ص تقل بزيادة س

(٣) ميل المستقيم = عدد سالب ( ٢ &gt; ٠ )



(١) أوجد ميل الخط المستقيم المار بكل نقطتين مما يلي :

[١]  $P(1, 1)$  ،  $B(2, 4)$

[٢]  $P(0, 3)$  ،  $B(0, 6)$

[٣]  $P(2, -2)$  ، نقطة الأصل

[٤]  $P(-1, 3)$  ،  $B(-2, 4)$

[٣] إذا كانت :  $P(-1, 2)$  ،

$B(3, 2)$  فإن :

$$\text{ميل } \overrightarrow{PB} = \frac{2-2}{(1-)-3} = \frac{0}{-4} = 0$$

نلاحظ : (١) تحركت نقطة  $P$  أفقياً لتصل إلى نقطة  $B$

(٢)  $s_1 = s_2$

أي أن :  $s$  ثابتة بتغير  $s$

(٣) ميل المستقيم  $= 0$  (  $m = 0$  )

أي أن : ميل المستقيم الموازي لمحور السينات  $= 0$

[٤] إذا كانت :  $P(1, 2)$  ،

$B(2, 4)$  فإن :

لا يمكن حساب الميل لأن تعريف الميل يشترط وجود تغير في الإحداثي السيني



أي :  $s_1 - s_2 \neq 0$

نلاحظ : (١) تحركت نقطة  $P$  رأسياً لتصل إلى نقطة  $B$

(٢)  $s_1 = s_2$

(٣) ميل المستقيم غير معرف

أي أن : ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات غير معرف



أحمد الشنتوري

(٢) إذا كان : ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(-1, 1)$  ،  $(6, 6)$  يساوي 0 أوجد قيمة : س

(٤) إذا كان : ميل المستقيم المار بالنقط  $(3, -1)$  ،  $(6, 1)$  ، (٩، ص) يساوي  $\frac{2}{3}$  أوجد قيمة كل من : س ، ص

أحمد الشنتوري

(٣) إذا كان : ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(1, ص)$  ،  $(-1, 0)$  يساوي  $\frac{3}{4}$  أوجد قيمة : ص


(٥) إذا كان :  $P(2, -1)$  ،  $B(3, 2)$  ،  $C(4, 0)$  أوجد ميل كل من  $\overrightarrow{PB}$  ،  $\overrightarrow{BC}$  ،  $\overrightarrow{CP}$  ثم أذكر ماذا تلاحظ ؟

(٦) إذا كان المستقيم المار بالنقطتين  $(٢, ٤)$  ،  $(٣, ٧)$  يوازي محور السينات أوجد قيمة :  $٧$

(٨) أوجد ميل المستقيم  $\vec{AB}$  حيث :  $A(-١, ٣)$  ،  $B(٢, ٥)$  ثم بين ما إذا كانت النقطة  $C(٨, ١)$  تقع على  $\vec{AB}$  أم لا ؟

أحمد الشنتوي

(٧) أثبت أن ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(١, ١)$  ،  $(٢, ١)$  يساوي ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(٣, ٣)$  ،  $(٢, -٧)$



(٩) في الشكل المقابل :  
 $\vec{AB}$  د مثلث ، أكمل  
 باستخدام أحد الكلمات :  
 ( موجب ، سالب ،  
 صفر ، غير معرف )

[١] ميل  $\vec{AB}$  ....

[٢] ميل  $\vec{BC}$  ....

[٣] ميل  $\vec{AC}$  ....

[٤] ميل  $\vec{AB}$  ....

(٣) ميل  $\overrightarrow{AB} = \frac{20 - 20}{2 - 2} =$  صفر و هو يعنى أن رأس مال الشركة

كان ثابتاً خلال السنتين الثالثة و الرابعة

(٤) ميل  $\overrightarrow{AC} = \frac{20 - 30}{2 - 1} = -10$  و هو يعبر عن تناقص رأس مال

الشركة خلال السنتين الأخيرتين بمعدل 10 آلاف جنيه

( أى : 10 آلاف جنيه لكل سنة )

(٥) رأس مال الشركة عند بدء العمل = الإحداثى الصادى عند P = 20 ألف جنيه

ملاحظات :

(١) إذا كان : الميل موجب فإن : معدل التغير يتزايد

(٢) إذا كان : الميل سالب فإن : معدل التغير يتناقص

(٣) إذا كان : الميل = صفر فإن : معدل التغير ثابت

(٤) تمثل العلاقة بين المتغيرين فى الربع الأول على الشبكة التربيعية المتعامدة

(٥) إذا كان الميل موجب و قطع المستقيم محور الصادات فى النقطة

( . ، ص ) فإن : ص تعبر عن القيمة الابتدائية ( الصغرى ) للمتغير ص

(٦) إذا كان الميل سالب و قطع المستقيم محور الصادات فى النقطة

( . ، ص ) فإن : ص تعبر عن القيمة النهائية ( العظمى ) للمتغير ص

تطبيقات حياتية على ميل الخط المستقيم :  
نعلم أن :

إذا كانت هناك علاقة خطية بين متغيرين س ، ص فإن :

ميل الخط المستقيم الذى يمثل هذه العلاقة =  $\frac{\text{التغير فى الإحداثى الصادى}}{\text{التغير فى الإحداثى السينى}}$

أى أن : ميل الخط المستقيم ( م ) يعبر عن معدل التغير فى ص بالنسبة إلى س

و يوجد فى حياتنا العديد من التطبيقات الحياتية كتطبيق على العلاقة بين متغيرين و التى نحتاج فيها لمعرفة معدل التغير مثل :  
التغير فى حركة سيارة أو دراجة - التغير فى استهلاك الوقود -  
التغير فى رأس مال إحدى الشركات .... الخ

تطبيق (١) : الشكل المقابل

يوضح تغير رأس مال شركة خلال 7 سنوات و منه نلاحظ :

(١) P = ( 20 ، 0 ) ، B = ( 20 ، 2 )


، C = ( 20 ، 4 ) ، E = ( 30 ، 6 )

(٢) ميل  $\overrightarrow{AB} = \frac{20 - 20}{2 - 0} = 10$

و هو يعبر عن تزايد رأس مال الشركة خلال أول

سنتين بمعدل 10 آلاف جنيه

( أى : 10 آلاف جنيه لكل سنة )





[٤] القطعة المستقيمة الأفقية تبين توقف الدراجة لمدة ساعة بعد أن

تحركت مسافة ٥. كم ، ثم تبدأ رحلة العودة

[٥] المسافة الكلية = ١٠. كم ، و الزمن الكلي = ١. ث

[٦] السرعة المتوسطة للدراجة خلال الرحلة كلها =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$

$$= \frac{10}{1} = 10 \text{ كم / س}$$

ملاحظات :

(١) إذا كانت السيارة أو الدراجة أو .... تقطع مسافات متساوية في

أزمنة متساوية فإنها تتحرك بسرعة منتظمة و الذي يحددها ميل

المستقيم الذي يمثل العلاقة بين السرعة و الزمن أي أن :

السرعة المنتظمة للسيارة (ع) = معدل التغير في المسافة (ف)


بالنسبة للزمن (س) = ميل المستقيم (٢)

، و إذا كانت هذه العلاقة لا تمثل خط مستقيم واحد بل عدة قطع

مستقيمة فإن :

$$\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \text{السرعة المتوسطة}$$

تطبيق (٣) :



ملأ شخص خزان سيارته بالوقود و سعة

هذا الخزان ٤. لتراً و بعد أن تحرك

١٢. كم وجد أن المؤشر يوضح أن

المتبقى  $\frac{3}{4}$  الخزان

لرسم الشكل البياني الذي يوضح العلاقة بين كمية الوقود بالخزان و المسافة التي قطعها السيارة

(٧) إذا كان الميل موجب و قطع المستقيم محور السينات في النقطة

(س ، ٠) فإن : س تعبر عن القيمة الابتدائية (الصغرى)

للمتغير س

(٨) إذا كان الميل سالب و قطع المستقيم محور السينات في النقطة

(س ، ٠) فإن : س تعبر عن القيمة النهائية (العظمى)

للمتغير س

تطبيق (٢) : الشكل المقابل :

يوضح حركة دراجة حيث الزمن س

بالساعة ، و المسافة ف بالكيلو متر

بين مدينتين ذهاباً و عودة

و منه نلاحظ :

$$[١] \quad \text{ب} = (٠, ٤) , \text{ع} = (١٠, ٠)$$

$$\text{د} = (٥, ٦) , \text{هـ} = (٠, ١٠)$$

$$\text{ف} = (٠, ٤)$$

[٢] السرعة المنتظمة للدراجة خلال رحلة الذهاب = ميل  $\overrightarrow{\text{ب د}}$


$$= \frac{6 - 4}{5 - 0} = 12,0 \text{ كم / س}$$

[٣] السرعة المنتظمة للدراجة خلال رحلة العودة = ميل  $\overrightarrow{\text{د هـ}}$

$$= \frac{0 - 6}{0 - 5} = 1,2 \text{ كم / س}$$

و الإشارة السالبة تعنى أن الدراجة تتحرك في عكس اتجاه حركتها

الأولى بسرعة ١. كم / س

رأس المال  
بالآلاف الجنيهات

(١) الشكل المقابل :

يوضح تغير رأس مال  
شركة خلال ٨ سنوات  
أكمل ما يلي :

$$[١] \quad P = ( \dots , \dots )$$

$$B = ( \dots , \dots )$$

$$C = ( \dots , \dots )$$

$$E = ( \dots , \dots )$$

$$[٢] \quad \text{ميل } \overrightarrow{PB} = \dots$$

$$\dots = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots}$$

و هو يعبر عن ....

$$[٣] \quad \text{ميل } \overrightarrow{BC} = \dots = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots}$$

و هو يعبر عن ....


$$[٤] \quad \text{ميل } \overrightarrow{CE} = \dots = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots}$$

و هو يعبر عن ....

[٥] رأس مال الشركة عند بدء العمل = الإحداثي الصادي عند ....

= .... ألف جنيه

أحمد الشنتوي

كمية الوقود  
( لتر )

حيث العلاقة خطية نلاحظ أن :

(١) عند البدء :  $P = (0, 4)$

أى أن : المسافة المقطوعة

( ف ) = . كم ، و كمية

الوقود المتبقية = ٤. لتراً

(٢) بعد قطع مسافة ١٢. كم

:  $B = (12, 3)$

أى أن : ف = ١٢. كم

، و كمية الوقود

المتبقية = ٣. لتراً

$$\text{و يكون : ميل } \overrightarrow{PB} = \frac{4 - 3}{0 - 12} = -\frac{1}{12}$$

و هذا يعنى أن كمية الوقود تتناقص بمعدل لتر واحد كل ١٢ ساعة

(٣) يفرغ الخزان عندما تقطع السيارة مسافة =  $\frac{\text{كمية الوقود}}{\text{معدل النقص}}$


$$= \frac{4}{\frac{1}{12}} = 48 \text{ كم}$$

،  $\overrightarrow{PB}$  يقطع المحور الأفقى ( محور المسافة ) فى النقطة  $(0, 48)$



## (٢) الشكل المقابل :

يوضح العلاقة بين المسافة بالكيلومتر و الزمن بالساعة لحركة سيارة بين مدينتين ذهاباً و عودة  
أكمل ما يلي :



[١]  $P = ( \dots , \dots )$  ،

ب =  $( \dots , \dots )$  ،

ح =  $( \dots , \dots )$  ،

ع =  $( \dots , \dots )$

[٢] السرعة المنتظمة للسيارة خلال رحلة الذهاب = ميل  $\vec{P}$  ب

$$= \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots} = \dots \text{ كم / س}$$

[٣] المسافة الكلية خلال رحلة العودة = ... كم

[٤] الزمن الكلي خلال رحلة العودة = ... ساعة


[٥] سرعة المتوسطة للسيارة خلال رحلة العودة =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$

$$= \frac{\dots}{\dots} = \dots \text{ كم / س}$$

[٦] القطعة المستقيمة الأفقية بالشكل تدل على ...

## (٣)

ملأ محمد خزان سيارته بالوقود الشكل المقابل يمثل العلاقة بين العلاقة بين الزمن بالساعة و كمية الوقود المتبقية بالتر  
أكمل ما يلي :



[١] أكبر سعة للخزان = ... لتر

[٢] يفرغ الخزان بعد مرور ... ساعة

[٣] بعد مرور ١٥ ساعة

يتبقى بالخزان ... لتر ( ساعة )

[٤] يتبقى بالخزان ١٠ لتر بعد مرور ... ساعة

[٥]  $P = ( \dots , \dots )$  ،  $B = ( \dots , \dots )$

[٦] ميل  $\vec{P}$  ب =  $\frac{\dots - \dots}{\dots - \dots} = \dots$

[٧] معدل استهلاك الوقود في الساعة الواحدة = ... لتر / ساعة

أحمد الشنتوري

[٢] عمق البئر قبل بدء عمل الحفار = .... متر

[٣] عمق البئر بعد انتهاء عمل الحفار = .... متر

[٣] الزمن الكلي الذي أستغرقه الحفار في الحفر = .... ساعات

[٤] ميل  $\vec{AB}$  =  $\frac{\text{....} - \text{....}}{\text{....} - \text{....}}$  = ....

[٨] متوسط العمق الذي يحفره الحفار في الخمس ساعات الأولى

= .... متر / ساعة

[٦] ميل  $\vec{CD}$  =  $\frac{\text{....} - \text{....}}{\text{....} - \text{....}}$  = ....

[٧] متوسط العمق الذي يحفره الحفار في الساعتين الأخيرتين

= .... متر / ساعة

(٦) قرأ شخص جزءاً من كتاب عدد صفحاته ٦٠ صفحة فإذا كانت العلاقة

التي تربط عدد الصفحات المتبقية (ص) ، و الزمن اللازم لقراءتها

(ن) بالدقيقة تتعين بالعلاقة :  $ص = ٣٠ - \frac{١}{٢}ن$

أكمل ما يلي :

[١] عدد الصفحات التي سبق لهذا الشخص قراءتها = .... صفحة

[٢] الزمن اللازم لقراءة بقية الصفحات = .... دقيقة

(٤) تقرأ سهير كتاب ، و الشكل المقابل يمثل

العلاقة بين الزمن بالساعة و عدد الصفحات المتبقية أكمل ما يلي :

[١] عدد صفحات الكتاب المتبقية عند

بداية القراءة = .... صفحة

[٢]  $P = ( \text{....} , \text{....} )$  ،

$B = ( \text{....} , \text{....} )$

[٣] ميل  $\vec{PB}$  =  $\frac{\text{....} - \text{....}}{\text{....} - \text{....}}$  = ....

[٤] معدل الصفحات المقرؤة في الساعة الواحدة = .... صفحة / ساعة

و يعني ....

[٥] تنهى سهير قراءة الكتاب بعد .... ساعات

(٥) أستأجر مزارع حفاراً ليستكمل حفر بئر

و الشكل المقابل يوضح العلاقة بين عمق

البئر بالمتر و الزمن بالساعة



أكمل ما يلي :

[١]  $P = ( \text{....} , \text{....} )$  ،

$B = ( \text{....} , \text{....} )$  ،

$C = ( \text{....} , \text{....} )$  ،

$E = ( \text{....} , \text{....} )$



## الوحدة الثالثة

## الإحصاء

## الدرس الأول : جمع البيانات و تنظيمها

نظم أن :

البيانات الإحصائية حول ظاهرة ما تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما :

(١) بيانات وصفية : هي بيانات تكتب في صورة صفات مثل :

مكان الميلاد ، الحالة الاجتماعية ، اللون المفضل ، .... إلخ

(٢) بيانات كمية : هي بيانات تكتب في صورة أعداد مثل :

العمر ، الطول ، الوزن ، عدد الأبناء ، .... إلخ

جمع البيانات :

تجمع البيانات في صورة :

(١) بيانات ابتدائية : عن طريق استبيان أو كشوف ملاحظة

(٢) بيانات ثانوية : عن طريق مصادر مثل النشرات أو الكتب أو

الأنترنت أو الوثائق

(٣) بيانات تجريبية : عن طريق التجارب لأختبار صحة نظرية ما

تنظيم و تحليل البيانات :

لعرض مجموعة من البيانات يلزم تنظيم عرضها بطريقة تساعد على

الإلمام بها والاستفادة منها لذا يتم ترتيب البيانات و تنظيمها في جداول

للتوضيح طبيعتها و ليسهل استنتاج المعلومات و من هذه الجداول :

الجدول التكراري البسيط :

يستخدم لعرض الأعداد الصغيرة و البسيطة

تتضح خطوات تكوين جدول تكراري بسيط من خلال المثال التالي :

في بداية العام الدراسي أستطلع معلم فصل به ٣٥ تلميذ بإحدى المدارس رأى متعلمي هذا الصف بالمدرسة عن الأنشطة المدرسية التي يفضلون الانضمام إليها فكانت البيانات على النحو التالي :

رياضي	ثقافي	رياضي	اجتماعي	فني	رياضي	اجتماعي
رياضي	اجتماعي	فني	ثقافي	رياضي	اجتماعي	فني
اجتماعي	فني	رياضي	اجتماعي	رياضي	رياضي	اجتماعي
فني	رياضي	رياضي	ثقافي	اجتماعي	فني	رياضي
ثقافي	ثقافي	رياضي	فني	رياضي	اجتماعي	فني

لكي يتم حصر هذه البيانات أو تجميعها نستخدم جدول تفريغ بيانات تكراري كالتالي :

النشاط	العلامات	التكرارات
رياضي	III IIII IIII	١٣
اجتماعي	IIII IIII	٩
فني	I IIII	٨
ثقافي	IIII	٥
المجموع		٣٥

و باستبعاد عمود العلامات من جدول تفريغ البيانات التكراري نحصل على ( جدول التوزيع التكراري البسيط ) و هو كما يلي :

النشاط	رياضي	اجتماعي	فني	ثقافي	المجموع
عدد التلاميذ	١٣	٩	٨	٥	٣٥



أي أن : كل مجموعة تحتوي على ٥ أعداد

(٣) تصبح المجموعات الجزئية كما يلي :

المجموعة الأولى : تحتوي الدرجات من ٢ حتى أقل من ٧  
ويعبر عنها : ٢ -

المجموعة الثانية : تحتوي الدرجات من ٧ حتى أقل من ١٢  
ويعبر عنها : ٧ - ، .... وهكذا

(٤) تفرغ البيانات في جدول تفرغ بيانات تكراري كما يلي :

المجموعات	العلامات	التكرار
٢ -	//	٢
٧ -	////	٤
١٢ -	//// <del>////</del>	٩
١٧ -	// <del>////</del> <del>////</del>	١٢
٢٢ -	///	٣
أحمد الشنتوي	المجموع	٣٠

(٥) و باستبعاد عمود العلامات من جدول تفرغ البيانات التكراري

نحصل على : ( الجدول التكراري ذي المجموعات )  
و هو كما يلي :

المجموعات	٢ -	٧ -	١٢ -	١٧ -	٢٢ -	المجموع
التكرار	٢	٤	٩	١٢	٣	٣٠

و لكن في احيان كثيرة تكون البيانات الإحصائية أعداد كبيرة مثل أجور موظفي إحدى الوزارات ، ودرجات طلاب شهادة الثانوية العامة لذلك فإن تبويب مثل هذه البيانات في جدول تكرارية بسيط يجعله كبيراً جداً و طويلاً و غير مجد لمعرفة و استنتاج أي معلومات لذلك نلجأ إلى الجدول التكراري ذي المجموعات

**تنظيم البيانات و عرضها في جداول تكرارية :**

تتضح خطوات تكوين جدول تكراري ذي مجموعات من خلال المثال التالي :

فيما يلي بيان بالدرجات التي حصل عليها ٣٠ طالباً في إحدى الاختبارات

٢٠	١٥	٥	١٦	٢٢	١٠	١٩	٢٤	١٧	١٣
١٤	٢٣	١٨	٤	١٩	٢١	٩	١٩	٧	٢٠
٨	١٦	٢٠	٢١	١٤	١٣	٢٢	١٣	٢٠	١٦

لتكوين الجدول التكراري ذي المجموعات نتبع الخطوات التالية :

(١) تحديد أكبر قيمة و أصغر قيمة :

نجد : أكبر قيمة = ٢٤ ، و أصغر قيمة = ٢

أي : إذا اعتبرنا أن مجموعة هذه البيانات هي سـ

فإن : سـ = { س : ٢ ≤ س ≤ ٢٤ }

أي أن : قيم سـ تبدأ من ٢ و تنتهي عند ٢٤

و بالتالي فإن : المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة = ٢٢ = ٢٤ - ٢

(٢) نجزي المجموعة سـ إلى عدد من المجموعات الجزئية و المتساوية

المدى و ليكن ٥ مجموعات

$$\therefore \text{مدى المجموعة} = \frac{22}{5} = 4 \frac{2}{5} \approx 5$$

[٣] كون جدول تكراري ذي مجموعات لهذه البيانات

المجموعات	- ٢٠	- ١٥					المجموع
التكرار							

[٤] عدد الأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٢٥ كجم = .... طفل

[٥] عدد الأطفال الذين أوزانهم ٢٥ كجم فأكثر = .... طفل

(٢) البيانات التالية تبين يبين عدد التلاميذ المترددين على مكتبة مشتركة في مشروع ( القراءة للجميع ) خلال ٣٠ يوماً

٤٠	٤٦	٣٢	٣٨	٣٠	٤٧	٣٨	٤٢	٣٣
٢٠	٣٤	٣٥	٤٨	٥٠	٢٧	٤٣	٢٧	٣٤
٣٩	٢٤	٢٢	٤٢	٥٠	٤٤	٤٠	٣٨	٢٨

[١] أكمل :

(١) أكبر قيمة = ....

(٢) أصغر قيمة = ....

(٣) المدى = .... - .... = ....

[٢] كون جدول تكراري ذي مجموعات لهذه البيانات بحيث تكون مجموعاته متساوية الطول و طول كل منها ٥ تلاميذ

(١) البيانات التالية تبين أوزان ٤٠ طفل بالكيلو جرامات

٤٣	٣٣	٣١	١٥	٤٤	٢٤	٣٤	٣٩	٢٧	٣٨
٤٢	٢٥	٢٩	٢١	٢٩	٣٠	٣٣	٢٦	٣٣	٣٧
٤٠	٢٦	٣٢	٢١	٢٥	٣٠	٣٦	٣٢	٢٣	٣٦
٢٩	٣٥	٢٧	٣٤	٢٨	٢٢	٣١	١٩	٢٨	٣١

[١] أكمل :

(١) أكبر قيمة = .... (٢) أصغر قيمة = ....

(٣) المدى = .... - .... = ....

(٤) ليكن عدد المجموعات = ٦ مجموعات

يكون : المدى =  $\frac{\text{المدى}}{\text{عدد المجموعات}}$  = ....

[٢] كون جدول تفريغ بيانات تكراري لهذه البيانات

المجموعات	العلامات	التكرار
- ١٥		
- ٢٠		
أحمد الشنتوي	المجموع	

المجموعات	العلامات	التكرار
- ٢٠		
- ٢٥		
المجموع		

المجموعات	- ٢٠	- ٢٥				المجموع
التكرار						

(٣) فيما يلي الأجر الأسبوعي لأربعين عاملاً في أحد المصانع

٥٧	٨٩	٣٦	٩٤	٦٤	٥٤	٥٤	٧١	٦٢	٤٧
٥١	٦١	٤٤	٥٢	٧٠	٦٦	٥٦	٣٦	٦٩	٣٢
٩٩	٤٨	٦٧	٩٠	٥٥	٧٩	٩٦	٧٧	٦٠	٦٥
٥٩	٤٨	٩٤	٤٩	٣٨	٨٤	٧٨	٧٥	٩٥	٨١

كون جدول تكراري ذي مجموعات متخذاً المجموعات الجزئية :  
 ( - ٣٠ ، - ٤٠ ، - ٥٠ ، .... ، - ٩٠ ) ثم حدد المجموعة  
 التي بها أكبر تكرار ، و المجموعة التي بها أقل تكرار



الحدود العليا للمجموعات					التكرار المتجمع الصاعد				
أقل من ١٠					٠				
أقل من ٢٠					٠ + ٤ = ٤				
أقل من ٣٠					٤ + ٨ = ١٢				
أقل من ٤٠					١٢ + ١٢ = ٢٤				
أقل من ٥٠					٢٤ + ١٠ = ٣٤				
أقل من ٦٠					٣٤ + ٦ = ٤٠				

أى :

جدول التكرار المتجمع الصاعد	
الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
أقل من ١٠	٠
أقل من ٢٠	٤
أقل من ٣٠	١٢
أقل من ٤٠	٢٤
أقل من ٥٠	٣٤
أقل من ٦٠	٤٠

### الدرس الثانى : الجدول التكرارى المتجمع الصاعد و الجدول التكرارى المتجمع النازل و تمثيلهما بيانياً

هناك تساؤلات تحتاج الإجابة عنها إلى تنظيم البيانات بشكل منظم تتيح دراستها بطريقة سهلة و ذلك بوضعها فى جدول يسمى الجدول التكرارى المتجمع و فيه تجمع البيانات على التوالى من أحد طرفى الجدول إلى الطرف الآخر حتى نحصل على التكرار الكلى و هناك نوعان من الجدول التكرارى المتجمع هما :

#### أولاً : الجدول التكرارى المتجمع الصاعد و تمثيله بيانياً

فيه تجمع البيانات من جهة المجموعة الصغيرة إلى المجموعة الكبيرة كما بالمثال التالى :

الجدول التالى يبين التوزيع التكرارى لدرجات ٤٠ تلميذاً فى أحد الاختبارات

المجموعات	١٠ -	٢٠ -	٣٠ -	٤٠ -	٥٠ -	المجموع
التكرار	٤	٨	١٢	١٠	٦	٤٠

نكون الجدول التكرارى المتجمع الصاعد كما بالخطوات التالية :

(١) نكون جدول من عمودين

(٢) العمود الأول للحدود العليا للمجموعات و نكتب فيه المجموعات

من أول مجموعة إلى آخر مجموعة و نكتب قبل كل مجموعة ( أقل من )

(٣) العمود الثانى للتكرار المتجمع الصاعد و نبدأ بـ ( صفر ) أمام

أول مجموعة ثم نجمع التكرارات بالتتابع حتى نصل إلى مجموع

التكرارات أمام آخر مجموعة

فنحصل على :

ثانياً : الجدول التكراري المتجمع النازل وتمثيله بيانياً  
فيه تجمع البيانات من جهة المجموعة الكبيرة إلى المجموعة الصغيرة  
كما بالمثال التالي :  
الجدول التالي يبين التوزيع التكراري لدرجات ٤- تلميذاً في أحد الاختبارات

المجموعات	- ١٠	- ٢٠	- ٣٠	- ٤٠	- ٥٠	المجموع
التكرار	٤	٨	١٢	١٠	٦	٤٠


نكون الجدول التكراري المتجمع الصاعد كما بالخطوات التالية :  
(١) نكون جدول من عمودين

(٢) العمود الأول للحدود السفلى للمجموعات و نكتب فيه المجموعات  
من أول مجموعة إلى آخر مجموعة و نكتب بعد كل مجموعة  
( فأكثر )

(٣) العمود الثاني للتكرار المتجمع النازل و نبدأ بـ ( صفر ) أمام  
آخر مجموعة ثم نجمع التكرارات بالتتابع حتى نصل إلى مجموع  
التكرارات أمام أول مجموعة فنحصل على :

الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد			
١٠ فأكثر	٣٦	+	٤	= ٤٠
٢٠ فأكثر	٢٨	+	٨	= ٣٦
٣٠ فأكثر	١٦	+	١٢	= ٢٨
٤٠ فأكثر	٦	+	١٠	= ١٦
٥٠ فأكثر	٠	+	٦	= ٦
٦٠ فأكثر				٠


و لتمثيل الجدول التكراري المتجمع الصاعد نتبع الخطوات التالية :  
(١) نخصص المحور الأفقي للمجموعات و المحور الرأسى للتكرار  
المتجمع الصاعد  
(٢) نختار مقياساً للرسم على المحور الرأسى بحيث يتسع المحور  
للتكرار الكلى المتجمع الصاعد  
(٣) نمثل التكرار المتجمع الصاعد لكل مجموعة و نرسم الخط البياني  
لها بالتتابع  
كما بالشكل التالي :



و نلاحظ :

- (١) لا يوجد تلاميذ تقل درجاتهم عن ١٠ درجات
- (٢) عدد التلاميذ الذين تقل درجاتهم عن ٣٠ درجات = ١٢ تلميذاً
- (٣) إذا كانت درجة النجاح هي ٣٠ درجة فإن :  
عدد التلاميذ الراسبين = ١٢ تلميذاً

أى :



و نلاحظ :

(١) لا يوجد تلاميذ درجاتهم ٤. درجة فأكثر

(٢) عدد التلاميذ الذين درجاتهم ٣. درجة فأكثر = ٢٨ تلميذاً

(٣) إذا كانت درجة النجاح هي ٣. درجة فإن :

عدد التلاميذ الناجحين = ٢٨ تلميذاً

لأمانة العلمية  
يرجى عدم حذف أسمى نهائياً  
يسمح فقط بإعادة النشر  
دون أى تعديل

جدول التكرار المتجمع النازل	
الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
١. فأكثر	٤٠
٢. فأكثر	٣٦
٣. فأكثر	٢٨
٤. فأكثر	١٦
٥. فأكثر	٦
٦. فأكثر	٠

و لتمثيل الجدول التكرارى المتجمع الصاعد نتبع الخطوات التالية :

(١) نخصص المحور الأفقى للمجموعات و المحور الرأسى للتكرار المتجمع الصاعد

(٢) نختار مقياساً للرسم على المحور الرأسى بحيث يتسع المحور للتكرار الكلى المتجمع الصاعد

(٣) نمثل التكرار المتجمع الصاعد لكل مجموعة و نرسم الخط البياني لها بالتتابع  
كما بالشكل التالى :



(٢) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري لعدد ١٠٠ مصنع حسب ساعات العمل الأسبوعية

المجموعات	- ١٠٠	- ٩٠	- ٨٠	- ٧٠	- ٦٠	- ٥٠	التكرار
المجموع	١٠٠	١٢	١٥	٢٢	٣٠	١٦	٥


ارسم المنحنى التكراري للمتجمع الصاعد ثم أوجد :

[١] عدد المصانع التي تعمل أقل من ٧٥ ساعة في الأسبوع = ....

[٢] النسبة المئوية لعدد المصانع التي تعمل أقل من ٧٥ ساعة

في الأسبوع = ....

جدول التكرار المتجمع الصاعد	
الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٥٠	....
أقل من ٦٠	....
أقل من ٧٠	....
أقل من ٨٠	....
أقل من ٩٠	....
أقل من ١٠٠	....
أقل من ١١٠	....




(١) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري لأعمار ٦٠ عامل في أحد المصانع

المجموعات	- ٤٥	- ٤٠	- ٣٥	- ٣٠	- ٢٥	التكرار
المجموع	٦٠	٥	٢٣	١٩	١٠	٣

ارسم المنحنى التكراري للمتجمع الصاعد ثم أوجد :

[١] عدد العمال الذين تقل أعمارهم عن ٤١ سنة = ....

جدول التكرار المتجمع الصاعد	
الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٢٥	....
أقل من ٣٠	....
أقل من ٣٥	....
أقل من ٤٠	....
أقل من ٤٥	....
أقل من ٥٠	....



أحمد الشنتوري

(٣) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري عدد ساعات المذاكرة اليومية لتلاميذ فصل به ٥٠ تلميذ

المجموعات	-٧	-٦	-٥	-٤	-٣	-٢	-١	المجموع
التكرار	٦	٧	١٥	١٢	٥	٣	٢	٥٠


ارسم المنحنى التكراري المتجمع النازل ثم أوجد :

[١] عدد التلاميذ الذين يذاكرون ٦ ساعات فأكثر يومياً = ....

[٢] النسبة المئوية لعدد لتلاميذ الذين يذاكرون ٦ ساعات فأكثر يومياً

.... =

جدول التكرار المتجمع النازل	
الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
١ فأكثر	....
٢ فأكثر	....
٣ فأكثر	....
٤ فأكثر	....
٥ فأكثر	....
٦ فأكثر	....
٧ فأكثر	....
٨ فأكثر	....



أحمد الشنتوري

(٤) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري أوزان ٦٠ شخصاً بالكيلو جرام


المجموعات	-٨٥	-٨٠	-٧٥	-٧٠	-٦٥	-٦٠	-٥٥	المجموع
التكرار	٦٠	٢	٣	٧	س	١٨	١٢	٨

ارسم المنحنى التكراري المتجمع النازل ثم أوجد :


[١] س = ....

[٢] عدد الأشخاص الذين يزن كل منهم ٦٨ كجم فأكثر = ....

جدول التكرار المتجمع النازل	
الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
٥٥ فأكثر	....
٦٠ فأكثر	....
٦٥ فأكثر	....
٧٠ فأكثر	....
٧٥ فأكثر	....
٨٠ فأكثر	....
٨٥ فأكثر	....
٩٠ فأكثر	....







(٥) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري درجات ١٠٠ طالب في إحدى المواد

المجموعات	٢٠ -	٣٠ -	٤٠ -	٥٠ -	٦٠ -	٧٠ -	٨٠ -	٩٠ -	المجموع
التكرار	٣٠	٧٠	١٦٠	٢٦٠	١٥٠	١٣٠	١١٠	٩٠	١٠٠٠

ارسم المنحنيين التكراريين المتجمعين الصاعد و النازل في نفس ورقة الرسم البياني ثم أوجد :

[١] عدد الطلبة الحاصلين على أقل من ٧٥ %


[٢] عدد الطلبة الحاصلين على ٨٥ % فأكثر

جدول التكرار المتجمع الصاعد		جدول التكرار المتجمع النازل	
الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد	الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
أقل من ٢٠	....	٢٠ فأكثر	....
أقل من ٣٠	....	٣٠ فأكثر	....
أقل من ٤٠	....	٤٠ فأكثر	....
أقل من ٥٠	....	٥٠ فأكثر	....
أقل من ٦٠	....	٦٠ فأكثر	....
أقل من ٧٠	....	٧٠ فأكثر	....
أقل من ٨٠	....	٨٠ فأكثر	....
أقل من ٩٠	....	٩٠ فأكثر	....
أقل من ١٠٠	....	١٠٠ فأكثر	....

[١] عدد الطلبة الحاصلين على أقل من ٧٥ % = ....

[٢] عدد الطلبة الحاصلين على ٨٥ % فأكثر = ....

أحمد الشنتوري



(٦) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري درجات ١٠٠ طالب في إحدى المواد

المجموعات	- ٠	- ١٠	- ٢٠	- ٣٠	- ٤٠	- ٥٠	المجموع
التكرار	٨	١٤	١٥	٢٨	٢٣	١٢	١٠٠

ارسم المنحنيين التكراريين المتجمعين الصاعد و النازل في نفس ورقة الرسم البياني ثم أوجد :

[١] عدد الطلبة الحاصلين على أقل من ٤٠ درجة

[٢] عدد الطلبة الحاصلين على ٤٠ فأكثر

[٣] النسبة المئوية لنجاح الطلاب علماً بأن النهاية الصغرى

لنجاح ٢٠ درجة

[٤] النسبة المئوية للطلاب الحاصلين على ٤٥ درجة فأكثر

الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد	الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
أقل من ٠	....	٠ فأكثر	....
أقل من ١٠	....	١٠ فأكثر	....
أقل من ٢٠	....	٢٠ فأكثر	....
أقل من ٣٠	....	٣٠ فأكثر	....
أقل من ٤٠	....	٤٠ فأكثر	....
أقل من ٥٠	....	٥٠ فأكثر	....
أقل من ٦٠	....	٦٠ فأكثر	....

[١] عدد الطلبة الحاصلين على أقل من ٤٠ درجة = ....

[٢] عدد الطلبة الحاصلين على ٤٠ فأكثر = ....

[٣] النسبة المئوية لنجاح الطلاب علماً بأن النهاية الصغرى

لنجاح ٢٠ درجة = ....

[٤] النسبة المئوية للطلاب الحاصلين على ٤٥ درجة فأكثر

= ....

أحمد الشنتوري

## الدرس الثالث : الوسط الحسابي - الوسيط - المنوال

بملاحظة التمثيلات البيانية لتوزيعات تكرارية نجد أن التكرارات تبدأ صغيرة ثم تتزايد حتى تصل إلى نهاية عظمى ثم تتناقص و هذا يعنى أن عدداً كبيراً من التكرارات يتركز عند قيمة متوسطة و أن أغلب هذه التكرارات تتقرب من قيمة متوسطة من هذه القيمة و التى تمثل مركز جذب لأغلب التكرارات و هذا السلوك فى أى توزيع تكرارى يسمى بالنزعة المركزية و أى إحصائية لتوزيع تكرارى يعتمد أساساً على دراسة هذا السلوك و قياسه و من مقاييس النزعة المركزية :  
الوسط الحسابي ( المتوسط ) ، و الوسيط ، و المنوال

أولاً : الوسط الحسابي  
نعلم أن :

الوسط الحسابي لمجموعة من القيم يتعين من العلاقة :

$$\text{الوسط الحسابي لمجموعة من القيم} = \frac{\text{مجموع هذه القيم}}{\text{عدد هذه القيم}}$$

فمثلاً :

الوسط الحسابي لمجموعة القيم : ٣ ، ٨ ، ١١ ، ٤ ، ٩

$$V = \frac{30}{5} = \frac{9 + 4 + 11 + 8 + 3}{5} =$$

ملاحظة :

$$\text{الوسط الحسابي} \times \text{عدد القيم} = \text{مجموع القيم}$$

فيكون :  $9 + 4 + 11 + 8 + 3 = 0 \times 5$   
أى أن :

## الوسط الحسابي :

هو القيمة التى لو أعطيت لكل مفردة من مفردات المجموعة لكان مجموع هذه القيم الجديدة هة نفس مجموع القيم الأصلية

(١) أكمل ما يلى :

[١] الوسط الحسابي للقيم : ٧ ، ١١ ، ١٢ هو ....

[٢] الوسط الحسابي للقيم : ٢ ، ٦ ، ٤ ، ٨ ، ٥ هو ....

[٣] إذا كان : الوسط الحسابي للقيم : ٩ ، ٦ ، ٢ ، ٥ ، ٨ هو ٧

فإن : ٢ = ....

[٤] إذا كان : الوسط الحسابي للقيم : ١ ، ٦ ، ٥ ، ٢ ، ٤ هو ٧

فإن : ٢ = ....

[٥] إذا كان : الوسط الحسابي للقيم : ١٨ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٢ ، ٢٢ - ١

هو ١٨ فإن : ٢ = ....

[٦] إذا كان : مجموع خمسة أعداد يساوى ٣٠ فإن الوسط الحسابي

لهذه الأعداد هو ....



المجموعة	مركز المجموعة (٢)	التكرار (١)	ل × ٢
- ١٠	١٥	١١	١٦٥
- ٢٠	٢٥	٢٠	٥٠٠
- ٣٠	٣٥	٣١	١٠٨٥
- ٤٠	٤٥	٢٥	١١٢٥
- ٥٠	٥٥	١٥	٨٢٥
المجموع		١٠٠	٣٧٠٠

$$(٣) \text{ الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع (ل × ٢)}}{\text{مجموع ل}} = \frac{٣٧٠٠}{١٠٠} = ٣٧$$

(٢) أوجد الوسط الحسابي للتوزيع التكراري التالي :

المجموعات	- ٥	- ١٥	- ٢٥	- ٣٥	- ٤٥	المجموع
التكرار	١٠	٢٢	٣٠	٢٥	١٣	١٠٠

المجموعة	مركز المجموعة (٢)	التكرار (١)	ل × ٢
- ٥	....	....	....
- ١٥	....	....	....
- ٢٥	....	....	....
- ٣٥	....	....	....
- ٤٥	....	....	....
المجموع		١٠٠	....

الوسط الحسابي

$$= \frac{....}{....}$$

$$= ....$$

إيجاد الوسط الحسابي لبيانات من جداول تكرارية ذات مجموعات :

لإيجاد الوسط الحسابي للتوزيع التكراري التالي :

المجموعات	- ١٠	- ٢٠	- ٣٠	- ٤٠	- ٥٠	المجموع
التكرار	١١	٢٠	٣١	٢٥	١٥	١٠٠

نتبع ما يلي :

(١) نحدد مراكز المجموعات حيث :

مركز المجموعة =  $\frac{\text{حدها الأدنى} + \text{حدها الأعلى}}{٢}$  فيكون :

$$\text{مركز المجموعة الأولى} = \frac{٢٠ + ١٠}{٢} = ١٥$$

$$\text{مركز المجموعة الثانية} = \frac{٣٠ + ٢٠}{٢} = ٢٥$$

و نظراً لأن : مدى المجموعات الجزئية متساو ،

و كل منها = ١٠

نعتبر الحد الأعلى للمجموعة الأخيرة = ١٠ فيكون :

$$\text{مركزها} = \frac{١٠ + ٥٠}{٢} = ٥٥$$

(٥) نكون الجدول الرأسي التالي :

(٤) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري لأوزان ٣٠ طفلاً :

المجموعات	- ٦	- ١٠	- ١٤	- ١٨	- ٢٢	- ٢٦	- ٣٠	المجموع
التكرار	٢	٣	٤	٨	٦	٤	٢	٣٠

$$[1] \quad ٨ = \dots$$

[٢] عدد الأطفال الذين لا يقل وزنهم عن ٢٦ كجم = ....

[٣] أوجد الوسط الحسابي لهذا التوزيع

المجموعة	مركز المجموعة (٢)	التكرار (١)	١ × ٢
- ٦	....	....	....
- ١٠	....	....	....
- ١٤	....	....	....
- ١٨	....	....	....
- ٢٢	....	....	....
- ٢٦	....	....	....
- ٣٠	....	....	....
المجموع	....	٣٠	....

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

(٣) الجدول التالي يبين الأجر اليومي لعدد ٥٠ عاملاً في أحد المصانع حيث التوزيع التكراري ذي مجموعات متساوية المدى :

المجموعات	- ٥	- ١٥	- ٢٥	- ٣٥	- ٤٥	المجموع
التكرار	٧	١٠	١ + ٨	١٣	٨	٥٠

[1] أوجد قيمة كل من : س ، ٨

$$س = \dots , ٨ = \dots$$

[٢] أوجد الوسط الحسابي لهذا التوزيع

المجموعة	مركز المجموعة (٢)	التكرار (١)	١ × ٢
- ٥	....	....	....
- ١٥	....	....	....
- ٢٥	....	....	....
- ....	....	....	....
- ٤٥	....	....	....
المجموع	....	٥٠	....

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

## ثانياً : الوسيط

هو القيمة التي تتوسط مجموعة المفردات بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً بحيث يكون عدد القيم الأصغر منها مساوياً لعدد القيم الأكبر منها

## تذكر : لإيجاد الوسيط لمجموعة من القيم نتبع التالي :

نرتب القيم تصاعدياً أو تنازلياً ثم :

(١) إذا كان : عدد القيم فردياً

فإن الوسيط هو : القيمة التي تقع في الوسط تماماً

و يكون ترتيب الوسيط هو :  $\frac{1}{2}$  ( عدد القيم + ١ )

(٢) إذا كان : عدد القيم زوجياً

فإن الوسيط =  $\frac{1}{2}$  ( مجموع القيمتين اللتين تقعان في الوسط )

## فمثلاً :

(١) لإيجاد الوسيط لمجموعة القيم : ٥ ، ٩ ، ٧ ، ٨ ، ٦ ، ٠

نرتب القيم : ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٠

و بما أن : عدد القيم هو ٥ إذن ترتيب الوسيط هو : ٣

و يكون الوسيط = ٧

(٢) الوسيط لمجموعة القيم : ١٠ ، ٤ ، ٨ ، ١ ، ٦ ، ٢ ، ٠

نرتب القيم : ٠ ، ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠

و بما أن : عدد القيم هو ٧

إذن الوسيط =  $\frac{1}{2} ( ٦ + ٤ ) = ٥$

(٥) أكمل ما يلي :

[١] الوسيط لمجموعة القيم : ٥ ، ٦ ، ٣ هو ....

[٢] الوسيط لمجموعة القيم : ٩ ، ٥ ، ٢ ، ٣ ، ٧ ، ١١ هو ....

[٣] ترتيب الوسيط للقيم : ٥ ، ٧ ، ١ ، ٦ ، ٤ هو ....

[٤] إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو الرابع فإن عدد هذه القيم هو ....

## إيجاد الوسيط لتوزيع تكراري ذي مجموعات بيانياً :

لإيجاد الوسيط لتوزيع تكراري ذي مجموعات بيانياً نتبع ما يلي :

(١) ننشأ الجدول التكراري المتجمع الصاعد أو النازل

ثم نرسم المنحنى التكراري المتجمع له

(٢) نحدد ترتيب الوسيط =  $\frac{\text{مجموع التكرارات}}{2}$

(٣) نحدد نقطة مثل ( ٥ ) على المحور الرأسى ( التكرار )

و التي تمثل ترتيب الوسيط

(٤) نرسم مستقيماً أفقياً من نقطة ( ٥ ) فيقطع المنحنى في نقطة

نرسم منها عموداً على المحور الأفقى ليقطعه في نقطة تمثل

الوسيط

## فمثلاً :

الجدول التالى يبين التوزيع التكراري لدرجات ٤ تلميذاً في أحد الاختبارات

نوجد الوسيط لهذا التوزيع التكراري كما يلي :


حل آخر :

(١) ننشأ الجدول التكراري المتجمع النازل

(٢) نحدد ترتيب الوسيط  $\frac{4}{2} = 2$ (٣) نرسم المنحنى التكراري المتجمع النازل  
و من الرسم نوجد الوسيط

جدول التكرار المتجمع النازل	
الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
١. فأكثر	٤٠
٢. فأكثر	٣٦
٣. فأكثر	٢٨
٤. فأكثر	١٦
٥. فأكثر	٦
٦. فأكثر	٠

التكرار المتجمع النازل



من الرسم : الوسيط = ٣,٨


المجموعات	- ٥٠	- ٤٠	- ٣٠	- ٢٠	- ١٠	٤
التكرار	٤٠	٦	١٠	١٢	٨	٤

(١) ننشأ الجدول التكراري المتجمع الصاعد

(٢) نحدد ترتيب الوسيط  $\frac{4}{2} = 2$ (٣) نرسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد  
و من الرسم نوجد الوسيط

جدول التكرار المتجمع الصاعد	
الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ١٠	٠
أقل من ٢٠	٤
أقل من ٣٠	١٢
أقل من ٤٠	٢٤
أقل من ٥٠	٣٤
أقل من ٦٠	٤٠

التكرار المتجمع الصاعد




من الرسم : الوسيط = ٣,٨



## حل ثالث :

نرسم كل من المنحنى المتجمع الصاعد و النازل في نفس ورقة الرسم البياني فيتقاطعا في نقطة ، من هذه النقطة نرسم مستقيماً رأسياً يقطع المحور الأفقي في نقطة تمثل الوسيط

جدول التكرار المتجمع الصاعد		جدول التكرار المتجمع النازل	
الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد	الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
أقل من ١٠	٠	١٠ فأكثر	٤٠
أقل من ٢٠	٤	٢٠ فأكثر	٣٦
أقل من ٣٠	١٢	٣٠ فأكثر	٢٨
أقل من ٤٠	٢٤	٤٠ فأكثر	١٦
أقل من ٥٠	٣٤	٥٠ فأكثر	٦
أقل من ٦٠	٤٠	٦٠ فأكثر	٠



من الرسم : الوسيط = ٣٠,٨

(٦) أوجد من منحنى التكرار المتجمع الصاعد الوسيط للتوزيع التكراري التالي :

المجموعات	-٤٠	-٤٠	-٣٠	-٣٠	-٢٠	المجموع
التكرار	٦٠	٥	٢٣	١٩	١٠	٣

جدول التكرار المتجمع الصاعد	
الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٢٠	....
أقل من ٣٠	....
أقل من ٣٠	....
أقل من ٤٠	....
أقل من ٤٠	....
أقل من ٥٠	....


∴ ترتيب الوسيط = ....

∴ من الرسم : الوسيط = ....

[١] أكمل : س = .... ، ل = .....

[٢] أوجد : الوسيط من المنحنيين المتجمعين الصاعد و النازل


جدول التكرار المتجمع الصاعد		جدول التكرار المتجمع النازل	
الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد	الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
أقل من ١٠	....	١٠ فأكثر	....
أقل من ٢٠	....	٢٠ فأكثر	....
أقل من ....	....	.... فأكثر	....
أقل من ٤٠	....	٤٠ فأكثر	....
أقل من ٥٠	....	٥٠ فأكثر	....
أقل من ٦٠	....	٦٠ فأكثر	....
أقل من ٧٠	....	٧٠ فأكثر	....



(٧) أوجد من منحنى التكرار المتجمع النازل

الوسيط للتوزيع التكراري التالي :

المجموعات	- ١٥	- ٢٠	- ٢٥	- ٣٠	- ٣٥	- ٤٠	المجموع
التكرار	١٠	١٥	٢٢	٢٥	٢٠	٨	١٠٠



جدول التكرار المتجمع النازل	
الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
١٥ فأكثر	....
٢٠ فأكثر	....
٢٥ فأكثر	....
٣٠ فأكثر	....
٣٥ فأكثر	....
٤٠ فأكثر	....
٤٥ فأكثر	....

∴ ترتيب الوسيط = ....

∴ من الرسم : الوسيط = ....

(٨) من الجدول التكراري التالي ذي المجموعات المتساوية المدى :

المجموعات	- ١٠	- ٢٠	- ٣٠	- ٤٠	- ٥٠	- ٦٠	المجموع
التكرار	١٠	١٧	٢٠	٣٢	٢٠ + ٢	٤	١٠٠



## ثالثاً : المنوال

المنوال لمجموعة من القيم هو :  
القيمة الأكثر شيوعاً ( تكراراً ) في هذه القيم

## فمثلاً :

المنوال لمجموعة القيم : ٥ ، ٨ ، ٧ ، ٥ ، ٦ ، ٨ ، ٥  
هو : ٥ لأن : ٥ القيمة الأكثر شيوعاً ( تكراراً )

## (٩) أكمل ما يلي :

[١] المنوال لمجموعة القيم : ٥ ، ٩ ، ٧ ، ٩ هو ....

[٢] المنوال لمجموعة القيم : ٤ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٧ ، ٥ ، ٤ هو ....

[٣] إذا كان : المنوال للقيم : ٥ ، ٧ ، ٩ ، ٦ ، ٤ هو ٤

فإن : ٩ = ....

[٤] إذا كان : المنوال للقيم : ١٥ ، ٩ ، ٩ ، ٢ ، ١٥ هو ٩

فإن : ٩ = ....

[٥] إذا كان : المنوال للقيم : ٦ ، ٨ ، ٩ ، ٢ ، ٦ هو ٦

فإن : ٩ = ....

## خطوات إيجاد المنوال لتوزيع تكراري ذي مجموعات بيانياً :

تتضح خطوات إيجاد المنوال لتوزيع تكراري ذي مجموعات من خلال  
المثال التالي :

المجموعات	- ١٠	- ٢٠	- ٣٠	- ٤٠	- ٥٠	المجموع
التكرار	٦	١٠	١٤	١٢	٨	٥٠

[١] رسم المدرج التكراري كما يلي :

[١] نرسم محورين أحدهما أفقياً للمجموعات والآخر رأسياً لتمثيل تكرار كل مجموعة

[٢] نقسم المحور الأفقي لعدد من الأقسام المتساوية بمقياس رسم مناسب لتمثيل المجموعات

[٣] نقسم المحور الرأسى لعدد من الأقسام المتساوية بمقياس رسم مناسب بحيث يمكن تمثيل أكبر تكرار في المجموعات

[٤] نرسم مستطيلاً قاعدته هي المجموعة ( - ١٠ ) و ارتفاعه يساوي التكرار ( ٦ )

[٥] نرسم مستطيلاً ثانياً ملاصقاً للمستطيل الأول قاعدته هي المجموعة ( - ٢٠ ) و ارتفاعه يساوي التكرار ( ١٠ )

[٦] نكرر رسم باقي المستطيلات المتلاصقة حتى آخر مجموعة ( - ٥٠ )


[٢] إيجاد المنوال من المدرج التكراري كما يلي :

لإيجاد المنوال من المدرج التكراري نلاحظ أن :

المجموعة الأكثر تكراراً هي المجموعة ( - ٣٠ ) و تسمى المجموعة المنوالية

(١١) أوجد المنوال من التوزيع التكراري التالي :

المجموعات	- ٥٥	- ٤٥	- ٣٥	- ٢٥	- ١٥	- ٥	المجموع
التكرار	٥٠	٤	٨	١٠	١٢	٩	٧




من الرسم :

المنوال = ....

(١٢) أوجد المنوال من التوزيع التكراري التالي :

المجموعات	- ٨٠	- ٧٠	- ٦٠	- ٥٠	- ٤٠	- ٣٠	المجموع
التكرار	٤٠	٦	٧	٨	١٢	٤	٣



من الرسم :

المنوال = ....

أحمد الشنتوي


نحدد نقطة تقاطع  $P$  ،  $b$  ،  $c$ 

كما بالشكل المقابل

و نسقط منها عموداً على المحور الأفقي يحدد القيمة المنوالية للتوزيع


من الرسم :

المنوال = ٣٨



(١٠) أوجد المنوال من التوزيع التكراري التالي :

المجموعات	- ٥٠	- ٤٠	- ٣٠	- ٢٠	- ١٠	المجموع
التكرار	١٠٠	١٠	٢٠	٣٠	٢٤	١٦



من الرسم :

المنوال = ....

أحمد الشنتوي



(١٣) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري ذى المجموعات متساوية المدى


لأوزان ٥٠ تلميذاً بالكيلو جرام بإحدى المدارس :

المجموعات	٣٠ -	٣٥ -	٤٠ -	٤٥ -	٥٠ -	المجموع
التكرار	٤ +	٣	٤	٣ +	٣ -	٥٠

[١] أكمل : س = .... ، ل = .....

[٢] من الرسم أكمل :

المنوال = ....



(١٤) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] الوسط الحسابي للقيم : ١٩ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٧ ، ٦ ، ٨ هو ....

( ٩٠ ، ٣٠ ، ١٨ ، ٦ )

[٢] إذا كان : الوسط الحسابي للقيم : ٣ - ل ، ١ ، ٤ ، ٥ ،

٢ + ٣ ل هو ٧ فإن : ل = ....

( ٣٥ ، ١٠ ، ٧ ، ٥ )

[٣] إذا كان : الوسط الحسابي لستة قيم هو ١٢ فإن : مجموع هذه

القيم = .... ( ٢ ، ٦ ، ١٨ ، ٧٢ )

[٤] المجموعة التى حدها الأدنى = ٢ ، حدها الأعلى = ٦ يكون

مركزها هو .... ( ٢ ، ٦ ، ٤ ، ٨ )

[٥] الوسيط لمجموعة القيم : ١٥ ، ٢٢ ، ٩ ، ١١ ، ٢٣ هو ....

( ٩ ، ١٥ ، ١٨ ، ٩٠ )

[٦] ترتيب الوسيط لمجموعة القيم : ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ هو ....

( الثالث ، الرابع ، الخامس ، السادس )

[٧] إذا كان : ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع فإن :

عدد هذه القيم يساوى .... ( ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ )

[٨] إذا كان المنوال للقيم : ٣ ، ل ، ٥ ، ٤ هو ٣ فإن :

ل = .... ( ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ )

(١٥) أكمل ما يلى :

[١] القيمة الأكثر تكراراً لمجموعة من القيم تسمى ....

[٢] نقطة تقاطع المنحنيين المتجمع الصاعد و النازل على المحور

الأفقى تعين ....

[٣] المنوال لمجموعة القيم : ١٤ ، ١١ ، ١٠ ، ١١ ، ١٤ ، ١٥ ، ١١

هو ....

[٤] إذا كان : مجموع خمسة أعداد يساوى ٣٠ فإن : الوسط

الحسابي لهذه الأعداد هو ....

أحمد الشنتوري

## الوحدة الرابعة متوسطات المثلث و المثلث المتساوي الساقين

## الدرس الأول : متوسطات المثلث

## متوسط المثلث :

هو القطعة المستقيمة المرسومة من رأس المثلث إلى منتصف الضلع المقابل لهذا الرأس  
ففي الشكل المقابل :

إذا كان :  $E$  منتصف  $PA$

فإن :  $BE$  متوسط في  $\triangle PAB$

## ملاحظة :

أي مثلث له ثلاث متوسطات

## نظرية (١) :

متوسطات المثلث تتقاطع جميعاً في نقطة واحدة  
ففي الشكل المقابل :



إذا كان :  $E$  منتصف  $PA$

،  $H$  منتصف  $PB$

، و  $I$  منتصف  $PC$

فإن :  $PE$  ،  $PH$  ،  $PI$

تتقاطع في نقطة واحدة هي نقطة  $M$   
و تسمى نقطة تقاطع متوسطات المثلث



## نظرية (٢) :

نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها  
بنسبة ٢ : ١ من جهة القاعدة  
ففي الشكل المقابل :

إذا كانت :  $M$  نقطة تقاطع متوسطات  $\triangle PAB$   
فإن :  $PM = 2ME$  أو  $PM = \frac{2}{3}PE$

،  $PM = 2MH$  أو  $PM = \frac{2}{3}PH$

،  $PM = 2MI$  أو  $PM = \frac{2}{3}PI$

## فمثلاً :

إذا كان :  $PM = 6$  سم فإن :  $ME = 3$  سم  
، إذا كان :  $PM = 8$  سم فإن :  $MH = 4$  سم

## ملاحظات :

(١) نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة ٢ : ١ من جهة الرأس



(٢) في الشكل المقابل :

إذا كان :  $E$  منتصف  $PA$  متوسط في  $\triangle PAB$  ،

$M$  نقطة تقاطع متوسطات  $\triangle PAB$  فإن :

$PM = \frac{2}{3}PE$  ،  $PM = \frac{2}{3}PH$  ،

،  $PM = \frac{2}{3}PI$  ،  $PM = \frac{2}{3}PE$  ،




فمثلاً :

إذا كان :  $٦٠ = ٩٠$  سم فإن :  $٦٠ = ٩٠ \times \frac{1}{3} = ٣٠$  سم  
 $٦٠ = ٩٠ \times \frac{2}{3} = ٦٠$  سم ،  
 و بالمثل :  $٦٠ = ٩٠ \times \frac{1}{3} = ٣٠$  سم ،  
 $٦٠ = ٩٠ \times \frac{2}{3} = ٦٠$  سم ،  
 $٦٠ = ٩٠ \times \frac{1}{3} = ٣٠$  سم ،  
 $٦٠ = ٩٠ \times \frac{2}{3} = ٦٠$  سم ،

حقيقة :

النقطة التي تقسم متوسط المثلث بنسبة ٢ : ١ من  
 جهة القاعدة هي نقطة تقاطع متوسطات هذا المثلث  
 ففي الشكل المقابل :

إذا كان :  $\overline{AP}$  متوسط في  $\triangle ABC$ ،  $M \in \overline{AP}$  بحيث :  $AM = \frac{1}{3} AP$  فإن :M تكون نقطة تقاطع متوسطات  $\triangle ABC$ 

(١) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] في  $\triangle ABC$  إذا كان : E منتصف  $\overline{BC}$  فإن :  $\overline{AE}$  تسمى ....

(ارتفاع ، متوسط ، وترأ ، منتصف للزاوية B)

[٢] عدد متوسطات أي مثلث ....

(١ ، ٢ ، ٣ ، ٤)

[٣] نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة ....

من جهة الرأس

(٢ : ١ ، ٢ : ١ ، ٣ : ٢ ، ٣ : ١)

[٤] إذا كانت M نقطة متوسطات  $\triangle ABC$  ، وكانت E منتصف $\overline{BC}$  فإن :  $ME =$  ....

(٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥)

[٥] إذا كانت M نقطة متوسطات  $\triangle ABC$  ، وكانت E منتصفطوله ٦ سم فإن :  $ME =$  .... سم

(١ ، ٢ ، ٣ ، ٤)


[٦] إذا كانت M نقطة متوسطات  $\triangle ABC$  ، وكانت E منتصف،  $ME = ٦$  سم فإن :  $AE =$  .... سم

(٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥)

[٧] مستطيل تقاطع قطراه في نقطة M ، طول قطره ٦ سم فإن :

طول المتوسط  $\overline{AM} =$  .... سم


(٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥)



(٤) في الشكل المقابل :

P د هـ متوازي أضلاع فيه :

P هـ = هـ ب ، ب د = هـ ع = ١٢ سم ،  
 P د = ٩ سم أوجد محيط  $\triangle PAB$  و



(٢) في الشكل المقابل :

إذا كان : ع ، هـ منتصفى  $\overline{AB}$  ،  $\overline{PD}$  ،  
 ب هـ = ٩ سم ، د هـ = ٤ سم ،  
 ب د = ٨ سم ، أكمل ما يلى :

[١]  $\overline{BE}$  ،  $\overline{DO}$  .... فى  $\triangle PAB$  د[٢] م نقطة تقاطع ....  $\triangle PAB$  د


[٣] م هـ = .... ب هـ = .... × .... = .... سم

[٤] م ع = ٤ م .... = د م × .... = .... سم

[٥] ع هـ = .... ب د = .... × .... = .... سم

[٦] محيط  $\triangle PAB$  ع هـ = .... + .... + .... = .... سم

أحمد الشنتوري



(٣) في الشكل المقابل :


إذا كان : ع ، هـ منتصفى  $\overline{AB}$  ،  $\overline{PD}$  ،  
 ب هـ = ٨ سم ، د هـ = ٣ سم ،  
 P د = ٨ سم ، أكمل ما يلى :

[١] م هـ = .... ب هـ = .... × .... = .... سم

[٢] م د = ٤ م .... = ع م × .... = .... سم

[٣] د هـ = .... P د = .... × .... = .... سم


[٤] محيط  $\triangle PAB$  د هـ = .... + .... + .... = .... سم



(٥) في الشكل المقابل :

 $\Delta PBC$  مستطيل فيه : $PH = HB$  ،  $BO = OD$  سمأثبت أن :  $O$  نقطة تقاطع متوسطات $\Delta PBC$  ثم أوجد طول  $PO$ 

أحمد الشنتوري



(٦) في الشكل المقابل :

 $\Delta PBC$  فيه :  $E$  منتصف  $BC$  بحيث : $PH = HB$  ،  $PE = EC$  سم ، $HO \parallel BC$  أوجد طول  $HO$

## نظرية (٣) :

طول متوسط المثلث القائم الزاوية الخارج من رأس القائمة يساوي نصف طول وتر هذا المثلث

المعطيات :  $\Delta PBD$  فيه  $\angle B = 90^\circ$  ،  $\overline{BE}$  متوسط

المطلوب : إثبات أن :  $BE = \frac{1}{2} PD$

العمل : نرسم  $\overline{BE}$  ، نأخذ نقطة

$H \in \overline{BE}$  بحيث :  $BE = EH$

البرهان :  $\therefore$  الشكل  $PBDH$  فيه

$\overline{PD}$  ،  $\overline{BH}$  ينصف كل

منهما الآخر

$\therefore$  الشكل  $PBDH$  متوازي أضلاع

$\therefore \angle B = 90^\circ$  : الشكل  $PBDH$  مستطيل

$\therefore BE = EH$

$\therefore BE = \frac{1}{2} BH$  ،

$\therefore BE = \frac{1}{2} PD$

## فمثلاً :

في الشكل المقابل :

إذا كان :  $\Delta PBD$  فيه :

$\angle B = 90^\circ$  ،  $E$  منتصف  $\overline{PD}$

، و كان :

(١)  $BD = 8$  سم فإن :  $BE = 4$  سم

(٢)  $BE = 5$  سم فإن :  $BD = 10$  سم


## (٧) في الشكل المقابل :

$\angle B = 90^\circ$  ،  $BE = ED$

،  $BD = DH$


فإذا كان :  $BD = 12$  سم

أوجد طول كل من :  $\overline{BE}$  ،  $\overline{PD}$



أحمد الشنتوري

(٨) في الشكل المقابل :




$$\angle H = 90^\circ, \angle LMB = 90^\circ, \text{ و } \angle H = \angle LMB$$

$$\angle HLM = \angle LMB, \text{ و } \angle HLM = \angle LMB$$

$$\text{فإذا كان : } \angle HLM = \angle LMB$$

أوجد طول  $\overline{LM}$ 

(٩) في الشكل المقابل :



$$\angle H = 90^\circ, \angle LMB = 90^\circ, \text{ و } \angle H = \angle LMB$$

$$\angle HLM = \angle LMB, \text{ و } \angle HLM = \angle LMB$$

$$\text{أثبت أن : } \angle HLM = \angle LMB$$


أحمد الشنتوري



## عكس نظرية (٣) :

إذا كان طول متوسط المثلث المرسوم من أحد رؤوسه يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس فإن زاوية هذا الرأس تكون قائمة

**المعطيات :**  $\triangle PBD$  فيه  $Q$ ،  $(\triangle PBD) = 90^\circ$ ،  $\overline{PQ}$  متوسط



$PQ = EQ = PD = BQ$  ،  
**المطلوب :** إثبات أن  $Q$ ،  $(\triangle PBD) = 90^\circ$

**العمل :** نرسم  $\overrightarrow{PQ}$  ، نأخذ نقطة

$H \in \overrightarrow{PQ}$  بحيث :  $PQ = QH$

**البرهان :**  $\because PQ = QH$

$$\therefore PQ = QH$$

$\therefore$  الشكل  $PBDH$  فيه  $\overline{PQ}$  ،  $\overline{PQ}$  متساويان في  
 الطول ، ينصف كل منهما الآخر  
 $\therefore$  الشكل  $PBDH$  مستطيل  
 $\therefore Q$ ،  $(\triangle PBD) = 90^\circ$

## فمثلاً :

في الشكل المقابل :

إذا كان  $\triangle PBD$  فيه :

$Q$ ،  $(\triangle PBD) = 90^\circ$  ،  $E$  منتصف  $\overline{PD}$

، و كان  $AE = PD$  ،

$$PQ = EQ = PD = BQ$$

فإن  $Q$ ،  $(\triangle PBD) = 90^\circ$

أحمد التنتوري


## (١٠) في الشكل المقابل :

$\triangle PBD$  فيه :

$$PQ = EQ = PD = BQ$$

$$PQ = EQ = PD = BQ$$

أثبت أن  $Q$ ،  $(\triangle PBD) = 90^\circ$



أحمد التنتوري


أحمد التنتوري

(١١) في الشكل المقابل :

م ب د ع شكل رباعي فيه :

و (م ب د ع) =  $90^\circ$  ، م ه = د ه


، ب ه = ع ه

أثبت أن : و (م ع د) =  $90^\circ$ 

(١٢) في الشكل المقابل :

و (م ب د) =  $90^\circ$  ،

م ه = د ه ، ب ه = ع ه

أثبت أن : و (م ع د) =  $90^\circ$ 

أحمد الشنتوري

نتيجة :

طول الضلع المقابل لزاوية قياسها  $30^\circ$  في المثلث القائم الزاوية يساوي نصف طول الوتر

ففي الشكل المقابل :

إذا كان  $\triangle PBD$  فيه :


$$\angle D = 90^\circ , \angle B = 30^\circ$$

$$\angle P = 60^\circ$$

$$BD = \frac{1}{2} PB$$

فمثلاً :

$$\text{إذا كان : } PB = 8 \text{ سم فإن : } BD = 4 \text{ سم}$$




(١٣) في الشكل المقابل :

$$\triangle PBD \text{ فيه : } \angle D = 90^\circ , \angle B = 30^\circ$$

$$\angle P = 60^\circ , BD = 16 \text{ سم}$$

$$\text{أوجد محيط } \triangle PBD$$




(١٤) في الشكل المقابل :

$$\triangle PBD \text{ فيه : } \angle D = 90^\circ , \angle B = 30^\circ$$


$$\angle P = 60^\circ , BD = 12 \text{ سم}$$

$$\text{أوجد محيط } \triangle PBD$$




أحمد الشنتوري

(١٥) في الشكل المقابل :



و  $\angle P = 30^\circ$  ، و  $\angle BDE = 90^\circ$  ،  
 $PD = DE$  ،  $BD = BE$  سم  
 $DE = 6$  سم أوجد طول  $PD$   
 ثم أثبت أن : و  $\angle PDE = 90^\circ$


(١٦) في الشكل المقابل :



$\triangle PBD$  فيه : و  $\angle P = 30^\circ$  ،  
 $\angle BDE = 30^\circ$  ،  $PD = DE$  ،  
 $BD = 8$  سم ،  $DE \perp PB$  ،  
 أوجد طول كل من :  $EB$  ،  $ED$


أحمد الشنتوي

(١٧) في الشكل المقابل :



٩. = ( ٢ ب ٤ هـ ) ١ = ( ٢ ب ٤ هـ ) ١  
 ٣. = ( ٢ هـ ) ١ ، ٤ = ٢ ب ٤ هـ ،  
 ١. = ٢ ب هـ ، أوجد طول ٢

(١٨) في الشكل المقابل :



$\overline{P} \supseteq \overline{B} \supseteq \overline{D}$  ، هـ ،  $\overline{P} \supseteq \overline{B} \supseteq \overline{D}$   
 بحيث :  $\overline{P} \supseteq \overline{B} \supseteq \overline{D}$  ،  $\overline{P} \supseteq \overline{B} \supseteq \overline{D}$   
 ،  $\overline{P} \supseteq \overline{B} \supseteq \overline{D}$  ،  $\overline{P} \supseteq \overline{B} \supseteq \overline{D}$   
 أوجد مساحة المربع  $\overline{P} \supseteq \overline{B} \supseteq \overline{D}$

إلى التفتت

(٢٠) أكمل ما يلى :

[١] طول متوسط المثلث القائم الزاوية الخارج من رأس الزاوية

القائمة يساوى .... طول الوتر

[٢] طول الضلع المقابل للزاوية  $30^\circ$  فى المثلث القائم الزاوية

يساوى .... طول الوتر


[٣] إذا كان طول متوسط المثلث المرسوم من أحد رؤوسه يساوى

نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس فإن زاوية هذا الرأس

تكون ....

[٤] فى  $\Delta$   $ABC$  القائمة الزاوية فى  $B$  ، إذا كان  $AB = 20$  سمفإن : طول المتوسط المرسوم من  $B$  يساوى .... سم[٥] فى  $\Delta$   $ABC$  القائمة الزاوية فى  $B$  ، إذا كان  $AB = 6$  سم،  $BC = 8$  سم فإن : طول المتوسط المرسوم من  $B$  يساوى

.... سم

[٦] فى  $\Delta$   $ABC$  القائمة الزاوية فى  $B$  ، إذا كان : طول المتوسطالمرسوم من  $B$  يساوى  $3$  سم فإن  $AB =$  .... سم

(١٩) فى الشكل المقابل :




 $AB \perp DE$  مستطيل فيه  $H \in DE$ بحيث :  $\angle (HDE) = 30^\circ$ ،  $\angle (DBH) = 90^\circ$ أثبت أن :  $CH = \frac{1}{2} BD$ 

أحمد الشنتوي

## الدرس الثاني : المثلث المتساوي الساقين

نعم أن :

المثلثات تصنف حسب أطوال أضلاعها إلى ثلاثة أنواع هي :

مثلث مختلف الأضلاع	مثلث متساوي الساقين (متطابق الضلعين)	مثلث متساوي الأضلاع (متطابق الأضلاع)
 <p><math>PB \neq BD \neq PD</math></p>	 <p><math>PB = BD \neq PD</math></p>	 <p><math>PB = BD = PD</math></p>

ملاحظة :

في الشكل المقابل :

(١) الضلعان :  $\overline{PB}$  ،  $\overline{PD}$  متطابقان

(متساويان في الطول)

لذلك يسمى المثلث  $PBD$  بالمثلث المتساوي الساقين(٢) تسمى النقطة  $P$  رأس المثلث،  $\angle P$  زاوية رأس المثلث(٣) تسمى  $\overline{BD}$  قاعدة المثلث ، و الزاويتين :  $\angle B$  ،  $\angle D$ 

زاويتي قعدة المثلث


خواص المثلث المتساوي الساقين :

في أي مثلث متساوي الساقين يكون :

[١] زاوية رأس المثلث قد تكون حادة أو قائمة أو منفرجة

[٢] زاويتي قاعدة المثلث كل منهما حادة

(١) لاحظ الأشكال التالية ثم أكمل الجدول :



رقم الشكل	[١]	[٢]	[٣]
اسم المثلث			
القاعدة			
الساقان			
زاويتي القاعدة			
زاوية الرأس و نوعها			



## الدرس الثالث : نظريات المثلث المتساوي الساقين

## نظرية (١) :

زاويتا القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان

المعطيات :  $\triangle PAB$  فيه  $\overline{PA} \equiv \overline{PB}$ المطلوب : إثبات أن :  $\angle A \equiv \angle B$ العمل : نرسم  $\overline{PE} \perp \overline{AB}$ البرهان :  $\therefore$  المثلثان  $\triangle PAE$  ،  $\triangle PBE$  قائما الزاوية فيهما : $\overline{PA} \equiv \overline{PB}$  معطى ،  $\overline{PE}$  ضلع مشترك $\therefore \triangle PAE \equiv \triangle PBE$ وينتج من التطابق أن :  $\angle A \equiv \angle B$ 

(١) في كل شكل من الأشكال التالية أوجد قيم الرموز المستخدمة في قياسات الزوايا :

<p>[٤]</p> <p>س = ....° ، ص = ....° ، ع = ....°</p>	<p>[٣]</p> <p>س = ....° ، ص = ....°</p>
<p>[٦]</p> <p>س = ....°</p>	<p>[٥]</p> <p>س = ....°</p>
<p>[٨]</p> <p>س = ....° ، ص = ....°</p>	<p>[٧]</p> <p>س = ....°</p>

أحمد الشنتوي

<p>[٢]</p> <p>س = ....° ، ص = ....°</p>	<p>[١]</p> <p>س = ....° ، ص = ....°</p>
---	---

نتيجة :


إذا كان المثلث متساوي الأضلاع فإن زواياه الثلاثة تكون متطابقة  
و يكون قياس كل منها  $60^\circ$

فمثلاً :

في الشكل المقابل :

إذا كان :  $\triangle PAB$  فيه : $PA = PB = AB$  فإن :

$$\angle P = \angle B = \angle A = 60^\circ$$




(٢) في الشكل المقابل :

$$PA = PB = AB, \quad \angle P = \angle B = \angle A$$

أوجد :  $\angle A = 70^\circ$ 

$$\angle B = 70^\circ, \quad \angle P = 70^\circ$$




(٣) في الشكل المقابل :

$$PA = PB = AB, \quad \angle P = \angle B = \angle A$$

$$\angle A = 100^\circ$$


أوجد :

$$\angle B = 100^\circ, \quad \angle P = 100^\circ$$




أحمد الشنتوري

(٤) في الشكل المقابل :



$AB = AC$  ،  $AD = AE$  ،  
 أثبت أن :  $BD = CE$   
 و  $(\triangle ADE) = (\triangle ABC)$

(٥) في الشكل المقابل :



$AB \parallel DC$  ،  
 $AD = BC$  ،  
 أوجد :  $(\triangle AEF)$

أحمد التنتوري

## نظرية (٢) :

إذا تطابقت زاويتان في مثلث فإن الضلعين المقابلين لهاتين الزاويتين يكونان متطابقين ، و يكون المثلث متساوي الساقين

المعطيات :  $\Delta PAB$  فيه  $\angle B \equiv \angle A$

المطلوب : إثبات أن :  $\overline{PA} \equiv \overline{PB}$

العمل : ن نصف  $\angle BPA$  بالمنصف  $\overline{PE}$

يقطع  $\overline{PE}$  في  $E$

البرهان :  $\angle B \equiv \angle A$  ::

$$\therefore \angle (BPE) = \angle (APE)$$

$$، \therefore \overline{PE} \text{ ينصف } \angle BPA$$

$$\therefore \angle (BPE) = \angle (APE) \quad (\text{ع } P \angle B \equiv \angle A)$$

$$، \therefore \text{مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة} = 180^\circ$$

$$\therefore \text{المثلثان } PAB ، PEA \text{ فيهما :}$$

$\overline{PE}$  ضلع مشترك

$$\angle (BPE) = \angle (APE) \quad (\text{ع } P \angle B \equiv \angle A)$$

$$\angle (BPE) = \angle (APE) \quad (\text{ع } P \angle B \equiv \angle A)$$

$$\therefore \Delta PAB \equiv \Delta PEA$$

وينتج من التطابق أن :  $\overline{PA} \equiv \overline{PB}$

و يكون :  $\Delta PAB$  متساوي الساقين

## نتيجة :

إذا تطابق زواياه مثلث فإنه يكون متساوي الأضلاع

## فمثلاً :

في الشكل المقابل :

إذا كان :  $\Delta PAB$  فيه :

$$\angle A \equiv \angle B \equiv \angle P$$

$$PA = PB = AB$$

أي أن :  $\Delta PAB$  متساوي الأضلاع

## ملاحظة :

المثلث المتساوي الساقين الذي قياس إحدى زواياه  $60^\circ$  يكون

متساوي الأضلاع

## فمثلاً :

$$(1) \text{ إذا كان : } \Delta PAB \text{ فيه : } PA = PB ، \angle A = 60^\circ ، \angle P = 60^\circ$$

$$\text{فإن : } \angle (BPE) = \angle (APE)$$

$$= \frac{1}{2} (180^\circ - 60^\circ) = 60^\circ$$

$\therefore \Delta PAB$  متساوي الأضلاع

(٢) إذا كان :  $\Delta SVE$  فيه :  $SE = VE$  ،





$$\angle (SEV) = 60^\circ \text{ فإن : } \angle (SEV) = 60^\circ$$

$$، \angle (SEV) = 60^\circ = (60^\circ + 60^\circ) - 180^\circ = 60^\circ$$

$\therefore \Delta SVE$  متساوي الأضلاع

أحمد الشنتوري


(٦) في كل شكل من الأشكال التالية أكتب أضلاع المثلث المتساوية في الطول :

<p>[٢]</p>  <p>..... = .....</p>	<p>[١]</p>  <p>..... = .....</p>
<p>[٤]</p>  <p>..... = .....</p>	<p>[٣]</p>  <p>..... = .....</p>

(٧)  $\Delta$  ب د فيه :  $\angle د = (\angle ب)$  و  $\angle ب = (\angle د)$   $\angle ع = 72^\circ$   
 أثبت أن  $\Delta$  ب د متساوي الساقين

(٨) في الشكل المقابل :


$\vec{ب\epsilon}$  ينصف  $\angle ب$  ،  $\vec{د\epsilon}$  ينصف  $\angle د$  ،  
 $\angle ب = \angle د$  ،  $\angle ب\epsilon د = 120^\circ$   
 أثبت أن  $\Delta$  ب د متساوي الأضلاع



أحمد الشنتوي


(٩) في الشكل المقابل :

$PD = PB$  ،  $BD \parallel EH$   
 أثبت أن :  $\triangle PDE$  متساوي الساقين  
 ثم أثبت أن :  $BE = ED$



(١٠) في الشكل المقابل :

$\vec{BE}$  ينصف  $\angle PBD$  ،  
 $BD \parallel EH$   
 أثبت أن :  $\triangle PDE$  متساوي الساقين



أحمد الشنتوري



(١١) أكمل ما يلي :

[١] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 60^\circ$  ، $\angle B = 50^\circ$  فإن :  $\angle D = \dots$ [٢] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 80^\circ$  ،  $\angle D = 70^\circ$  ،فإن :  $\angle B = \dots$ [٣] إذا كان :  $\Delta PBD$  القائم الزاوية في ب ، و كان : $\angle P = 60^\circ$  فإن :  $\angle D = \dots$ 

[٤] إذا كان قياس إحدى زاويتي القاعدة في مثلث متساوي الساقين

 $48^\circ$  فإن قياس زاوية رأس المثلث يساوي ....[٥] إذا كان قياس زاوية رأس مثلث متساوي الساقين  $72^\circ$ 

فإن قياس زاوية القاعدة يساوي ....

[٦] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 60^\circ$  ،  $\angle D = 70^\circ$  ،و محيطه  $10$  سم فإن :  $\angle B = \dots$  سم[٧] قياس أي زاوية من زوايا المثلث المتساوي الأضلاع  $\dots^\circ$ [٨] قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع  $\dots^\circ$ [٩] إذا قياس إحدى زاويتي قاعدة مثلث متساوي الساقين  $40^\circ$ 

كان المثلث ....

(١٢) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] إذا كان قياس إحدى زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الساقين

 $30^\circ$  كان المثلث ....

(منفرج الزوية ، حاد الزوايا ، قائم الزاوية ، متساوي الأضلاع)

[٢] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 80^\circ$  ،  $\angle D = 70^\circ$  ،فإن :  $\angle B = \dots^\circ$ (  $90^\circ$  ،  $60^\circ$  ،  $40^\circ$  ،  $30^\circ$  )[٣] في  $\Delta PBD$  المتساوي الساقين إذا كان :  $\angle P = 60^\circ$  فإن : $\angle D = \dots^\circ$ (  $90^\circ$  ،  $60^\circ$  ،  $40^\circ$  ،  $30^\circ$  )

[٤] مجموع قياسي زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الأضلاع

يساوي ....

(  $120^\circ$  ،  $90^\circ$  ،  $60^\circ$  ،  $30^\circ$  )[٥] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 80^\circ$  ،  $\angle D = 70^\circ$  ،

الخارجة عند الرأس ع تكون ....

( حادة ، قائمة ، منفرجة ، منعكسة )

[٦] إذا كان قياسا زاويتين في مثلث  $70^\circ$  ،  $40^\circ$  كان المثلث ....

( مختلف الأضلاع ، متساوي الأضلاع ،

متساوي الساقين ، قائم الزاوية و متساوي الساقين )

أحمد الشنتوري

## الدرس الرابع : نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين

**نتيجة (1) :**

متوسط المثلث المتساوي الساقين المرسوم من الرأس ينصف زاوية الرأس ويكون عمودياً على القاعدة

فقى الشكل المقابل :

إذا كان :  $\Delta$  م ب ح فيه :

$\mu = \mu$  ،  $\overline{\mu}$  متوسط فإن :

(1)  $\overrightarrow{AB}$  ينصف  $\angle C$  بـ  $D$  على  $AC$

أى أن:  $\mathcal{U}(\Delta_B \mathcal{P}) = \mathcal{U}(\Delta_C \mathcal{P})$

(۲)  $\overline{a} \perp \overline{b}$   $\overline{b} \perp \overline{c}$

**ملاحظة :**

$\Delta \vdash \Delta \equiv \Delta$  ، لأن :  $\vdash$  ضلع مشترك ،  
 $\vdash = \vdash$  ،  $\vdash = \vdash$

**نتیجہ (۲) :**

منصف زاوية رأس المثلث المتساوي الساقين ينصف القاعدة ويكون عمودياً عليها

فقى الشكل المقابل :

إذا كان :  $\Delta$  م ب ح فيه :

ب = ب ، ب = ب ، ينصف ب ب ح فإن :

(١)  $\bar{e}$  منتصف  $\overline{b\bar{d}}$  أى أن :  $b\bar{e} = e\bar{d}$

(۲)  $\overline{ab} \perp \overline{cd}$

أحمد التتوي

**ملاحظة :**

$$\Delta \vdash \Delta \equiv \Delta \vdash \Delta \text{ لأن : } \overline{\Delta} \text{ ضلع مشترك ، } \Delta \vdash \Delta = \Delta \text{ ، } \Delta \vdash \Delta = \Delta \text{ ، } \Delta \vdash \Delta = \Delta$$

### نتيجة (٣) :

المستقيم المرسوم من رأس المثلث المتساوي الساقين عمودياً على القاعدة ينصف كلاً من القاعدة و زاوية الرأس

**فقى الشكل المقابل :**

إذا كان :  $\Delta$  م ب ح فيه :

$\overline{ab} = \overline{cd}$ ,  $\overline{ac} \perp \overline{bd}$  فإن :

(1) ۛ منتصف بـ

$$A^c = B^c : A^c$$
$$(e \vdash \supset \supset) \mathcal{U} = (e \vdash \supset \supset) \mathcal{U} \quad (7)$$

**ملاحظة :**

$\Delta \vdash B \equiv \Delta \vdash A$  لأن : ضلع مشترك ،  
 ° ٩. = (  $\Delta \vdash B$  ) ∪ = (  $\Delta \vdash A$  ) ∪ ،  $\Delta \vdash B = \Delta \vdash A$

(١) في الشكل المقابل :

۸.  $\overline{ab} \perp \overline{cd}$ ،  $\overline{ab} = \overline{cd}$  : فه

$$^{\circ} \quad \mathfrak{M} \equiv (\langle \mathcal{E}, \mathcal{P} \rangle, \mathcal{V})$$

1.  $\frac{1}{2}$

، ب ح = ا سم اوجد :

و (ب ۲ د) ، طول بء


أحمد التتوي<sup>5</sup>



## محاور التماثل :

أولاً : محاور تماثل للمثلث المتساوي الساقين :

محور تماثل المثلث المتساوي الساقين هو المستقيم المرسوم من رأسه عمودياً على قاعدته  
ففي الشكل المقابل :




إذا كان :  $\triangle P$  ب د فيه :  
 $P = B = C$  ،  $\overline{PE} \perp \overline{BC}$  فإن :  
 $\overline{PE}$  هو محور تماثل للمثلث المتساوي الساقين

## ملاحظات :

- (١) المثلث المتساوي الساقين له محور تماثل واحد فقط
- (٢) المثلث المتساوي الأضلاع له ثلاثة محاور تماثل
- (٣) المثلث المختلف الأضلاع له محاور تماثل

ثانياً : محاور تماثل القطعة المستقيمة :

يسمى المستقيم العمودي على قطعة مستقيمة  
محور تماثل لهذه القطعة المستقيمة  
و للاختصار يسمى محور القطعة المستقيمة  
ففي الشكل المقابل :




إذا كانت :  $E$  منتصف  $\overline{AB}$  ،  
المستقيم  $PE \perp \overline{AB}$  حيث :  $E \in PE$   
فإن : المستقيم  $PE$  هو محور تماثل  $\overline{AB}$

## خاصية :

أي نقطة على محور تماثل القطعة المستقيمة تكون على بعدين  
متساويين من طرفيها

ففي الشكل المقابل :

إذا كان : المستقيم  $PE$  محور تماثل  $\overline{AB}$   
فإن :


(١) إذا كان :  $C \in PE$  فإن :

$$P = B = C = H$$

(٢) إذا كان :  $H \in PE$  فإن :

$H \in PE$  لأن : عكس الخاصية صحيح

فإذا كانت هناك نقطة على بعدين متساويين من طرفي قطعة  
مستقيمة فإن هذه النقطة تقع على محور هذه القطعة المستقيمة



(٤) في الشكل المقابل :


$$P = B = C = H \text{ سم} , H \in PE , H = B = C = H \text{ سم}$$

$$H \in PE \cap \overline{BC} = \{E\} , B = C = H \text{ سم}$$

أوجد طول كل من :  $\overline{PE}$  ،  $\overline{CE}$


(٥) في الشكل المقابل :

$\overline{بم} \cap \overline{بم} = \{م\}$  ،  $\overline{بم} = \overline{بم}$  ،  
 $\overline{بم} = \overline{بم}$  ، أثبت أن :  
 $م$  منتصف  $\overline{بم}$



(٧) في الشكل المقابل :


$\triangle ب د م$  فيه :  $\overline{بم} = \overline{د م}$  ،  
 $\angle (ب د م) = \angle (د ب م)$  ،  
 أثبت أن :  $\overline{م د}$  محور  $\overline{ب د}$



أحمد الشنتوري


(٦) في الشكل المقابل :

$ص ل = ص د$  ،  $ل ع = د ع$  ،  
 $ل م = ص م$  ، أثبت أن :  
 $ص$  ،  $م$  ،  $ع$  على استقامة واحدة



(٨) في الشكل المقابل :

$\overline{بم} = \overline{د م}$  ،  $\overline{بم} \parallel \overline{د م}$  ،  
 $\overline{د م} \parallel \overline{بم}$  ، أثبت أن :  $\overline{د م} = \overline{بم}$  ،  
 $\angle (ب د م) = \angle (د ب م)$  ،



(٩) أكمل ما يلي :

[1] المستقيم المرسوم من رأس المثلث المتساوي الساقين عمودياً على القاعدة يسمى ....

[2] المستقيم العمودي على القطعة المستقيمة من منتصفها يسمى ....

[3] أي نقطة تنتمي لمحور القطعة المستقيمة تكون على بعدين .... من طرفيها

[4] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $PD = PB$  ،  $\angle P = (\angle D) = 60^\circ$  ، فإن : عدد محاور تماثل  $\Delta PBD =$  ....

[5] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $PD = PB$  ،  $\angle P = (\angle B) = 50^\circ$  ، فإن : عدد محاور تماثل  $\Delta PBD =$  ....

[6] إذا كان  $\Delta PBD$  له محور تماثل واحد و فيه :

$\angle P = (\angle B) = 120^\circ$  ، فإن :  $\angle D =$  ....

[7] العمود الساقط من رأس المثلث المتساوي الساقين على القاعدة ينصف كلاً من .... ، ....

[8] الشعاع المنصف لزاوية رأس المثلث المتساوي الساقين ينصف .... و يكون ....

(10) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] إذا كان طول أي ضلع في مثلث  $= \frac{1}{3}$  محيط المثلث فإن : عدد محاور تماثل المثلث = ....

( صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ )

[2] في المعين  $س ص ع ل$  يكون :  $\overline{س ع}$  محور تماثل هو ....

(  $\overrightarrow{س ل}$  ،  $\overrightarrow{س ص}$  ،  $\overrightarrow{س ع}$  ،  $\overrightarrow{ص ع}$  )

[3] إذا كان :  $\overrightarrow{س ص}$  هو محور تماثل  $\overline{أ ب}$  فإن : ....

(  $\overline{س ب} = \overline{ص ب}$  ،  $\overline{س ب} = \overline{س ص}$  )

(  $\overline{ب ص} = \overline{س ص}$  ،  $\overline{ب ص} = \overline{ص ب}$  )

[4] إذا كان :  $\overline{أ ب د ع}$  شكل رباعي فيه :  $\overline{أ ب} = \overline{ع د}$  ،

$\overline{ب د} = \overline{ع د}$  فإن :  $\overline{أ د}$  ....  $\overline{ب ع}$

( يوازي ، عمودي على ، محور تماثل ، يطابق )

[5] إذا كان :  $\Delta PBD$  قائم الزاوية في  $ب$  ،  $\angle P = (\angle D) = 50^\circ$  ،

فإن : عدد محاور تماثل  $\Delta PBD =$  ....

( صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ )

[6] إذا كان :  $\Delta PBD$  قائم الزاوية في  $ب$  ،  $\angle P = (\angle D) = 40^\circ$  ،

فإن : عدد محاور تماثل  $\Delta PBD =$  ....

( صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ )

[7] المستقيم العمودي على القطعة المستقيمة من منتصفها يسمى لها ....

( موازي ، منصف ، متوسط ، محور تماثل )

أحمد الشنتوري



## الوحدة الخامسة

## التباين

## الدرس الأول : التباين

مفهوم التباين :  
نعلم أن :

علاقة التباين هي العلاقة التي تستخدم للمقارنة بين عددين مختلفين و نعبّر عنها بإحدى العلامتين :  $<$  (أكبر من) ، (أصغر من) و تسمى كل منهما متباينة أو علاقة تباين و لما كانت أطوال القطع المستقيمة و كذلك قياسات الزوايا عبارة عن أعداد لذا تستخدم علاقة التباين للمقارنة بين طولى قطعتين مستقيمتين أو قياسى زاويتين

فمثلاً :

(١) إذا كان :  $m = 6$  سم ،  $n = 4$  سم فإن :

$m < n$  أو  $n > m$

(٢) إذا كان :  $m = 60^\circ$  ،  $n = 42^\circ$  فإن :

$m > n$  أو  $n < m$

(١) أكمل ما يلى مستخدماً علامة ( $>$  أو  $<$ ) :

(١) إذا كانت  $m$  حادة فإن :  $m > 90^\circ$  ....

(٢) إذا كانت  $n$  منفرجة فإن :  $n > 90^\circ$  ....

(٣) إذا كان :  $s = 3$  سم ،  $l = 5$  سم

فإن :  $l > s$  ....

أحمد الشنتوري

(٢) فى الشكل المقابل :

[١] أكمل :

(١)  $m \angle P = \angle B = \dots$

(٢)  $m \angle P = \angle H = \dots$

[٢] أكمل ما يلى مستخدماً علامة ( $>$  أو  $<$ ) :

(١)  $m \angle P > \angle H$  ....

(٢)  $m \angle P > \angle B$  ....

(٣)  $m \angle P > \angle E$  ....

(٤)  $m \angle P > \angle D$  ....

(٣) فى الشكل المقابل أكمل ما يلى مستخدماً علامة ( $>$  أو  $<$ ) :



[١]  $m \angle P \dots m \angle B$

[٢]  $m \angle P \dots m \angle H$

[٣]  $m \angle P \dots m \angle B$

[٤]  $m \angle P > \angle B$  ....


[٥]  $m \angle P > \angle H$  ....

أحمد الشنتوري

## مسلمات التباين :

لأي ثلاثة أعداد  $s$  ،  $v$  ،  $e$  :[١] إذا كان :  $s < v$  فإن :  $s + e < v + e$ [٢] إذا كان :  $s < v$  فإن :  $s - e < v - e$ [٣] إذا كان :  $s < v$  ،  $e$  عدداً موجباًفإن :  $s + e < v + e$ [٤] إذا كان :  $s < v$  ،  $v < e$  فإن :  $s < e$ [٥] إذا كان :  $s < v$  ،  $v < e$ فإن :  $s + v < v + e$ 


## (٤) في الشكل المقابل :

إذا كان :  $\overrightarrow{PM} \supset \overrightarrow{PE}$  ،  $\overrightarrow{PM} \supset \overrightarrow{PD}$ ، كان :  $PM < PD$ أثبت أن :  $PM < PD$ 

## (٥) في الشكل المقابل :

 $\triangle PBD$  فيه :  $PM < PD$  ،


أثبت أن :

 $PM < PE$ 


## (٦) في الشكل المقابل :

إذا كان :  $\angle PBD < \angle PDB$  ،


أثبت أن :

 $\angle PDB < \angle PBD$ 

(٧) في الشكل المقابل :

إذا كان :  $\angle (P, B, E) = 120^\circ$ ،  $\angle (P, D, H) = 100^\circ$ رتب قياسات زوايا  $\triangle P, B, D$  تصاعدياً

(٨) في الشكل المقابل :

 $P, B, D, E$  متوازي أضلاع ،  $\angle B > \angle E$ أثبت أن :  $\angle P + \angle B < \angle D + \angle E$ 

(٩) أكمل ما يلي :

[١] إذا كان :  $P, B, D$  أعداد موجبة ، و كان :  $B < P$ فإن :  $P + D \dots B + D$ [٢] إذا كان :  $P, B, D$  أعداد موجبة ، و كان :  $B < P$ ،  $B < D$  فإن :  $P \dots D$ [٣] إذا كان :  $\angle (P, B, E) < \angle (P, D, H)$  فإن :مكمل  $P \geq \dots$  مكمل  $D$ [٤] إذا كانت النقط :  $P, B, D, E$  على استقامة واحدة ، و كان $P = 3$  سم ،  $B = D = 2$  سم ،  $D = E = 2$  سمفإن :  $P + D \dots B + E$ [٥] إذا كان :  $\overrightarrow{PB}$  ينصف  $\angle B$  فإن : $\angle (P, B, E) \dots \angle (P, D, H)$ 

أحمد الشنتوري

## الدرس الثاني : المقارنة بين قياسات الزوايا في المثلث

نعلم أن :

إذا تطابق ضلعان في مثلث فإن الزاويتين المقابلتين لهذين الضلعين تكونان متساويتين في القياس  
فإذا كان :  $\Delta P \text{ د } ب$  فيه :

$$\angle ب = \angle د \text{ فإن } \angle د = \angle ب \text{ فإن } \angle د = \angle ب$$

ملاحظة :


إذا اختلفت أطوال أضلاع المثلث تختلف قياسات زواياه المقابلة لهذه الأضلاع

نظرية :

إذا اختلف طولاً ضلعين في مثلث فأكبرهما في الطول تقابله زاوية أكبر في القياس من قياس الزاوية المقابلة للضلع الآخر

المعطيات :  $\Delta P \text{ د } ب$  فيه :  $\angle ب < \angle د$   
المطلوب : إثبات أن :

$$\angle د < \angle ب \text{ فإن } \angle د < \angle ب$$



العمل : نأخذ  $\overline{PE} \subset \overline{PB}$  حيث :  $\angle ب = \angle ع$   
البرهان :  $\Delta P \text{ د } ع$  فيه :  $\angle ب = \angle ع$

$$\therefore \angle د = \angle ع \text{ فإن } \angle د = \angle ع \text{ (١)}$$

$$\therefore \angle د < \angle ب \text{ خارجة عن } \Delta ب د ع$$

$$\therefore \angle د < \angle ب \text{ (٢)}$$

من (١) ، (٢) ينتج :  $\angle د < \angle ب$

$$\therefore \angle د < \angle ب \text{ فإن } \angle د < \angle ب$$

$$\therefore \angle د < \angle ب \text{ فإن } \angle د < \angle ب$$

ملاحظات :

(١) أكبر زوايا المثلث في القياس تقابل أكبر أضلاع المثلث طولاً

و يكون قياسها أكبر من  $60^\circ$

(٢) أصغر زوايا المثلث في القياس تقابل أصغر أضلاع المثلث طولاً.

و يكون قياسها أقل من  $60^\circ$




(١) في الشكل المقابل :

$\Delta P \text{ د } ب$  فيه :  $\angle ب < \angle د$

أثبت أن :

$$\angle د < \angle ب \text{ فإن } \angle د < \angle ب$$

(٢) في الشكل المقابل :


 $\Delta PAB$  فيه :  $PA < PB$  ، $PE = EB$  ،  $PH = HD$  أثبت أن : $\angle (PEH) < \angle (PHE)$ 

(٣) في الشكل المقابل :

 $\Delta PAB$  فيه :  $PA = 3$  سم $BD = 2$  سم ،  $CD = 7$  سم $AE = 6$  سم أثبت أن : $\angle (PAB) < \angle (PBA)$ 


أحمد الشنتوري

(٤) في الشكل المقابل :



$\triangle ب د ع$  شكل رباعي فيه :  $\angle ب = \angle ع$   
 $\angle د < \angle ب$  أثبت أن :  
 $\angle (ب د ح) < \angle (د ع ح)$

(٥) في الشكل المقابل :




$\triangle ب د ع$  مثلث ،  $\overline{ب ع}$  ينصف  $\triangle ب د ع$   
 $\overline{ب د}$  ينصف  $\triangle ب د ع$  فإذا كان :  
 $\angle د < \angle ب$  أثبت أن :  
 $\angle (ب د ح) < \angle (د ع ح)$


أحمد الشنتوري



(٦) في الشكل المقابل :




(٧) في الشكل المقابل :



$\triangle PBC$  مستطيل ،  $\overline{ME} \perp AD$   
بحيث :  $ME < MC$   $\triangle PBC$   $\angle PBC > \angle PCE$  و  $\angle PBC > \angle PCE$

أحمد الشنتوي

(٨) في الشكل المقابل :

 $\Delta ABC$  متساوي الأضلاع ،  $E$  نقطة داخله $\angle AEB < \angle BEC < \angle CEA$ 

أثبت أن :

 $\angle AEB < \angle BEC < \angle CEA$  $\angle BEC < \angle CEA < \angle AEB$  $\angle CEA < \angle AEB < \angle BEC$ 

(٩) أكمل ما يلي :

[١] أصغر زوايا المثلث في القياس تقابل .... الأضلاع طولاً

[٢] إذا اختلف طولاً ضلعين في مثلث فأكبرهما في الطول تقابله زاوية

.... في القياس من قياس الزاوية التي تقابل الضلع الآخر

[٣] قياس أكبر زاوية في المثلث  $< 180^\circ$ [٤] قياس أصغر زاوية في المثلث  $> 0^\circ$ [٥] في  $\Delta ABC$  إذا كان :  $\angle A < \angle B < \angle C$  فإن : $\angle A < \angle B < \angle C$ 

(١٠) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] في  $\Delta ABC$  إذا كان :  $\angle A < \angle B < \angle C$  فإن : $\angle A < \angle B < \angle C$  ،  $\angle B < \angle A < \angle C$  ،  $\angle C < \angle A < \angle B$  ،  $\angle A < \angle C < \angle B$ [٢] في  $\Delta ABC$  إذا كان :  $\angle A = 90^\circ$  ،  $\angle B = 30^\circ$  ،  $\angle C = 60^\circ$  ،

فإن : ....

 $\angle A < \angle B < \angle C$  ،  $\angle B < \angle A < \angle C$  ،  $\angle C < \angle A < \angle B$  ،  $\angle A < \angle C < \angle B$  $\angle B < \angle C < \angle A$  ،  $\angle C < \angle B < \angle A$  ،  $\angle A < \angle B < \angle C$ [٣] في  $\Delta ABC$  ص.ع المنفرج الزاوية في  $S$  ،  $\angle S = 120^\circ$  ،  $\angle A = 30^\circ$  ،  $\angle B = 30^\circ$ فإن :  $\angle A < \angle B < \angle C$  ،  $\angle B < \angle A < \angle C$  ،  $\angle C < \angle A < \angle B$  ،  $\angle A < \angle C < \angle B$  $\angle A < \angle B < \angle C$  ،  $\angle B < \angle A < \angle C$  ،  $\angle C < \angle A < \angle B$  ،  $\angle A < \angle C < \angle B$

## الدرس الثالث : المقارنة بين أطوال الأضلاع في المثلث

نعلم أن :

إذا تساوى قياسا زاويتان في مثلث فإن الضلعين المقابلين لهاتين الزاويتين يكونان متساويتين في الطول  
فإذا كان  $\Delta P$  ب د فيه :

$$\angle (ب د) = \angle (د ب) \text{ فإن } \angle (د ب) = \angle (ب د)$$

ملاحظة :

إذا اختلفت قياسات زوايا المثلث تختلف أطوال الأضلاع المقابلة لهذه الزوايا

نظرية :

إذا اختلف قياسا زاويتين في مثلث فأكبرهما في القياس يقابلها ضلع أكبر في الطول من الذى يقابل الأخرى

المعطيات :  $\Delta P$  ب د فيه  $\angle (د ب) < \angle (ب د)$

المطلوب : إثبات أن :  $ب د < د ب$

البرهان :  $\because \overline{ب د}$  ،  $\overline{د ب}$  قطع مستقيمة

$\therefore$  يجب أن تتحقق إحدى الحالات :

$$(1) ب د > د ب \quad (2) ب د = د ب \quad (3) ب د < د ب$$

إذا لم تكن  $ب د < د ب$  فإما  $ب د = د ب$  أو  $ب د > د ب$

إذا كان :  $ب د = د ب$  فإن :  $\angle (د ب) = \angle (ب د)$

وهذا يخالف المعطيات حيث أن :  $\angle (د ب) < \angle (ب د)$


و إذا كان :  $ب د > د ب$  فإن :  $\angle (د ب) > \angle (ب د)$

حسب النظرية السابقة و هذا يخالف المعطيات

حيث أن :  $\angle (د ب) < \angle (ب د)$

$\therefore$  يجب أن يكون :  $ب د < د ب$

(١) فى الشكل التالى أكمل ما يلى مستخدماً علامة ( > أو < ) :



$$[1] ب د \dots ب$$

$$[2] د ب \dots د$$

$$[3] ب د \dots د ب$$

$$[4] د ب \dots د ب$$


(٢) فى الشكل المقابل :

$$\overline{د ب} \parallel \overline{د ب}$$

$$\angle (د ب) = ٧٠^\circ$$

$$\angle (د ب) = ٣٠^\circ$$

أثبت أن :  $ب د < د ب$



## نتيجة (١) :

في المثلث القائم الزاوية يكون الوتر هو أطول أضلاع المثلث  
ففي الشكل المقابل :




$\Delta PBD$  قائم الزاوية في ب  
 $\therefore \angle P < \angle B$  و  $\angle D < \angle B$  (حادة)  
 $\therefore PD < PB$  و  $PD < BD$  ،  
 فيكون :  $PD < PB$  و  $PD < BD$  (حادة)  
 $\therefore PD < PB$  و  $PD < BD$  (حادة)  
 فيكون :  $PD < PB$  و  $PD < BD$  (حادة)

## ملاحظة :

في المثلث المنفرج الزاوية يكون الضلع المقابل للزاوية المنفرجة  
هو أكبر أضلاع المثلث طولاً

## نتيجة (٢) :

طول القطعة المستقيمة العمودية المرسومة من نقطة خارج مستقيم  
معلوم إلى هذا المستقيم أصغر من طول أي قطعة مستقيمة مرسومة  
من هذه النقطة إلى المستقيم المعلوم  
ففي الشكل المقابل :



$\overline{PB} \perp \overline{HD}$  فيكون حسب نتيجة (١) :

(١) من  $\Delta PBD$  :  $PD < PB$  و  $PD < BD$


(٢) من  $\Delta PBE$  :  $PE < PB$  و  $PE < BE$

(٣) من  $\Delta PHD$  :  $PD < PH$  و  $PD < HD$

## تعريف :

بعد أي نقطة عن مستقيم معلوم هو طول القطعة المستقيمة العمودية  
المرسومة من النقطة إلى المستقيم المعلوم  
ففي الشكل السابق :  
بعد نقطة P عن  $\overline{BD}$  هو طول  $\overline{PB}$

## (٣) في الشكل المقابل :



$\angle PBD = \angle PAB$  ،  $\overline{PB} \parallel \overline{AD}$  ،  $\angle PBD = \angle PAB$  ،

$\angle PBD = \angle PAB$  ،  $\angle PBD = \angle PAB$  ،


أثبت أن :  $PD < PB$

أحمد الشنتوري

(٤) في الشكل المقابل :

$$P = 6$$


$$P < 6 \text{ (ب د) } \text{ و } P > 6 \text{ (د ب د)}$$

أثبت أن :  $P < 6 < 6$ 

(٦) في الشكل المقابل :

$$P = 120^\circ \text{ (ب د ٦) } \text{ و } P = 100^\circ \text{ (د ب د)}$$


$$P = 100^\circ \text{ (د ب د)}$$

أثبت أن :  $P > 6$ 

(٥) في الشكل المقابل :


$$P = 6 \text{ (ب د) } \text{ و } P = 6 \text{ (د ب د)}$$

$$P = 100^\circ \text{ (د ب د)}$$

أثبت أن :  $P < 6$ 

(٧) في الشكل المقابل :

$$P = 90^\circ \text{ (ب د) } \text{ و } P = 90^\circ \text{ (د ب د)}$$

أثبت أن :  $P < 6$ 

$$(٨) \Delta PBD \text{ فيه : } \angle P = (٢٠ + س)^\circ , \angle B = (١٠ - س)^\circ , \angle D = (٢٠ + س)^\circ$$

رتب أطوال أضلاع  $\Delta PBD$  تصاعدياً

(١٠) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P < \angle B$  ،  $\angle D < \angle B$  ، فإن : ....

(  $PD < PB$  ،  $PD > PB$  ،  $PD = PB$  ،  $PD < PB$  )

[2] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 90^\circ$  ، فإن : ....

(  $PD < PB$  ،  $PD > PB$  ،  $PD = PB$  ،  $PD < PB$  )

[3] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 60^\circ$  ،

$\angle D = 50^\circ$  ، فإن : أصغر الأضلاع طولاً هو ....

(  $PD$  ،  $PB$  ،  $BD$  ،  $PD$  )

[4] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 60^\circ$  ،

$\angle D = 70^\circ$  ، فإن : ....

(  $PD < PB$  ،  $PD > PB$  ،  $PD = PB$  ،  $PD < PB$  )

[5] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 30^\circ$  ،  $\angle D = 30^\circ$  ،

فإن :  $PD$  ....  $PB$

(  $=$  ،  $=$  ،  $>$  ،  $<$  )

[6] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P < \angle B$  ،  $\angle D < \angle B$  ،

فإن :  $PD$  ....  $PB$

(  $=$  ،  $=$  ،  $>$  ،  $<$  )

(٩) أكمل ما يلي :

[1] أصغر زوايا المثلث في القياس يقابلها .... الأضلاع طولاً

[2] أكبر أضلاع المثلث القائم الزاوية طولاً هو ....

[3] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 50^\circ$  ،  $\angle D = 30^\circ$  ،

فإن أصغر أضلاع المثلث طولاً هو ....

[4] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 60^\circ$  ،  $\angle D = 70^\circ$  ،

فإن أكبر أضلاع المثلث طولاً هو ....

[5] في  $\Delta PBD$  إذا كان :  $\angle P = 110^\circ$  ،

فإن أكبر أضلاع المثلث طولاً هو ....

أحمد الشنتوري

## الدرس الرابع : متباينة المثلث المثلث

حقيقة :

فى أى مثلث يكون مجموع طولى أى ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث  
أى أنه : فى أى  $\triangle PAB$  يكون :

$$PA + PB > AB$$

$$PA + AB > PB$$

$$PB + AB > PA$$



ملاحظة (١) :

لبحث صلاحية أى ثلاثة أعداد لأن تكون أطوال أضلاع مثلث  
نجمع أصغر عددين منهم و نقارن مجموعهما بالعدد الثالث فإذا كان :

(١) مجموعهما أصغر من أو يساوى العدد الثالث

فإن هذه الأعداد لا تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث

(٢) إذا كان مجموعهما أكبر من العدد الثالث

فإن هذه الأعداد تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث

فمثلاً :

(١) الأعداد : ٧ ، ١١ ، ٤ لا تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث

$$11 = 7 + 4$$

(٢) الأعداد : ٣ ، ٨ ، ١٣ لا تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث

$$13 > 11 = 8 + 3$$

(٣) الأعداد : ١٤ ، ٧ ، ٩ تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث

$$14 < 16 = 7 + 9$$

(١) بين أى الأعداد التالية تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث :

$$[1] 9, 6, 3$$

$$[2] 7, 10, 6$$

$$[3] 0, 0, 0$$

$$[4] 6, 4, 4$$

$$[5] 11, 6, 4$$



## ملاحظة (٢) :

من متباينة المثلث نجد أن فى أى  $\Delta$   $a, b, c$  يكون :  
 $a + b > c$  ،  $a + c > b$  ،  $b + c > a$  (١)  
 أى أن :  $a - b < c$  ،  $a - c < b$  ،  $b - a < c$  (٢)  
 من (١) ، (٢) ينتج :  $a - b < c < a + b$  ،  $a - c < b < a + c$  ،  $b - a < c < b + a$   
 $\therefore a - b < c < a + b$  ،  $a - c < b < a + c$  ،  $b - a < c < b + a$  ]

أى أن :  
 طول أى ضلع فى المثلث أكبر من الفرق بين طولى الضلعين الآخرين  
 و أقل من مجموعهما

## فمثلاً :

لإيجاد الفترة التى ينتمى إليها طول الضلع الثالث للمثلث الذى فيه  
 طول الضلعين الآخرين هما : ٤ سم ، ٣ سم  
 نفرض أن : طول الضلع الثالث =  $d$  سم  
 $\therefore 3 - 4 < d < 3 + 4$   
 $\therefore d \in ] -1, 7 [$

(٢) أوجد الفترة التى ينتمى إليها طول الضلع الثالث للمثلث الذى فيه  
 طول الضلعين الآخرين هما : ٥ سم ، ٨ سم

## (٣) أكمل ما يلى :

- [١] فى أى مثلث يكون مجموع طولى أى ضلعين .... طول الضلع الثالث  
 [٢] فى  $\Delta$   $a, b, c$  يكون :  $a - b < c$  ،  $a - c < b$  ،  $b - a < c$  ....  
 [٣] إذا كان طولاً ضلعين فى مثلث هما : ٤ سم ، ٩ سم  
 فإن : أصغر عدد صحيح يمثل طول الضلع الثالث = .... سم  
 [٤] إذا كان طولاً ضلعين فى مثلث هما : ٥ سم ، ٨ سم  
 فإن : أكبر عدد صحيح يمثل طول الضلع الثالث = .... سم  
 [٥] إذا كان طولاً ضلعين فى مثلث متساوى الساقين هما :  
 ٤ سم ، ٨ سم فإن : طول الضلع الثالث = .... سم  
 [٦] إذا كان طولاً ضلعين فى مثلث هما : ٤ سم ، ٧ سم  
 فإن : الفترة التى ينتمى إليها طول الضلع الثالث = ....  
 [٧] إذا كان طولاً ضلعين فى مثلث هما : ٤,٥ سم ، ٧,٥ سم  
 فإن : الفترة التى ينتمى إليها طول الضلع الثالث = ....  
 [٨] إذا كان طولاً ضلعين فى مثلث هما :  $2\sqrt{2}$  سم ،  $5\sqrt{2}$  سم  
 فإن : الفترة التى ينتمى إليها طول الضلع الثالث = ....

(٤) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] طول أى ضلع الثالث في مثلث .... مجموع طولي الضلعين الآخرين

( أصغر من ، أكبر من ، يساوي ، ضعف )

[٢] إذا كان : طولا ضلعين في مثلث هما : ٤ سم ، ٧ سم فإن :

طول الضلع الثالث يمكن أن يكون .... سم

( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ )

[٣] إذا كان : طولا ضلعين في مثلث متساوي الساقين هما : ٢ سم ،

٥ سم فإن : طول الضلع الثالث = .... سم

( ٧ ، ٥ ، ٣ ، ٢ )

[٤] مثلث طولا ضلعين فيه هما : ٤ سم ، ٩ سم وله محور تماثل

واحد فإن : طول الضلع الثالث = .... سم

( ٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ )

[٥] مجموعة الأعداد التي تصلح أن تكون أطوال مثلث هي ....

{ ٧ ، ٣ ، ٣ } ، { ٦ ، ٣ ، ٣ } ، { ٥ ، ٣ ، ٠ } ،

{ ٥ ، ٣ ، ٣ } ،

[٦] إذا كان : طولا ضلعين في مثلث هما : ٥ سم ، ١٠ سم فإن :

طول الضلع الثالث  $\supset$  ....

( [ ١٥ ، ٥ ] ، [ ١٥ ، ١ ] ، [ ١٥ ، ٠ ] ، [ ١٥ ، ٥ ] )


[٧] الأعداد : ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٧ تصلح أن تكون أطوال أضلاع

مثلث إذا كانت س = ....

( صفر ، ١ ، ٢ ، ٤ )

(٥) في الشكل المقابل :


أ ب = ب د أثبت أن : ب ع < د ع



(٦) في الشكل المقابل :

م نقطة داخل  $\triangle$  أ ب د أثبت أن :

$m + n + p < \frac{1}{2}$  محيط  $\triangle$  أ ب د



أحمد الشنتوري

(٧) برهن أن :

طول أي ضلع في مثلث أصغر من نصف محيط المثلث

(٩) برهن أن :

مجموع طولى قطري أي شكل رباعي محدب أصغر من محيط الشكل

أحمد الشنتوري

(٨) برهن أن :

محيط أي شكل رباعي أصغر من ضعف مجموع طولى قطريه

## الوحدة الأولى

## اجوبة بعض التمارين

## الأعداد الحقيقية

## الدرس الأول : الجذر التكعيبي للعدد النسبي

العدد p	٢٧	٨ -	١٢٥ -	٢١٦	٤
$\sqrt[3]{p}$	٣	٢ -	٥ -	٦	$\sqrt[3]{4}$
العدد p	$\frac{1}{27}$ -	٠,٠٠١	$3\frac{3}{8}$ -	٠,١٢٥ -	$\frac{216}{343}$ -
$\sqrt[3]{p}$	$\frac{1}{3}$ -	٠,١	$\frac{3}{2}$ -	٠,٥	$\frac{6}{7}$ -

$$(٢) \quad ٣ - [١] \quad ٦٤ [٢] \quad ٥ [٣] \quad ٠ [٤] \quad ٦٤ [٤] \quad ٤ [٥] \quad ٤ [٦] \quad ٢ - ٢ = \text{صفر}$$

$$[٧] \quad ٥ = ٢ + ٣ \quad [٨] \quad ٤ = ٤ - ٨ \quad [٩] \quad ٦١$$

$$(٣) \quad ٤ [١] \quad \frac{1}{4} [٢] \quad ٢ [٣] \quad ٢ [٤]$$

$$[٥] \text{ س } ٢ [٦] \quad ٨ [٧] \quad ١٠ [٨]$$

بضرب الطرفين  $\times (٣)$ 

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \left\{ \frac{3}{4} \right\}$$

بإضافة (٧) للطرفين

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{ ٣ \}$$

$$(٤) \quad [١] \quad \frac{1}{3} \text{ س } ٣ = \frac{27}{64}$$

$$\therefore \text{س } ٣ = \frac{27}{8}$$

$$\therefore \text{س } \frac{3}{2} =$$

$$[٢] \quad \therefore \text{س } ٣ - ٧ = ٢٠$$

$$\therefore \text{س } ٣ = ٢٧$$

$$\therefore \text{س } ٣ =$$

$$[٣] \quad \therefore ٨ \text{ س } ٣ = ٧ + ٨$$

$$\therefore ٨ \text{ س } ٣ = ١$$

$$\therefore \text{س } ٣ = \frac{1}{8}$$

$$\therefore \text{س } \frac{1}{8} =$$

$$[٤] \quad \therefore (٢ - \text{س}) ٣ = ٦٤$$

$$\therefore \text{س } ٢ - ٤ =$$

$$\therefore \text{س } ٦ =$$

$$[٥] \quad \therefore (١ - \text{س}) ٣ = ٨$$

$$\therefore ١ - \text{س} = ٢$$

$$\therefore \text{س} = ١$$

$$\therefore \text{س} = ١ -$$

بإضافة (٧) للطرفين

بقسمة الطرفين على (٨)

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \left\{ \frac{1}{8} \right\}$$

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

بإضافة (٢) للطرفين

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{ ١ - \}$$

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

بإضافة (١) للطرفين

بقسمة الطرفين على (١ -)

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{ ١ - \}$$

$$[٦] \quad \therefore (٥ - \text{س}) ٣ = ٣٠ + ٣$$

$$\therefore (٥ - \text{س}) ٣ = ٢٧$$

$$\therefore ٥ - \text{س} = ٣$$

$$\therefore ٥ = \text{س} + ٥$$

$$\therefore \text{س} = ١$$

$$(٥) \quad \therefore \text{حجم الكرة} = \frac{4}{3} \pi \left( \frac{3}{4} \right)^3 \quad \therefore \frac{4}{3} \pi \left( \frac{3}{4} \right)^3 = \pi \frac{27}{64}$$

$$\therefore \text{بالاختصار ينتج : } \frac{27}{64} = \frac{1}{8}$$

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

$$\frac{2}{3} = \text{نقطة وحدة طول}$$

(٦) نفرض أن العدد = س

∴ نصف مكعبه =  $\frac{1}{3} \text{ س}^3$

بالضرب × ٢

$$\frac{1}{3} \text{ س}^3 = ٢٥٦$$

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

$$\frac{1}{3} \text{ س}^3 = ٥١٢$$

∴ العدد هو : ٨

$$\text{س} = \sqrt[3]{٥١٢} = ٨$$

الدرس الثاني : مجموعة الأعداد غير النسبية ( د )

$$(١) \sqrt{١} \text{ د } [٢] \text{ د } [٣] \text{ د } [٤] \text{ د } [٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

$$(٢) \sqrt{١} \text{ د } [٢] \text{ د } [٣] \text{ د } [٤] \text{ د } [٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

بالقسمة على ٥

$$(٣) [١] \text{ د } [٢] \text{ د } [٣] \text{ د } [٤] \text{ د } [٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$\text{س}^2 = ٤$$

، س ⊃ ٢

$$\text{س}^2 = ٢ \pm$$

بالقسمة على ٢

$$[٢] \text{ د } [٣] \text{ د } [٤] \text{ د } [٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

$$\text{س}^3 = ٣$$

، س ⊃ ٣

$$\text{س}^3 = ٣ \pm$$

بالقسمة على ٣

$$[٣] \text{ د } [٤] \text{ د } [٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$\text{س}^2 = ٨$$

، س ⊃ ٨

$$\text{س}^2 = ٨ \pm$$

$$[٤] \text{ د } [٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

$$[٤] \text{ د } [٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

$$\text{س} - ٢ = ١$$

$$\text{س} = ٣ \text{ ، س} \supset ٣$$

$$[٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

$$[٥] \text{ د } [٦] \text{ د } [٧] \text{ د } [٨] \text{ د}$$

$$\text{س} - ١ = ٢ \text{ أو } \text{س} - ١ = ٢$$


$$\text{س} = ٣ \text{ أو } \text{س} = ١ \text{ ، س} \supset ٣$$

(٤) نفرض أن : طول ضلع المربع = ل سم ∴ مساحته = ل<sup>٢</sup>

$$\text{ل}^2 = ٦ \text{ ∴ } \sqrt{٦} = \text{ل سم}$$

أى أن : طول ضلع المربع =  $\sqrt{٦}$  سم

(٥) من الشكل المقابل :



٢١ = ب ( يمثل طول الجزء الثابت فوق

الأرض من الشجرة )

، ∴ طول الشجرة = ٣

$$\text{س}^2 = ١ - ٣ = ٢$$

من Δ ب د : ( ب د ) = ٩٠°

$$\text{∴ ( ب د )} = \text{( ب د )} - \text{( ب د )} = \text{( ب د )} - \text{( ب د )} = \text{( ب د )}$$

$$\text{س} = ١ - ٤ =$$

$$\text{س} = \sqrt{٣} \text{ ∴ ب د} = \sqrt{٣}$$

أى أن : المسافة بين قاعدة الشجرة و نقطة تلاقي قمتها مع الأرض

$$\sqrt{٣} \text{ متر}$$

## الدرس الثالث : إيجاد قيمة تقريبية للعدد غير النسبي

$$(1) \quad 1, 3 \quad [1] \quad 4, 3 \quad [2] \quad 6, 0 \quad [3] \quad 3 - , 2 - [3] \quad 4 [4] \quad 0$$

$$(2) \quad [1] \quad 9 > 0 > 4 \quad \therefore \text{بأخذ الجذر التربيعي للأطراف}$$

$$\therefore 2 < \sqrt{0} < 3 \quad \text{أي أن : } \sqrt{0} = 0 = 2 + \text{كسر عشري}$$

و بالتجريب :  $(2, 2)$  ،  $(2, 3)$  نجد :

$$0, 29 = (2, 3) \quad , \quad 4, 84 = (2, 2)$$

$$\therefore 4, 84 > 0 > 0, 29 \quad \text{و بأخذ الجذر التربيعي}$$

$$\therefore 2, 2 < \sqrt{0} < 2, 3 \quad \therefore \text{ينحصر بين } 2, 2 \text{ ، } 2, 3$$

$$\therefore 2, 2 = \sqrt{0} \quad \text{لأقرب جزء من عشرة}$$

$$[2] \quad 16 > 11 > 9 \quad \therefore \text{بأخذ الجذر التربيعي للأطراف}$$

$$\therefore 3 < \sqrt{11} < 4 \quad \text{أي أن : } \sqrt{11} = 3 + \text{كسر عشري}$$

و بالتجريب :  $(3, 31)$  ،  $(3, 32)$  نجد :

$$11, 0224 = (3, 32) \quad , \quad 10, 9571 = (3, 31)$$

$$\therefore 11, 0224 > 11 > 10, 9571 \quad \text{و بأخذ الجذر التربيعي}$$

$$\therefore 3, 31 < \sqrt{11} < 3, 32 \quad \therefore \text{ينحصر بين } 3, 31 \text{ ، } 3, 32$$

$$\therefore 3, 31 = \sqrt{11} \quad \text{لأقرب جزء من مائة}$$

$$[3] \quad 8 > 2 > 1 \quad \therefore \text{بأخذ الجذر التكعيبي للأطراف}$$

$$\therefore 1 < \sqrt[3]{2} < 2 \quad \text{أي أن : } \sqrt[3]{2} = 1 + \text{كسر عشري}$$

و بالتجريب :  $(1, 2)$  ،  $(1, 3)$  نجد :

$$1, 728 = (1, 2) \quad , \quad 2, 197 = (1, 3)$$

$$\therefore 1, 728 > 2 > 2, 197 \quad \text{و بأخذ الجذر التكعيبي}$$

$$\therefore 1, 2 < \sqrt[3]{2} < 1, 3 \quad \therefore \text{ينحصر بين } 1, 2 \text{ ، } 1, 3$$

$$\therefore 1, 2 = \sqrt[3]{2} \quad \text{لأقرب جزء من عشرة}$$

$$(3) \quad 2 [1] \quad 0 [2] \quad 8 [3] \quad 1 [4] \quad 2 [0] \quad 2 [6] \quad 4$$

$$(4) \quad [1] \quad 7 \sqrt[3]{- [2]} \quad 3, 17 [3] \quad 3 [4] \quad 3$$

$$(5) \quad [1] \quad 0 \sqrt[3]{\quad} \quad \text{ينحصر بين } 2, 24 \text{ ، } 2, 25$$

$$\therefore 0 = \sqrt[3]{0} \times \sqrt[3]{0} \times \sqrt[3]{0} = (0 \sqrt[3]{\quad})$$

$$4, 9729 = (2, 23) \quad , \quad 0, 171 = (1, 8)$$

$$\therefore 4, 9729 > 0 > 0, 171 \quad \text{و بأخذ الجذر التربيعي}$$

$$\therefore 2, 24 < \sqrt{0} < 2, 25$$

$$\text{أي أن : } \sqrt{0} \text{ ينحصر بين } 2, 24 \text{ ، } 2, 25$$

$$[2] \quad \therefore \sqrt[3]{11} = \sqrt[3]{11 \sqrt[3]{\quad} \times \sqrt[3]{11 \sqrt[3]{\quad} \times \sqrt[3]{11 \sqrt[3]{\quad}}} = (11 \sqrt[3]{\quad})$$

$$13, 941408 = (2, 22) \quad , \quad 11, 089067 = (2, 23)$$

$$\therefore 13, 941408 > 11 > 11, 089067 \quad \text{و بأخذ الجذر التكعيبي}$$


$$\therefore 2, 22 < \sqrt[3]{11} < 2, 23$$

$$\text{أي أن : } \sqrt[3]{11} \text{ ينحصر بين } 2, 22 \text{ ، } 2, 23$$

$$(6) \quad [1] \quad \text{ارسم بنفسك مركزاً سن الفرجار في نقطة (و)}$$

$$\text{و ارسم قوساً على يمين النقطة هذه النقطة}$$

أحمد الشنتوري



$$\therefore 1.0 = \text{ل}$$

$$\therefore 1.0 \sqrt{2} = \text{ل}$$

أي أن : طول ضلع المربع =  $1.0 \sqrt{2}$  سم

$$\therefore \Delta \text{ ب ح د فيه : } \angle \text{ب ح د} = 90^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ب ح د} = \angle \text{ب ح د} + \angle \text{ح ب د} = \angle \text{ب ح د}$$

$$2.0 = 1.0 + 1.0 = \angle \text{ب ح د} + \angle \text{ح ب د} =$$

$$\therefore 2.0 \sqrt{2} = \text{ل}$$

أي أن : طول قطر المربع =  $2.0 \sqrt{2}$  سم

$$(9) \therefore \text{محيط الدائرة} = \pi \text{ ل}$$

$$\therefore \pi \text{ ل} = \pi \sqrt{2} \text{ ل} \text{ ، بالقسمة على } \pi \text{ ينتج :}$$

$$\text{ل} = \sqrt{2} \text{ سم}$$

$$\text{مساحة سطح الدائرة} = \pi \text{ ل} = \pi (\sqrt{2}) \times \pi = \pi \text{ سم}$$

الدرس الرابع : مجموعة الأعداد الحقيقية ح

$$(1) \text{ ح } [1] \text{ ح } [2] \text{ ح } [3] \text{ ح } [4] \text{ ح } [5] \text{ ح } [6] \text{ ح } [7]$$

$$(2) \text{ أجب بنفسك}$$

$$(3) \text{ ح } [1] \text{ ح } [2] \text{ ح } [3] \text{ ح } [4] \text{ ح } [5] \text{ ح } [6] \text{ ح } [7]$$

$$(4) \text{ أجب بنفسك}$$

$$\text{حيث : طول الوتر للمثلث} = \frac{1}{2} (1 + 3) = 2$$

$$\text{، طول الضلع الآخر للقائمة} = \frac{1}{2} (1 - 3) = 1$$

[2] ارسم بنفسك مركزاً سن الفرجار في نقطة (و)

و ارسم قوساً على يسار النقطة هذه النقطة

$$\text{حيث : طول الوتر للمثلث} = \frac{1}{2} (1 + 7) = 4$$

$$\text{، طول الضلع الآخر للقائمة} = \frac{1}{2} (1 - 7) = 3$$

[3] ارسم بنفسك مركزاً سن الفرجار في النقطة التي تمثل العدد 1

و ارسم قوساً على يسار النقطة هذه النقطة

$$\text{حيث : طول الوتر للمثلث} = \frac{1}{2} (1 + 6) = 3.5$$

$$\text{، طول الضلع الآخر للقائمة} = \frac{1}{2} (1 - 6) = 2.5$$

[4] ارسم بنفسك مركزاً سن الفرجار في النقطة التي تمثل العدد 1

و ارسم قوساً على يمين النقطة هذه النقطة

$$\text{حيث : طول الوتر للمثلث} = \frac{1}{2} (1 + 0) = 0.5$$

$$\text{، طول الضلع الآخر للقائمة} = \frac{1}{2} (1 - 0) = 0.5$$

(7) ارسم بنفسك ، يكون :  $\sqrt{13} = \text{ل}$  لأن :

$$13 = \angle \text{ب ح د} + \angle \text{ح ب د} = \angle \text{ب ح د} + \angle \text{ح ب د} = \angle \text{ب ح د}$$

ثم أكمل

(8) نفرض أن : طول ضلع المربع = ل سم

$$\therefore \text{مساحته} = \text{ل}^2$$

أحمد الشنتوري



## الدرس الخامس : علاقة الترتيب في ح

(1) رتب الأعداد تصاعدياً :

$$\sqrt[3]{-1} = -1, \quad \sqrt{-1} = i = \sqrt{-1}^{\frac{1}{2}}$$

الترتيب تصاعدياً :  $-\sqrt{20}$  ،  $-1$  ،  $\sqrt{2}$  ،  $\sqrt{27}$  ،  $7$

$$\sqrt[9]{-} = \mu_- = \sqrt[7]{-}^{\mu} \quad (7)$$

الترتيب تنازلياً :  $\sqrt{10}$  ،  $\sqrt{8}$  ،  $\sqrt{5}$  ،  $\sqrt{3}$  ،  $\sqrt{11}$

$$\langle 1 \rangle < \langle 0 \rangle < \langle 2 \rangle > \langle 3 \rangle = \langle 1 \rangle < \langle 1 \rangle \langle 3 \rangle$$

(٤) [١] موجبة [٢] سالبة [٣] موجبة [٤] سالبة [٥] موجبة [٦] موجبة

(0) أكتب عدد نسبي و أربعة أعداد غير نسبية تنحصر بين 0 ، ٧

$$\Sigma 9 = \begin{pmatrix} 1 \\ V \end{pmatrix}, \quad \Gamma 0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \therefore$$

∴ الأعداد : ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، .... ، ٣٦ ، .... ، ٤٨

تتخصر بين ٢٥ ، ٤٩ أى أن :

الأعداد:  $\sqrt{26}$ ,  $\sqrt{27}$ ,  $\sqrt{28}$ , ...,  $\sqrt{36}$ , ...,  $\sqrt{48}$

تتحصر بين 0 ، ٧ فيكون : العدد النسبي هو :  $\sqrt[3]{36} = ٦$

و الأربعة أعداد النسبية هي :  $\sqrt{28}$  ،  $\sqrt{28}$  ،  $\sqrt{27}$  ،  $\sqrt{26}$  :

توجد أعداد أخرى ....

(٦) بتربيع و تكعيب الطرفين ينتج :

$$\lambda = \sqrt[r]{r} = \sqrt[r]{(\sqrt[r]{r})^r} \quad , \quad 9 = \sqrt[r]{r^9} = \sqrt[r]{(\sqrt[r]{r^9})^r} \\ \sqrt[r]{r} < \sqrt[r]{r^9} \quad \therefore \quad \lambda < 9 \quad \therefore ,$$

## الدرس السادس : الفترات

$$\{s \geq s' > s - 1, s \in s : s\} \quad [1] \textcircled{1}$$

[۲]  $\{s : s \in \mathcal{H}, r > s > v\}$  ، مثل بنفسك

(۱) [۱، ۱] (۲) [۰، ۱] ، مثل بنفسك

$$\supset [9] \not\supset [8] \not\supset [7] \supset [6] \supset [5] \not\supset [4] \supset [3] \not\supset [2] \supset [1] \text{ (3)}$$

(2) [1]  $\{s : s \in \mathcal{H}, s \geq \varepsilon\}$  ، مثل بنفسك

$$\{s : s \in \mathcal{H}, s < r\} \quad [2]$$

(٥) (١)  $]- \infty, \infty[$  ، (٢)  $]-1, \infty[$  ، مثل بنفسك

$$\supset [9] \supset [8] \not\supset [7] \supset [6] \ni [5] \not\supset [4] \not\supset [3] \ni [2] \ni [1] (7)$$

(v) مثل بنفسك ، [١ - ، ٢ -] [٢ - ، ٣ -]

$$] \text{ ۲ - ، ۱ - } [ \text{ ۴} \quad [ \text{ ۳ ، . } [ \text{ ۳}$$

(۸) مثل بنفسك ، [۱] [ - ۴ ، ۳ ] [۲] ح

$$\left] \frac{1}{2} - \epsilon, \infty - \left[ \frac{1}{2} \right] \quad \left] \infty, \frac{3}{2} \left[ \frac{3}{2} \right]$$

$$[\xi, 1 - [\xi] \{0, 3\} [3]]0, 3 [2] [0, 3] [1] \quad (9)$$

[9]  $\emptyset$  [7]  $\cdot, 1$  [7]  $-\infty, 3$  [8]  $3, \epsilon$  [9] صفر

$$[\Lambda, \Lambda_-] \text{ [3]} \quad [9, \cdot] \text{ [7]} \quad [\mathbb{P}, \cdot] \text{ [1] (b)}$$

$$\begin{aligned} & \left[ \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right]_{\xi} = \left[ \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right]_{\xi} \\ & \left[ \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right]_{\xi} = \left[ \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right]_{\xi} \end{aligned}$$

$$[v, z] = \varnothing \cap \varnothing = \varnothing \quad ; \quad \varnothing \cup \varnothing = \varnothing$$

$$[y, z] = 0 \iff y = z$$

$$[\epsilon, \epsilon] = 0.$$

$$(12) \quad [6, 2] = \text{ص} , [4, 1] = \text{ص}$$

### الدرس السابع : العمليات على الأعداد الحقيقية

$$\begin{aligned} (1) \quad [2] \text{ صفر} & \quad \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4} \\ (2) \quad [1] \sqrt[3]{2} & \quad \sqrt[3]{2} \quad \sqrt[3]{3} \text{ صفر} \quad [4] 2 \quad [0] 4 \sqrt[3]{9} \\ [6] \sqrt[3]{2} & \quad \sqrt[3]{2} \quad [7] 2 \quad [8] 2 \quad [9] 2 - 1 \quad [10] \text{ الصفر} \\ (3) \quad [1] 10 - [0] 10 & \quad [2] 10 \\ (4) \quad [1] 7 & \quad \sqrt[3]{2} \quad \sqrt[3]{3} \quad [3] 3 \quad \sqrt[3]{2} \quad [4] 30 \quad [0] 16 \\ [6] 10 + 0 & \quad \sqrt[3]{2} \quad \sqrt[3]{3} - 1 \quad [7] 3 \quad \sqrt[3]{3} \quad [8] 1 \quad [9] 9 + 4 \quad \sqrt[3]{0} \\ [10] \sqrt[3]{3} & \quad [11] 1 \end{aligned}$$

$$(5) \quad [1] \text{ ص} + \text{ص} = \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3} + 2 + \sqrt[3]{3} = \text{ص}$$

$$[2] \text{ ص} \text{ ص} = (2 - \sqrt[3]{3})(2 + \sqrt[3]{3}) = 4 - 3 = 1$$

$$[3] \text{ ص} - \text{ص} = (2 - \sqrt[3]{3}) - (2 + \sqrt[3]{3}) = -2\sqrt[3]{3} = -\sqrt[3]{12}$$

$$\text{حل آخر : ص} = (2 + \sqrt[3]{3}) = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}$$

$$\text{ص} = (2 - \sqrt[3]{3}) = \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3}$$

$$2 - 1 = (1 - 1) \times 2 = \text{ص}$$

$$\therefore \text{المقدار} = \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3} + (2 - 1) - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} = 1$$

$$(7) \quad \text{تقدير } \sqrt[3]{10} \text{ هو : } 3 \quad \text{لأن : } 9 \sqrt[3]{3} = 27$$

$$\therefore \text{تقدير } (10 + 0) \text{ هو : } 3 + 0 = 3$$

$$\text{تقدير } \sqrt[3]{8} \text{ هو } 2 \quad \text{لأن : } 8 \sqrt[3]{2} = 16$$

$$\therefore \text{تقدير } (8 - 3) \text{ هو : } 5 \quad \text{لأن : } 1 = 8 - 3$$

$$\therefore \text{تقدير } (10 + 0)(8 - 3) \text{ هو : } 80 - 9 = 71$$

$$\text{و باستخدام الآلة الحاسبة نجد أن الناتج هو : } 71,8729$$

أي أن التقدير مقبول

$$(7) \quad \text{تقدير } \sqrt[3]{10} \text{ هو : } 2 \quad \text{لأن : } 16 \sqrt[3]{2} = 32$$

$$\therefore \text{تقدير } (10 + 2) \text{ هو : } 12 \quad \text{لأن : } 12 = 10 + 2$$

$$\text{تقدير } \sqrt[3]{20} \text{ هو } 3 \quad \text{لأن : } 27 \sqrt[3]{3} = 81$$

$$\therefore \text{تقدير } (20 - 3) \text{ هو : } 17 \quad \text{لأن : } 1 = 20 - 3$$

$$\therefore \text{تقدير } (10 + 2)(20 - 3) \text{ هو : } 200 - 6 = 194$$

$$\text{و باستخدام الآلة الحاسبة نجد أن الناتج هو : } 194,3192$$

أي أن التقدير مقبول

$$(8) \quad [1] 0 \sqrt[3]{2} \quad [2] 8 \quad [3] 40 \quad [4] 2 \sqrt[3]{3} - [5] 2 \sqrt[3]{0} - [6] 2 \sqrt[3]{0}$$

$$[7] 0 \sqrt[3]{2} \quad [8] 1 - \sqrt[3]{3} \quad [9] 2 \sqrt[3]{3} - [10] 0 \sqrt[3]{2} \quad [11] 40$$

$$[12] 31 \quad [13] 3 + 2 \sqrt[3]{2} \quad [14] 8 \sqrt[3]{2} \quad [15] 0$$

### الدرس الثامن : العمليات على الجذور التربيعية

$$(1) \quad \sqrt[3]{2} \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2 \times 2} = \sqrt[3]{4}$$

$$[2] \quad 0 \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{0 \times 2} = \sqrt[3]{0}$$

$$[3] \quad \sqrt[3]{3} \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{3 \times 16} = \sqrt[3]{48}$$

حل آخر : المقدار = (س + ص) = (٢٠ =

$$[٢] \text{ س} - \text{س ص} + \text{ص ص} = ١٤$$

$$(٦) \text{ س} = \sqrt{١٣} + \sqrt{٦} , \text{ س ص} = ٧$$

$$\therefore \text{ص} = \sqrt{٦} - \sqrt{١٣} , \text{ س} + \text{ص} = \sqrt{١٣} + \sqrt{٦}$$

$$[١] \text{ المقدار} = \sqrt{١٣} \text{ (س ص)} = ٤٩$$

$$(٧) \sqrt{٣} [١] \sqrt{٢} [٢] \sqrt{٢} [٣] ٢ [٤] ١٨ [٥] \sqrt{٢} [٦]$$

$$[٦] \sqrt{٢} \div \sqrt{٢} [٧] \sqrt{٥} [٨] \sqrt{٣} [٩] ٢ - [١٠] ١$$

$$(٨) [١] \sqrt{٣} - \sqrt{٢} [٢] (٣ , \sqrt{٢} , ٥)$$

$$[٣] (٢ + \sqrt{٢} - \sqrt{٥} + \sqrt{٥}) = ٢٠$$

$$[٤] \sqrt{٢} \times \frac{1}{\sqrt{٢}} = (١ + \sqrt{٧})(١ - \sqrt{٧}) = ١ - ٧ = -٦$$

$$[٥] \sqrt{٢} + ١ = \sqrt{٢} + \sqrt{٢} - \sqrt{٢} + \sqrt{٢} = ٢$$

$$[٧] \sqrt{٢} + \sqrt{٢} - \sqrt{٢} + \sqrt{٢} = ٢$$

الدرس التاسع : العمليات على الجذور التكعيبية

$$(١) \sqrt[٣]{٢} [١] \sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٣]{٥} [٢] \sqrt[٣]{٦} [٤] \sqrt[٣]{٣} [٥]$$

$$(٢) \sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٣]{٥} = \sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٣]{٥}$$

$$[٢] \sqrt[٣]{٥} = \sqrt[٣]{٢} + \sqrt[٣]{٣}$$

$$[٣] \sqrt[٣]{٤} = \sqrt[٣]{٣} + \sqrt[٣]{٣}$$

$$[٤] \sqrt[٣]{١٠} = \sqrt[٣]{٥} \times \sqrt[٣]{٢} = \sqrt[٣]{٥ \times ٢} \sqrt[٣]{٢} = \sqrt[٣]{١٠} \sqrt[٣]{٢}$$

$$[٥] \sqrt[٣]{٢} = \sqrt[٣]{٦} \times \frac{1}{\sqrt[٣]{٣}} = \sqrt[٣]{٦ \times ٣} \sqrt[٣]{\frac{1}{٣}} = \sqrt[٣]{١٨} \sqrt[٣]{\frac{1}{٣}}$$

$$(٢) [١] \sqrt[٣]{٧} = \sqrt[٣]{٥} + \sqrt[٣]{٢}$$

$$[٢] \sqrt[٣]{٥} - \sqrt[٣]{٢} = \sqrt[٣]{٥} - \sqrt[٣]{٢}$$

$$[٣] \sqrt[٣]{٥} = \sqrt[٣]{٦} - \sqrt[٣]{٢}$$

$$[٤] \sqrt[٣]{٢} = \sqrt[٣]{٤} + \sqrt[٣]{٣} - \sqrt[٣]{٨} - \sqrt[٣]{٧}$$

$$(٣) [١] \text{ مرافق العدد } (\sqrt[٣]{٢} + \sqrt[٣]{٥}) \text{ هو } (\sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٣]{٥})$$

و مجموعهما =  $\sqrt[٣]{٢} \sqrt[٣]{٥} = ٣$  و حاصل ضربهما =

$$[٢] \text{ مرافق العدد } (\sqrt[٣]{٧} - ٣) \text{ هو } (\sqrt[٣]{٧} + ٣)$$

و مجموعهما =  $٦$  و حاصل ضربهما =

$$[٣] \text{ مرافق العدد } (\sqrt[٣]{٢} + \sqrt[٣]{٦}) \text{ هو } (\sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٣]{٦})$$

و مجموعهما =  $\sqrt[٣]{٢} \sqrt[٣]{٦} = ٢$  و حاصل ضربهما =

(٤) بالضرب في مرافق المقام و الاختصار ينتج :

$$[١] \sqrt[٣]{٧} - \sqrt[٣]{٥} [٢] \sqrt[٣]{٤} + \sqrt[٣]{٧}$$

$$(٥) \text{ بالضرب في المرافق ينتج : ص} = \sqrt[٣]{٣} - \sqrt[٣]{٥}$$

$$\therefore \text{س} , \text{ص} \text{ مترافقان} , \text{س} = \sqrt[٣]{١٠} + \sqrt[٣]{٨}$$

$$\text{ص} = \sqrt[٣]{١٠} - \sqrt[٣]{٨} , \text{س ص} = ٢$$

$$[١] \text{س} + \sqrt[٣]{٢} + \text{س ص} + \text{ص} = ٢٠$$

محيط الجزء المظلل = هـ ب + ب ي +  $\frac{1}{4}$  محيط الدائرة

$$\therefore 20 = 20 + 20 + \frac{1}{4} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 20$$

$$\therefore 20 = \frac{22}{7} \times 20 \quad \text{و منها : } 20 = 7 \text{ سم}$$

$\therefore$  طول ضلع المربع = 7 سم  $\therefore$  مساحة المربع = 49 سم<sup>2</sup>

$$\text{مساحة الدائرة} = \frac{22}{7} \times 20 = 140 \text{ سم}^2$$

$$(4) \text{ مساحة القاعدة} = 72 \div 2 = 144 \text{ سم}^2$$

$$\text{طول ضلع القاعدة} = \sqrt{144} = 12 \text{ سم}$$

$$\therefore \text{المساحة الكلية} = (0 \times 12 + 0 \times 12 + 12 \times 12) \times 2 =$$

$$= 288 \text{ سم}^2$$

$$(5) \text{ طول حرف المكعب} = \sqrt[3]{120} = 0 \text{ سم}$$

$$\text{مساحة المكعب الكلية} = 0 \times 0 \times 1 = 10 \text{ سم}^2$$

$$(7) \text{ مساحة الوجه لـ واحد للمكعب} = 294 \div 1 = 49 \text{ سم}^2$$

$$\therefore \text{طول حرف المكعب} = \sqrt{49} = 7 \text{ سم}$$

$$\therefore \text{حجم المكعب} = 7 \times 7 \times 7 = 343 \text{ سم}^3$$

$$\text{حجم متوازي المستطيلات} = 0 \times \sqrt{0} \times \sqrt{0} \times 7 = 30 \text{ سم}^3$$

$\therefore$  حجم متوازي المستطيلات أكبر من حجم المكعب

$$(7) \text{ أبعاد الحوض هي : } 20 - 8 = 12 \text{ سم ، } 20 - 10 = 10 \text{ سم}$$

$$\therefore \text{حجم الحوض} = 2 \times 7 \times 12 = 168 \text{ سم}^3$$

$$(2) \quad 0 = \sqrt[3]{0} + \sqrt[3]{2} \times 2 - \sqrt[3]{0} = 2 + 2 = 4$$

$$(3) \quad \sqrt[3]{0} + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2} = 2 + 2 = 4$$

$$(4) \quad 2 + 2 = 4$$

$$0 = \sqrt[3]{0} + \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2} = 2 + 2 = 4$$

$$(2) \quad 2 + 2 = 4$$

$$\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2}$$

$$(5) \quad 2 \times 2 = 4 \quad (2) \quad 2 \times 2 = 4$$

الدرس العاشر : تطبيقات على الأعداد الحقيقية

$$(1) \quad \therefore \text{محيط الدائرة} = 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 20 = 88$$

و منها : 14 سم

$$\therefore \text{مساحة سطح الدائرة} = \pi r^2 = 20 \times 20 = 400$$

$$= \frac{22}{7} \times 14 \times 14 = 616 \text{ سم}^2$$

$$(2) \quad \therefore \text{مساحة الدائرة} = \pi r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256$$

$$\therefore 10 = 3.14 \div 3.14 = 1$$

$$\therefore \text{محيط الدائرة} = 2\pi r = 2 \times 3.14 \times 10 = 62.8 \text{ سم}$$

$$(3) \quad \text{نفرض أن : طول نصف قطر الدائرة} = 20$$

$$\therefore \text{طول ضلع المربع} = 20$$

∴ حجم الأسطوانة =  $\pi$  نق' ع =  $\frac{22}{7} \times 10 \times 29 = 1040$  سم<sup>٣</sup>

(١١) ∴ محيط القاعدة =  $\pi$  نق' ∴  $\frac{22}{7} \times 2 = 22$  ∴

و منها : نق' = ٧ سم ، ∴ حجم الأسطوانة =  $\pi$  نق' ع

∴  $380 = \frac{22}{7} \times 29 \times ع$  و منها : ع = ٢٥ سم

(١٢) ∴ حجم الأسطوانة =  $\pi$  نق' ع

∴  $7036 = 3,14 \times نق' \times 24$  و منها : نق' = ١٠ سم

∴ نق' = ١٠ سم

∴ المساحة الكلية للأسطوانة =  $\pi$  نق' ع +  $\pi$  نق' نق' =  $\pi$  نق' (ع + نق')

$3120,2 = 10 \times 3,14 \times 2 + 24 \times 10 \times 3,14 \times 2 =$

(١٣) ∴ حجم الأسطوانة =  $\pi$  نق' ع =  $\frac{22}{7} \times 10 \times 7 = 1040$  سم<sup>٣</sup>

حجم المكعب =  $11 \times 11 \times 11 = 1331$  سم<sup>٣</sup>

∴ حجم الأسطوانة أكبر من حجم المكعب

(١٤) ∴ حجم الأسطوانة =  $\pi$  نق' ع =  $\frac{22}{7} \times 11 \times 11 \times 0,0 =$

$3993 = 3993 \div 3 = 1331$  سم<sup>٣</sup>

∴ حجم المكعب الواحد =  $1331 \div 3 = 443,66$  سم<sup>٣</sup>

∴ طول حرف المكعب =  $\sqrt[3]{1331} = 11$  سم

(١٥) ∴ حجم الأسطوانة =  $\pi$  نق' ع ، ع = نق' ،

∴  $\pi$  نق' =  $\pi$  نق' ع = ع = ٣ سم

أحمد الشنتوري

، المساحة الكلية =  $(2 \times 17 + 2 \times 7 + 7 \times 17) \times 2 =$

$311$  سم<sup>٢</sup>

(٨) طول حرف المكعب =  $\sqrt[3]{1728} = 12$  سم

المساحة الكلية للمكعب = مساحة الوجه الواحد  $\times 6$

$864 = 6 \times 144 = 6 \times (12 \times 12) =$

المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات =  $1 \times (2 + 3) \times 2 =$

$10 = 1 \times 0 \times 2 =$

المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات =  $10 + (2 \times 3) \times 2 =$

$22 = 6 \times 2 + 10 =$

المساحة الكلية للجزء المتبقى =  $842 = 22 - 864 =$  سم<sup>٢</sup>

(٩) ∴ ارتفاع متوازي مستطيلات = ٣ سم

∴ مجموع الأربعة ارتفاعات =  $3 \times 4 = 12$  سم

، ∴ مجموع أطوال أحرفه =  $02 = 12 - 02 = 10$  سم

∴ مجموع باقى الأحرف الثمانية =  $12 - 02 = 10$  سم

، ∴ القاعدة مربعة الشكل ∴ طول الحرف =  $\frac{10}{4} = 2,5$  سم

∴ الحجم =  $70 = 3 \times 0 \times 0 =$  سم<sup>٣</sup>

(١٠) محيط قاعدة الأسطوانة = ب ح

∴  $\pi$  نق' = ٤٤ ∴  $\frac{22}{7} \times 2 = 44$  ∴ نق' = ٧

و منها : نق' = ٧ سم ، الارتفاع = ب = ١٠ سم

∴ مساحة سطح الكرة =  $\pi \times ٤$  ن. =  $٩ \times \frac{٢٢}{٧} \times ٤ = ١١٣$  سم<sup>٢</sup>  
 ، طول حرف المكعب =  $٣ \times ٢ = ٦$  سم  
 ∴ حجم المكعب =  $(٦)^٣ = ٢١٦$  سم<sup>٣</sup>  
 (٢٠) حجم المعدن = حجم الكرة الخارجى - حجم الكرة الداخلى  

$$= \pi \times \frac{٤}{٣} \text{ ن.} - \pi \times \frac{٤}{٣} \text{ ن.} =$$

$$= \pi \times \frac{٤}{٣} (\text{ن.} - \text{ن.}) =$$

$$= \frac{٢٢}{٧} \times \frac{٤}{٣} = (٢,١) - (٣,٥) = ١٤٠,٨٥٩ \text{ سم}^٣$$

∴ كتلة المعدن =  $١٤٠,٨٥٩ \times ٢٠ = ٢٨١٧$  جراماً

(٢١)  $\pi \times ٤$  [١]  $١,٥$  [٢]  $٢٤$  [٣]  $٢\sqrt{٤}$  [٤]  $١٠$  [٥]  $٤$  [٦]

الدرس الحادى عشر : حل المعادلات و المتباينات من الدرجة الأولى  
 فى متغير واحد فى ح

(١) مثل بنفسك الحل على خط الأعداد :

[١]  $٣ - ٦ = ٣$  ∴  $٦ - ٣ = ٣$  ∴ مجموعة الحل =  $\{ ٢ - \}$   
 [٢]  $٠ = ٣$  ∴ مجموعة الحل =  $\{ ٠ \}$   
 [٣]  $٤ - ٤ = ٤$  ∴ مجموعة الحل =  $\{ ٤ - \}$   
 [٤]  $\sqrt{٣} = ٣$  ∴  $\sqrt{٣} = ٣$  ∴ مجموعة الحل =  $\{ \sqrt{٣} \}$   
 [٥]  $١ + \sqrt{٢} = ١$  ∴ مجموعة الحل =  $\{ ١ + \sqrt{٢} \}$

∴ المساحة الجانبية للأسطوانة =  $\pi \times ٢ \times ٣ = ٣ \times ٣ \times \pi$   
 $\pi \times ١٨ =$   
 (١٦) كرة مساحة سطحها ١٢٥٦ سم<sup>٢</sup> أوجد حجمها (  $\pi = ٣,١٤$  )  
 ∴ مساحة سطح الكرة =  $\pi \times ٤$  ن.  
 $١٢٥٦ = ٣,١٤ \times ٤$  ن. ومنها : ن. =  $١٠$  سم  
 ∴ حجم الكرة =  $\pi \times \frac{٤}{٣} \text{ ن.} = ٣,١٤ \times \frac{٤}{٣} \times ١٠٠٠ = ٤١٨٧$  سم<sup>٣</sup>  
 (١٧) طول نصف قطر الكرة =  $٣$  سم  
 حجم الكرة =  $\pi \times \frac{٤}{٣} \text{ ن.} = ٣,١٤ \times \frac{٤}{٣} \times ٢٧ = \pi \times ٣٦$  سم<sup>٣</sup>  
 ، ∴ حجم الأسطوانة = حجم الكرة  
 $\pi \times ٣٦ = \pi \times ٩ \times ٤$  ∴  $\pi \times ٣٦ = \pi \times ٣٦$   
 ومنها :  $٤ = ٤$  سم  
 (١٨) حجم متوازى المستطيلات =  $٧٧ \times ٢٤ \times ٢١ = ٣٨٨٠٨$  سم<sup>٣</sup>  
 ، ∴ حجم الكرة = حجم متوازى المستطيلات  
 $\pi \times \frac{٤}{٣} \text{ ن.} = ٣٨٨٠٨$  ∴  $\frac{٢٢}{٧} \times \frac{٤}{٣} \text{ ن.} = ٣٨٨٠٨$   
 $\frac{٢١}{٨٨} \times ٣٨٨٠٨ = ٩٢٦١$  ومنها : ن. =  $٢١$  سم  
 (١٩) ∴ الكرة تلمس أوجه المكعب الستة ∴ طول حرف المكعب =  $٢$  ن.  
 ، ∴ حجم الكرة =  $\pi \times \frac{٤}{٣} \text{ ن.} = \pi \times ٣٦$  ∴  $\pi \times \frac{٤}{٣} \text{ ن.} = \pi \times ٣٦$   
 ∴ ن. =  $٣٦ = \frac{٢}{٤} \times ٢٧ = ٢٧$  ∴ ن. =  $٣$  سم

$$[6] \quad \sqrt{v} = s \quad \therefore \quad \sqrt{v} = s \quad \therefore \quad \sqrt{v} = s$$

$\therefore$  مجموعة الحل  $\{ \sqrt{v} \}$

(٢) مثل بنفسك الحل على خط الأعداد

$$[1] \quad s < 3 \quad \therefore \quad s < 1 \quad \therefore \quad \text{مجموعة الحل} = ] \infty, 1 [$$

$$[2] \quad s - 4 \leq -8 \quad \therefore \quad s \geq 2$$

$\therefore$  مجموعة الحل  $= ] -\infty, 2 [$

$$[3] \quad s - 2 > 2 \quad \therefore \quad s > 4 \quad \therefore \quad s \geq 3$$

$\therefore$  مجموعة الحل  $= ] 3, 1 - [$

$$[4] \quad \frac{1}{s} \geq 1 \quad \therefore \quad s \geq 2$$

$\therefore$  مجموعة الحل  $= ] -\infty, 2 [$

$$[5] \quad s - 2 \geq 5 \quad \therefore \quad s \geq 7$$

$$\therefore \quad s \geq \frac{7}{2} \quad \therefore \quad \text{مجموعة الحل} = [ \frac{7}{2}, \infty [$$

$$[6] \quad 1 - s \geq 3 - s \geq 0 \quad \therefore \quad s \geq 2 \quad \therefore \quad s \geq 8$$

$$\therefore \quad 1 \geq s \geq 4 \quad \therefore \quad \text{مجموعة الحل} = ] 4, 1 [$$

$$[7] \quad 2 > 3 - s \geq 1 - 8 \quad \therefore \quad s > 3 \quad \therefore \quad s \geq 9$$

$$\therefore \quad s > 1 \quad \therefore \quad \text{مجموعة الحل} = ] 3, 1 [$$

$$[8] \quad s - 2 > s + 1 \geq 3 \quad \therefore \quad s > 3 \quad \therefore \quad s \geq 1$$

$\therefore$  مجموعة الحل  $= ] 1, 3 - [$

$$(3) \quad p \geq s - 3 \geq s \geq 3 + p \quad \therefore \quad s \geq 3 + p$$

$$\therefore \quad \text{مجموعة الحل} = [ 3 + p, 3 + p ]$$

$$\therefore \quad [ 3 + p, 3 + p ] = [ 7, 4 ]$$

$$\therefore \quad 3 + p = 4 \quad \therefore \quad p = 1 \quad \therefore \quad \text{و منها : } p = 1$$

$$\therefore \quad 3 + p = 7 \quad \therefore \quad p = 4 \quad \therefore \quad \text{و منها : } p = 4$$

$$(4) \quad [1] \quad \{0\} \quad [2] \quad \{2\} \quad [3] \quad \{3\} \quad [4] \quad \{4\} \quad [5] \quad \{5\} \quad [6] \quad \{6\} \quad [7] \quad \{7\} \quad [8] \quad \{8\} \quad [9] \quad \{9\}$$

$$[10] \quad \{10\} \quad [11] \quad \{11\} \quad [12] \quad \{12\} \quad [13] \quad \{13\} \quad [14] \quad \{14\} \quad [15] \quad \{15\} \quad [16] \quad \{16\} \quad [17] \quad \{17\} \quad [18] \quad \{18\} \quad [19] \quad \{19\}$$

$$[20] \quad \{20\} \quad [21] \quad \{21\} \quad [22] \quad \{22\} \quad [23] \quad \{23\} \quad [24] \quad \{24\} \quad [25] \quad \{25\} \quad [26] \quad \{26\} \quad [27] \quad \{27\} \quad [28] \quad \{28\} \quad [29] \quad \{29\}$$

$$(5) \quad [1] \quad \{1\} \quad [2] \quad \{2\} \quad [3] \quad \{3\} \quad [4] \quad \{4\} \quad [5] \quad \{5\} \quad [6] \quad \{6\} \quad [7] \quad \{7\} \quad [8] \quad \{8\} \quad [9] \quad \{9\}$$

$$[10] \quad \{10\} \quad [11] \quad \{11\} \quad [12] \quad \{12\} \quad [13] \quad \{13\} \quad [14] \quad \{14\} \quad [15] \quad \{15\} \quad [16] \quad \{16\} \quad [17] \quad \{17\} \quad [18] \quad \{18\} \quad [19] \quad \{19\}$$

## الوحدة الثانية

### العلاقة بين متغيرين

#### الدرس الأول : العلاقة بين متغيرين

(1) نفرض أن : عدد الأوراق فئة 0 جنيهاً هو س

$\therefore$  قيمتها = 0 س جنيهاً

و عدد الأوراق فئة 2 جنيهاً هو : ص  $\therefore$  قيمتها = 2 ص جنيهاً

$$\therefore \quad 0 \text{ س} + 2 \text{ ص} = 80 \quad \text{بالقسمة على 0}$$

$$\therefore \quad 0 \text{ س} + 2 \text{ ص} = 17 \quad \therefore \quad 17 = 2 \text{ ص} \quad \therefore \quad 17 = 2 \text{ ص}$$

و تكون الإمكانات المختلفة هي :

س	13	9	5	1
ص	1	2	3	4



(٢) نفرض أن : طول أى من الضلعين المتساويين في المثلث = س سم

، طول الضلع الثالث = ص سم

∴ محيط المثلث = ١٩ سم

∴ ص = ١٩ - ٢س ، ∴ س ، ص ⊆ ص

∴ س لا يمكن أن تزيد عن ٩

، ∴ مجموع طولى أى ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع الثالث

∴ س تأخذ القيم : ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥

، ص تأخذ القيم : ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١

أى أن : الإمكانيات المختلفة هي :

س	٩	٨	٧	٦	٥
ص	١	٣	٥	٧	٩

(٣) [١] س + ٥ = ٢ص

بوضع ص = .

∴ س = . × ٢ + ٥ = ٥

∴ ( . ، ٥ ) يحقق العلاقة

بوضع ص = ١

∴ س = ١ × ٢ + ٥ = ٧

∴ ( ١ ، ٧ ) يحقق العلاقة

بوضع ص = ٢

∴ س = ٢ × ٢ + ٥ = ٩

∴ ( ٢ ، ٩ ) يحقق العلاقة

[٢] س = ١٠ - ٥ = ٥

بوضع ص = .

∴ س = . × ٥ - ١٠ = ١٠

∴ ( . ، ٥ ) يحقق العلاقة

أحمد الشنتوري

بوضع ص = ٢ ∴ س = ٢ × ٥ - ١٠ = .

∴ س = . ∴ ( ٢ ، . ) يحقق العلاقة

بوضع ص = ٢ - ∴ س = ٢ × ٥ - ١٠ = ٢٠

∴ س = ١٠ ∴ ( ٢ - ، ١٠ ) يحقق العلاقة

(٤) [١] نضع : س = ٥ ، ص = ٣

∴ س - ص = ٢ × ٥ - ٣ = ٧ ≠ ١

∴ ( ٣ ، ٥ ) لا يحقق العلاقة

[٢] نضع : س = ٣ ، ص = ٥

∴ س - ص = ٢ × ٣ - ٥ = ١

∴ ( ٥ ، ٣ ) يحقق العلاقة

[٣] نضع : س = ٢ - ، ص = ٥ -

∴ س - ص = ٢ × (٢ -) - (٥ -) = ١

∴ ( ٥ - ، ٢ - ) يحقق العلاقة

(٥) [١] ٧ [٢] ١١ - [٣] ٢ [٤] ( ٣ ، ١ )

[٥] ( ٣ ، ٢ ) [٦] ص = ٣ + ١

(٦) ٢س - ص = ٣

بوضع س = . ∴ س = ٣ - . × ٢

∴ ص = ٣ - ∴ ( ٣ - ، . ) يحقق العلاقة

بوضع س = ١ ∴ س = ٣ - ١ × ٢

∴ ص = ١ - ∴ ( ١ - ، ١ ) يحقق العلاقة

بوضع س = ٢ ∴ س = ٣ - ٢ × ٢

الدرس الثاني : ميل الخط المستقيم و تطبيقات حياتية

$$(1) \quad \frac{1}{3} = \frac{1-2}{1-2} = 2 \quad [1] \quad \frac{0}{3-1} = 0 \quad [2]$$

$$[3] \quad 1 = \frac{2-0}{2+0} = 2 \quad [4] \quad 1 = \frac{3+2}{1+2} = 0$$

$$(2) \quad 0 = \frac{1-1}{1+1} = 0 \quad \therefore 0 = \frac{0}{1+1} = 0$$

$$\therefore 0 = 0 + 1 = 1 \quad \therefore 0 = 0 + 1 = 1$$

$$(3) \quad \frac{2}{3} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

$$(4) \quad \therefore \text{المستقيم يمر بالنقطتين } (1, 3), (2, 1)$$

$$\therefore \text{ميله} = \frac{1-3}{2-1} = -2 \quad \therefore \frac{2}{3} = \frac{1-3}{2-1} = -2$$

$$\therefore 3 = 3 - 1 = 2 \quad \therefore 3 = 3 - 1 = 2$$

$$\therefore \text{المستقيم يمر بالنقطتين } (1, 3), (2, 1)$$

$$\therefore \text{ميله} = \frac{1+3}{3-9} = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3} \quad \therefore \frac{2}{3} = \frac{1+3}{3-9} = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore 12 = 3 + 3 = 6 \quad \therefore 12 = 3 + 3 = 6$$

$$(5) \quad \text{ميل } \vec{AB} = \frac{1+2}{1-3} = -\frac{3}{2} \quad \text{ميل } \vec{BC} = \frac{2-0}{3-2} = 2$$

$$\therefore \text{ميل } \vec{AC} = \frac{1+0}{2-2} = \text{غير معرف}$$

نلاحظ أن : النقط  $A, B, C$  ليست على استقامة واحدة

$$(6) \quad \therefore \text{المستقيم يوازي محور السينات} \quad \therefore \text{ميله} = 0$$

$$\therefore 4 = 4 - 0 = 4 \quad \therefore 4 = 4 - 0 = 4$$

$$(7) \quad \text{ميل المستقيم المار بالنقطتين } (1, 2), (2, 1) = \frac{1-2}{2-1} = -1$$

$$\therefore \text{ميل المستقيم المار بالنقطتين } (3, 3), (7, 2) = \frac{3-2}{7-3} = \frac{1}{4}$$

أحمد الشنتوري

$$\therefore \text{ص} = 1 \quad \therefore (1, 2) \text{ يحقق العلاقة}$$

كون الجدول و أرسم المستقيم بنفسك

$$(8) \quad \text{بوضع : ص} = 0 \quad \text{ينتج : س} = 2$$

$$\therefore \text{نقطة تقاطع المستقيم مع محور السينات هي } (2, 0)$$

$$\text{بوضع : س} = 0 \quad \text{ينتج : ص} = -4$$

$$\therefore \text{نقطة تقاطع المستقيم مع محور الصادات هي } (0, -4)$$

أرسم المستقيم بنفسك


$$(9) \quad \therefore \text{المستقيم يقطع محور السينات في النقطة } (3, 0)$$

$$\therefore 2 = 2 \quad \therefore (0, 3) \text{ تحقق العلاقة : } 2 - 3 = -1$$

$$\therefore 6 = 3 \times 2 = 6 \quad \therefore 6 = 3 \times 2 = 6$$

$$(10) \quad 6 = 3 + 3 = 6$$

س	ص	3	6
ص	س	0	2



من الرسم :

$$\text{مساحة } \triangle \text{ و } P = 3$$

$$= 3 \times 2 \times \frac{1}{2}$$

$$= 3 \text{ وحدة مربعة}$$

أحمد الشنتوري

[٢] السرعة المنتظمة للسيارة خلال رحلة الذهاب = ميل  $\vec{p}$  ب

$$= \frac{0 - 70}{-3} = 20 \text{ كم / س}$$

[٣] المسافة الكلية خلال رحلة العودة = ٦٠ كم

[٤] الزمن الكلي خلال رحلة العودة = ٥ ساعة

[٥] سرعة المتوسطة للسيارة خلال رحلة العودة =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$

$$= \frac{70}{5} = 14 \text{ كم / س}$$

[٦] القطعة المستقيمة الأفقية بالشكل تدل على توقف السيارة خلال

الساعة السادسة من بدء الحركة

[٣] [١] أكبر سعة للخرزان = ٧٠ لتر

[٢] يفرغ الخزان بعد مرور ٣٠ ساعة

[٣] بعد مرور ١٥ ساعة يتبقى بالخرزان ٣٥ لتر

[٤] يتبقى بالخرزان ١٠ لتر بعد مرور ٢٥ ساعة

[٥]  $\vec{p} = (0, 70)$  ،  $\vec{b} = (30, 0)$

$$\vec{p} = \frac{0 - 70}{30 - 0} = -\frac{7}{3} \text{ ميل ب}$$

[٧] معدل استهلاك الوقود في الساعة الواحدة =  $-\frac{7}{3}$  لتر / ساعة

[٤] [١] عدد صفحات الكتاب المتبقية عن بداية القراءة = ١٠٠ صفحة

[٢]  $\vec{p} = (100, 0)$  ،  $\vec{b} = (30, 0)$

$$\vec{p} = \frac{100 - 0}{30 - 0} = \frac{10}{3} \text{ ميل ب}$$

[٤] معدل الصفحات المقرؤة في الساعة الواحدة = ٢٠ صفحة / ساعة

و يعني أن عدد الصفحات ينقص بمعدل ٢٠ صفحة / ساعة

∴ ميلا المستقيمان متساويان  $\frac{2}{1} = \frac{7+3}{0+3} =$

$$(8) \text{ ميل } \vec{p} \text{ ب} = \frac{3-0}{1+2} = \frac{3}{3} = 1 \text{ ميل ب} \text{ ح} = \frac{0-1}{2-8} = \frac{-1}{-6} = \frac{1}{6}$$

∴  $\vec{p} \neq \vec{b}$

(٩) [١] سالب [٢] صفر [٣] غير معرف [٤] موجب

تطبيقات حياتية على ميل الخط المستقيم :

(١) [١]  $\vec{p} = (0, 20)$  ،  $\vec{b} = (4, 70)$

$\vec{b} = (7, 70)$  ،  $\vec{a} = (0, 50)$

$$\vec{p} = \frac{20-0}{0-4} = -5 \text{ ميل ب}$$

و هو يعبر عن تزايد رأس مال الشركة بمعدل ١٠ آلاف جنيه

خلال السنوات الأربعة الأولى

$$[3] \text{ ميل } \vec{p} \text{ ب} = \frac{100-20}{3-0} = \frac{80}{3} = \text{صفر}$$

و هو يعبر عن ثبات رأس مال الشركة خلال السنتين الخامسة والسادسة

$$[4] \text{ ميل } \vec{b} = \frac{70-0}{7-8} = -70 \text{ ميل ب}$$

و هو يعبر عن تناقص رأس مال الشركة بمعدل ٥ آلاف جنيه

خلال السنتين الأخيرتين

[٥] رأس مال الشركة عند بدء العمل = الإحداثي الصادي عند ....

= .... ألف جنيه

(٢) [١]  $\vec{p} = (3, 70)$  ،  $\vec{b} = (5, 30)$

$\vec{b} = (7, 30)$  ،  $\vec{a} = (8, 0)$

∴ الزمن اللازم لقراءة بقية الصفحات = ٦. دقيقة

### الوحدة الثالثة الإحصاء

الدرس الأول : جمع البيانات و تنظيمها

(١) أكبر قيمة = ٤٤ (٢) أصغر قيمة = ١٥

(٣) المدى = ٤٤ - ١٥ = ٢٩

(٤) المدى =  $\frac{٢٩}{٥} \approx ٦$  مجموعة (٢) كون بنفسك

المجموعات	- ١٥	- ٢٠	- ٢٥	- ٣٠	- ٣٥	- ٤٠	المجموع
التكرار	٢	٥	١١	١٢	٦	٤	٤٠

(٤) عدد الأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٢٥ كجم = ٧ أطفال

(٥) عدد الأطفال الذين أوزانهم ٢٥ كجم فأكثر = ٣٣ طفل

(٢) أكبر قيمة = ٥٠ (٢) أصغر قيمة = ٢٠

(٣) المدى = ٥٠ - ٢٠ = ٣٠

المجموعات	- ٢٠	- ٢٥	- ٣٠	- ٣٥	- ٤٠	- ٤٥	المجموع
التكرار	٤	٣	٥	٧	٦	٥	٣٠

المجموعات	- ٣٠	- ٤٠	- ٥٠	- ٦٠	- ٧٠	- ٨٠	- ٩٠	المجموع
التكرار	٤	٥	٧	٨	٦	٤	٦	٤٠

المجموعة التي بها أكبر تكرار هي : ٦٠ -

المجموعة التي بها أقل تكرار هي : ٢٠ - ، ٨٠ -

[٥] انتهى سهير قراءة الكتاب بعد :  $\frac{١}{٢}$  = ٥ ساعات

(٥) [١]  $p = (٥, ٠)$  ،  $b = (٢٧, ٥)$  ،

$c = (٨, ٢٧, ٥)$  ،  $e = (١٠, ٤٠)$

[٢] عمق البئر قبل بدء عمل الحفار = ٥ متر

[٣] عمق البئر بعد انتهاء عمل الحفار = ٤٠ متر

[٣] الزمن الكلي الذي أستغرقه الحفار في الحفر = ١٠ ساعات

[٤] ميل  $\overrightarrow{p \rightarrow b} = \frac{٥ - ٢٧,٥}{٠ - ٥} = ٤,٥$

[٥] متوسط العمق الذي يحفره الحفار في الخمس ساعات الأولى

= ٤,٥ متر / ساعة

[٦] ميل  $\overrightarrow{c \rightarrow e} = \frac{٢٧,٥ - ٤٠}{٨ - ١٠} = ٦,٢٥$

[٧] متوسط العمق الذي يحفره الحفار في الساعتين الأخيرتين

= ٦,٢٥ متر / ساعة

(٦) [١] عدد الصفحات عند :  $n =$

هي :  $v = ٣٠ - \frac{١}{٢} \times n = ٣٠$

∴ عدد الصفحات المتبقية = ٣٠ صفحة

∴ عدد الصفحات التي سبق لهذا الشخص قراءتها =


$٦٠ - ٣٠ = ٣٠$  صفحة

[٢] الزمن اللازم لقراءة بقية الصفحات التي يكون عندها عدد

الصفحات =  $n$  أي عند :  $v =$


∴  $٣٠ - \frac{١}{٢} \times n = n$  ومنها :  $n = ٦٠$  دقيقة





[١] تلميذ ١٣

$$\% ٢٦ = \% ١٠٠ \times \frac{١٣}{٥٠} \quad [٢]$$



[١] ١٠

[٢] ٢٨ شخصاً

الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
١ فأكثر	٥٠
٢ فأكثر	٤٨
٣ فأكثر	٤٥
٤ فأكثر	٤٠
٥ فأكثر	٢٨
٦ فأكثر	١٣
٧ فأكثر	٦
٨ فأكثر	٠

الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
٥٥ فأكثر	٦٠
٦٠ فأكثر	٥٢
٦٥ فأكثر	٤٠
٧٠ فأكثر	٢٢
٧٥ فأكثر	١٢
٨٠ فأكثر	٥
٨٥ فأكثر	٢
٩٠ فأكثر	٠


(٣)

أحمد الشنتوي


(٤)

الدرس الثاني : الجدول التكراري المتجمع الصاعد  
و الجدول التكراري المتجمع النازل و تمثيلهما بيانياً

[١] ٣٦ عامل



الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٢٥	٠
أقل من ٣٠	٣
أقل من ٣٥	١٣
أقل من ٤٠	٣٢
أقل من ٤٥	٥٥
أقل من ٥٠	٦٠




$$\% ٣٧ = \% ١٠٠ \times \frac{٣٧}{١٠٠} \quad [٢]$$

[١] ٣٧ مصنع

الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٥٠	٠
أقل من ٦٠	٥
أقل من ٧٠	٢١
أقل من ٨٠	٥١
أقل من ٩٠	٧٢
أقل من ١٠٠	٨٨
أقل من ١١٠	١٠٠

(٦)

جدول التكرار المتجمع الصاعد	جدول التكرار المتجمع النازل
الحدود العليا للمجموعات	الحدود السفلى للمجموعات
التكرار المتجمع الصاعد	التكرار المتجمع النازل
أقل من ٠	٠ فأكثر
أقل من ١٠	١٠ فأكثر
أقل من ٢٠	٢٠ فأكثر
أقل من ٣٠	٣٠ فأكثر
أقل من ٤٠	٤٠ فأكثر
أقل من ٥٠	٥٠ فأكثر
أقل من ٦٠	٦٠ فأكثر



[١] ٦٠ طالب [٢] ٣٥ طالب

[٣] عدد الطلبة الحاصلين على ٢٠

درجة فأكثر = ٧٨ طالب

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{78}{100} \times 100\%$$

$$= 78\%$$

[٤] عدد الطلبة الحاصلين على ٤٠


درجة فأكثر = ٢٣ طالب

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{23}{100} \times 100\%$$

$$= 23\%$$

(٥)

جدول التكرار المتجمع الصاعد	جدول التكرار المتجمع النازل
الحدود العليا للمجموعات	الحدود السفلى للمجموعات
التكرار المتجمع الصاعد	التكرار المتجمع النازل
أقل من ٢٠	٢٠ فأكثر
أقل من ٣٠	٣٠ فأكثر
أقل من ٤٠	٤٠ فأكثر
أقل من ٥٠	٥٠ فأكثر
أقل من ٦٠	٦٠ فأكثر
أقل من ٧٠	٧٠ فأكثر
أقل من ٨٠	٨٠ فأكثر
أقل من ٩٠	٩٠ فأكثر
أقل من ١٠٠	١٠٠ فأكثر



[١] ٧٤٠ طالب

[٢] ١٤٠ طالب



## الدرس الثالث : الوسط الحسابي - الوسيط - المنوال

(١) (١) ١٠ (٢) ٥ (٣) ٧ (٤) ٤ (٥) ٧ (٦) ٦

(٢)

الوسط الحسابي

$$\frac{3090}{1000} =$$

$$3.09 =$$

المجموعة	مركز المجموعة (٢)	التكرار (١)	ك × ٢
- ٥	١٠	١٠	١٠٠
- ١٥	٢٠	٢٢	٤٤٠
- ٢٥	٣٠	٣٠	٩٠٠
- ٣٥	٤٠	٢٥	١٠٠٠
- ٤٥	٥٠	١٣	٦٥٠
المجموع		١٠٠	٣٠٩٠

$$٥٠ = ٨ + ١٣ + ١ + ١٠ + ٧ + ٣٥$$

و منها : ك = ١١

(٢)

المجموعة	مركز المجموعة (٢)	التكرار (١)	ك × ٢
- ٥	١٠	٧	٧٠
- ١٥	٢٠	١٠	٢٠٠
- ٢٥	٣٠	١١	٣٣٠
- ٣٥	٤٠	١٣	٥٢٠
- ٤٥	٥٠	٨	٤٠٠
المجموع		٥٠	١٥٢٠

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{1520}{50} = 30.4$$

(٤) (١) ٥ (٢) ٦

أحمد التنتوري


(٣)

المجموعة	مركز المجموعة (٢)	التكرار (١)	ك × ٢
- ٦	٨	٢	١٦
- ١٠	١٢	٣	٣٦
- ١٤	١٦	٥	٨٠
- ١٨	٢٠	٨	١٦٠
- ٢٢	٢٤	٦	١٤٤
- ٢٦	٢٨	٤	١١٢
- ٣٠	٣٢	٢	٦٤
المجموع		٣٠	٦١٢

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{612}{30} = 20.4$$

(٥) (١) ٥ (٢) ٦ (٣) الثالث (٤) ٩

(٦)




$$\therefore \text{ترتيب الوسيط} = \frac{6}{2} = 3$$


$$\therefore \text{من الرسم : الوسيط} = 39$$

أحمد التنتوري






من الرسم : الوسيط = ٤١



(٩) [١] ٩ [٢] ٤ [٣] ٣ [٤] ٧ [٥] ٨

(١٠) من الرسم :  
المنوال = ٣٤



∴ ترتيب الوسيط = ٥٠

∴ من الرسم : الوسيط = ٣١

(٧)

الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
١٥ فأكثر	١٠٠
٢٠ فأكثر	٩٠
٢٥ فأكثر	٧٥
٣٠ فأكثر	٥٣
٣٥ فأكثر	٢٨
٤٠ فأكثر	٨
٤٥ فأكثر	٠


(٨) [١] س = ٣٠ ، ل = ١٥

(٢)

الحدود العليا للمجموعات	التكرار المتجمع الصاعد	الحدود السفلى للمجموعات	التكرار المتجمع النازل
أقل من ١٠	٠	١٠ فأكثر	١٠٠
أقل من ٢٠	١٠	٢٠ فأكثر	٩٠
أقل من ٣٠	٢٧	٣٠ فأكثر	٧٣
أقل من ٤٠	٤٧	٤٠ فأكثر	٥٣
أقل من ٥٠	٧٩	٥٠ فأكثر	٢١
أقل من ٦٠	٩٦	٦٠ فأكثر	٤
أقل من ٧٠	١٠٠	٧٠ فأكثر	٠


(١١) من الرسم :

المنوال = ٣١



(١٢) من الرسم :

المنوال = ٥V



، ٤٠ = ٣٥ [١] (١٣)


$$0. = 1 + 0 + 1 - 0^3 + 1 + 0^3 + 0^2 + 0^3 + 2 + 0$$

$$3 = 0$$

المجموعات	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	المجموع
التكرار	٧	٩	١٢	١٠	٨	٤	٥٠

[٢] من الرسم أكمل :

المُنْوَال = ٤٣



(١٤) ١٨ [١] ١٠ [٢] ٧٢ [٣] ٤ [٤] ١٥ [٥] ٦ [٦] الثالث

 $\mathbb{F}[\wedge] \quad \vee \quad [\vee]$ 

(١٥) [١] المنوال [٢] الوسيط [٣] [٤] ٦

الوحدة الرابعة      متوسطات المثلث و المثلث المتساوي الساقين  
الدرس الأول : متوسطات المثلث

(1) متوسط [2] 3 [3] 1:2 [4] 3/4 [5]

$$\mathbb{F}[V] \quad \mathbb{F}[\Gamma] \quad \Sigma[0]$$

(٢) [١]  $\overline{ب ه}$  ،  $\overline{ح و}$  متوسطان في  $\Delta م ب د$

[٢]  $م$  نقطة تقاطع متوسطات  $\Delta م ب د$

[٣]  $م ه = \frac{1}{2} ب ه = \frac{1}{2} ٩ = ٤.٥$  سم

[٤]  $م ع = \frac{1}{2} ح د = \frac{1}{2} ٤ = ٢$  سم

[٥]  $م ه = \frac{1}{2} ب د = \frac{1}{2} ٨ = ٤$  سم

[٦] محيط  $\Delta م ع ه = ٤.٥ + ٢ + ٣ = ٩.٥$  سم

(٣) [١]  $م ه = \frac{1}{2} ب د = \frac{1}{2} ٨ = ٤$  سم

[٢]  $م ح = \frac{1}{2} د ب = \frac{1}{2} ٣ = ١.٥$  سم

[٣]  $م ه = \frac{1}{2} ب د = \frac{1}{2} ٨ = ٤$  سم

[٤] محيط  $\Delta م ح ه = ٤ + ١.٥ + ٤ = ٩.٥$  سم

(٤)  $\Delta م ب د$   $ع$  متوازي أضلاع  $\therefore م$  منتصف  $\overline{ب ه}$

$\therefore م$  منتصف في  $\Delta م ب ه$

$\therefore ه$  منتصف  $\overline{م ب}$   $\therefore ه$  منتصف في  $\Delta م ب ه$

$\therefore م$  ،  $ه$  ،  $و$  =  $\overline{م ه} \cap \overline{م ب}$

$\therefore$  نقطة تقاطع متوسطات  $\Delta م ب ه$

$\therefore م ه = \frac{1}{2} ب ه = \frac{1}{2} ١٢ = ٦$  سم

$م و = \frac{1}{2} ب د = \frac{1}{2} ٩ = ٤.٥$  سم

$م ه = ب د = ١٢$  سم

( ضلعان متقابلان في متوازي الأضلاع  $\Delta م ب ه$  )

$\therefore$  محيط  $\Delta م ه و = ٦ + ٤.٥ + ١٢ = ٢٢.٥$  سم

(٥)  $\Delta م ب د$   $ع$  مستطيل  $\therefore م$  منتصف  $\overline{م د}$

$\therefore م$  منتصف في  $\Delta م ب د$

$\therefore ه$  منتصف  $\overline{م ب}$   $\therefore ه$  منتصف في  $\Delta م ب د$

$\therefore م$  ،  $ه$  ،  $و$  =  $\overline{م ه} \cap \overline{م ب}$

$\therefore$  نقطة تقاطع متوسطات  $\Delta م ب د$

$\therefore م و = \frac{1}{2} ب د = \frac{1}{2} ٤ = ٢$  سم

$\therefore م ه = ب د = ٤$  سم

( قطرا المستطيل  $\Delta م ب د$  ، ينصف كل منهما الآخر )

$\therefore م ب = م د = ٤$  سم

(٦)  $\Delta م ب د$   $ع$  منتصف  $\overline{م د}$   $\therefore م$  منتصف في  $\Delta م ب د$

$\therefore م ب = م د = ٤$  سم ،  $م ه = م و = ٤$  سم

$\therefore م$  نقطة تقاطع متوسطات  $\Delta م ب د$

$\therefore م ب = م د = ٤$  سم ،  $م ه = م و = ٤$  سم

$\therefore م$  منتصف في  $\Delta م ب د$

$\therefore م ب = م د = ٨$  سم  $\therefore م ه = م و = ١٢$  سم

$\therefore \Delta م ب د$  فيه :  $ع$  منتصف  $\overline{م د}$  ،  $و$  //  $\overline{م ب}$

$\therefore$  و منتصف  $\overline{م د}$   $\therefore م و = \frac{1}{2} ب د = ٦$  سم ،

(٧) في  $\Delta م ب د$  :  $\therefore م$  ،  $و$  (  $\Delta م ب د$  )  $\therefore م$  ،  $و$  =  $٩٠^\circ$  ،  $م ه = م و$

$\therefore م ه = م و = \frac{1}{2} ب د = \frac{1}{2} ١٢ = ٦$  سم

$\therefore م ه$  ،  $م و$  متوسطان في  $\Delta م ب د$  تقاطعا في نقطة  $م$

$\therefore م$  نقطة تقاطع متوسطات  $\Delta م ب د$

∴ من  $\triangle ABC$  يكون :  $\angle A = 90^\circ$

(١٢) في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$

$$\angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\angle B = 30^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

∴ من  $\triangle ABC$  يكون :  $\angle A = 90^\circ$

(١٣) في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$

$$\angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\angle B = 30^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\angle C = 60^\circ \Rightarrow \angle A = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\angle A = 30^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

(١٤) في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$

$$\angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\angle B = 30^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\angle C = 60^\circ \Rightarrow \angle A = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\angle A = 30^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\angle B = 60^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\angle C = 30^\circ \Rightarrow \angle A = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\angle A = 60^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$AB = 6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ سم}$$

(٨) في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$  ،  $\angle B = 60^\circ$  ،  $\angle C = 30^\circ$

$$\angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

∴ في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$  ،  $\angle B = 60^\circ$  ،  $\angle C = 30^\circ$

$$\angle B = 60^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

(٩) ∴ في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$  ،  $\angle B = 60^\circ$  ،  $\angle C = 30^\circ$

$$\angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

∴ في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$  ،  $\angle B = 60^\circ$  ،  $\angle C = 30^\circ$

$$\angle B = 60^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\angle C = 30^\circ \Rightarrow \angle A = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

∴ من (١) ، (٢) ، (٣) ينتج :  $\angle A = 90^\circ$  ،  $\angle B = 60^\circ$  ،  $\angle C = 30^\circ$

(١٠) في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$  ،  $\angle B = 60^\circ$  ،  $\angle C = 30^\circ$

$$\angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\angle B = 60^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

∴ من  $\triangle ABC$  يكون :  $\angle A = 90^\circ$

(١١) في  $\triangle ABC$  :  $\angle A = 90^\circ$

$$\angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle B = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\angle B = 60^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$



∴ مساحة المربع  $\Delta$  ب د ع =  $8 \times 8 = 64$  سم<sup>٢</sup>

(١٩) في  $\Delta$  ع د هـ : ∴  $\angle$  ب هـ د =  $90^\circ$

،  $\angle$  هـ د ع =  $30^\circ$  ∴  $\angle$  ع هـ د =  $60^\circ$  (١)

،  $\Delta$  ب د ع مستطيل فيه ،  $\angle$  هـ د ع =  $30^\circ$

∴  $\angle$  ب د هـ =  $60^\circ$

∴ في  $\Delta$  ع د هـ : ∴  $\angle$  ب هـ د =  $90^\circ$

∴  $\angle$  ب هـ د =  $30^\circ$  ∴  $\angle$  ح هـ د =  $60^\circ$  (٢)

من (١) ، (٢) ينتج : ح هـ د =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  ب د ح

(٢٠) [١] نصف [٢] نصف [٣] قائمة [٤] ١٠ [٥] ٥ [٦] ٦

الدرس الثاني : المثلث المتساوي الساقين

رقم الشكل	[١]	[٢]	[٣]
اسم المثلث	ل ل م	هـ هـ و	ب ب د
القاعدة	ل م	هـ و	ب د
الساقان	ل ل ، ل م	هـ هـ ، هـ و	ب ب ، ب د
زاويتي القاعدة	ل م ، ل م	هـ و ، هـ و	ب د ، ب د
زاوية الرأس	ل م	هـ هـ	ب ب
و نوعها	منفرجة	قائمة	حادة

(١)

(١٥) في  $\Delta$  ب د ح : ∴  $\angle$  ب د ح =  $90^\circ$

،  $\angle$  د ب ح =  $30^\circ$  ∴  $\angle$  ب ح د =  $60^\circ$  سم ١٢ =  $6 \times 2$  = ب د ح

، في  $\Delta$  ب د ح : ∴  $\angle$  ب د ح =  $90^\circ$  ،  $\angle$  د ب ح =  $60^\circ$  سم ٦ =  $3 \times 2$  = ب د ح

∴  $\angle$  ب د ح =  $90^\circ$

(١٦) في  $\Delta$  ب د ح : ∴  $\angle$  ب د ح =  $90^\circ$

،  $\angle$  د ب ح =  $30^\circ$  ∴  $\angle$  ب ح د =  $60^\circ$  سم ١٦ =  $8 \times 2$  = ب د ح

، ∴  $\angle$  ب د ح =  $90^\circ$  ∴  $\angle$  ب ح د =  $60^\circ$  سم ٨ =  $4 \times 2$  = ب د ح

، في  $\Delta$  د ع هـ فيه :  $\angle$  د ع هـ =  $90^\circ$

،  $\angle$  د هـ ع =  $30^\circ$  ∴  $\angle$  د ع هـ =  $60^\circ$  سم ٨ =  $4 \times 2$  = د ع هـ

(١٧) في  $\Delta$  ب ع هـ فيه : ∴  $\angle$  ب ع هـ =  $90^\circ$

،  $\angle$  ب هـ ع =  $30^\circ$  ∴  $\angle$  ب ع هـ =  $60^\circ$  سم ١٠ =  $5 \times 2$  = ب ع هـ

، في  $\Delta$  ب د ح فيه : ∴  $\angle$  ب د ح =  $90^\circ$  ،  $\angle$  د ب ح =  $60^\circ$  ،  $\angle$  ب ح د =  $30^\circ$

∴  $\angle$  ب د ح =  $90^\circ$  سم ١٠ =  $5 \times 2$  = ب د ح

(١٨) ∴  $\Delta$  ب د ع مربع : ∴  $\angle$  ب د ع =  $90^\circ$  ،  $\angle$  د ب ع =  $90^\circ$  ،  $\angle$  ب ع د =  $90^\circ$

∴ في  $\Delta$  ب د هـ : ∴  $\angle$  ب د هـ =  $60^\circ$

∴  $\angle$  د ب هـ =  $30^\circ$  ،  $\angle$  د هـ ب =  $60^\circ$

، ∴ في  $\Delta$  ب ع و :  $\angle$  ب ع و =  $90^\circ$

∴  $\angle$  ب و ع =  $30^\circ$  ،  $\angle$  ب ع و =  $60^\circ$  ،  $\angle$  و ب ع =  $90^\circ$  سم ٨ =  $4 \times 2$  = ب و ع

## الدرس الثالث : نظريات المثلث المتساوي الساقين

$$(1) [1] \text{ س } = 50^\circ, \text{ ص } = 70^\circ [2] \text{ س } = 84^\circ, \text{ ص } = 132^\circ$$

$$[3] \text{ س } = 60^\circ, \text{ ص } = 50^\circ$$

$$[4] \text{ س } = 116^\circ, \text{ ص } = 52^\circ, \text{ ع } = 64^\circ$$

$$[5] \text{ س } = 20^\circ \text{ لأن : } 2\text{س} + 2\text{س} + 40^\circ = 180^\circ \Rightarrow 4\text{س} = 140^\circ \Rightarrow \text{س} = 35^\circ$$

$$[6] \text{ س } = 21^\circ \text{ لأن : } 2\text{س} + 12^\circ + 12^\circ + 3\text{س} = 180^\circ \Rightarrow 5\text{س} = 90^\circ \Rightarrow \text{س} = 18^\circ$$

$$[7] \text{ س } = 30^\circ \text{ لأن : } 3\text{س} - 17^\circ = 13^\circ \Rightarrow 3\text{س} = 30^\circ \Rightarrow \text{س} = 10^\circ$$

$$[8] \text{ س } = 66^\circ, \text{ ص } = 57^\circ$$

$$(2) \Delta \text{ ب د فيه : } \text{ب} = \text{د} \Rightarrow \text{ب} = \text{د} = 70^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ب} = \angle \text{د} = 70^\circ \Rightarrow \angle \text{ا} = 180^\circ - 70^\circ - 70^\circ = 40^\circ$$

$$\Delta \text{ د ع فيه : } \text{د} = \text{ع} \Rightarrow \text{د} = \text{ع} = 70^\circ$$

$$\therefore \angle \text{د} = \angle \text{ع} = 70^\circ \Rightarrow \angle \text{ا} = 180^\circ - 70^\circ - 70^\circ = 40^\circ$$

$$\angle \text{ا} = 40^\circ = (70^\circ + 70^\circ) - 180^\circ = \angle \text{ب د ع}$$

$$\therefore \angle \text{ب د ع} = \angle \text{ب د ا} + \angle \text{د ع ا} = 130^\circ = 70^\circ + 60^\circ$$

$$\angle \text{ب د ع} = 130^\circ = 70^\circ + 60^\circ$$

$$\angle \text{ب د ع} = \angle \text{ب د ا} + \angle \text{د ع ا} = 100^\circ = 40^\circ + 60^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ب د ع} = 100^\circ = 40^\circ + 60^\circ$$

$$(3) \Delta \text{ ب د فيه : } \text{ب} = \text{د} \Rightarrow \text{ب} = \text{د} = 70^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ب} = \angle \text{د} = 70^\circ$$

$$\Delta \text{ ب د فيه : } \text{ب} = \text{د} \Rightarrow \text{ب} = \text{د} = 70^\circ$$

$$(7) \angle \text{ا} = 40^\circ = (100^\circ - 180^\circ) \times \frac{1}{2} = \angle \text{ب د ع}$$

$$\text{من (1) ، (2) بالطرح ينتج : } \angle \text{ب د} = 20^\circ$$

$$(4) \Delta \text{ ب د فيه : } \text{ب} = \text{د} \Rightarrow \text{ب} = \text{د} = 70^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ب د} = 70^\circ, \angle \text{د ع} = 70^\circ$$

$$\angle \text{ب} = 70^\circ, \angle \text{د} = 70^\circ, \angle \text{ا} = 40^\circ$$

$$\therefore \text{ينطبق المثلثان و ينتج : } \angle \text{ب د} = \angle \text{د ع}$$

$$\Delta \text{ ب د متساوي الساقين}$$

$$\therefore \angle \text{ب د} = \angle \text{د ع} = 70^\circ$$

$$(5) \Delta \text{ ب د متوازي أضلاع} \therefore \angle \text{ب د} = \angle \text{د ع}$$

$$\therefore \angle \text{ب د} = \angle \text{د ع} = 70^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ب د} = \angle \text{د ع} = 70^\circ$$

$$\angle \text{ب د} = 70^\circ = (50^\circ - 180^\circ) \times \frac{1}{2} = \angle \text{ب د}$$

$$\therefore \angle \text{ب د} = \angle \text{د ع} = 70^\circ$$

$$\angle \text{ب د} = 70^\circ = \angle \text{ب د}$$

$$(6) [1] \text{ ب} = \text{د} \Rightarrow \text{ب} = \text{د} = 70^\circ$$

$$[3] \text{ ع ص} = \text{ع س} \text{ لأن : } \angle \text{ا} = \angle \text{ب د} = 70^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ا} = 70^\circ = 70^\circ - 140^\circ = \angle \text{ب د}$$

$$[4] \angle \text{ب د} = 70^\circ \text{ لأن : } 3\text{ب} + 3\text{د} + 20^\circ = 180^\circ$$

$$\text{ومنها : } 70^\circ = \angle \text{ب د} = \angle \text{ب د}$$

$$(7) \angle \text{ب د} = 72^\circ \therefore \angle \text{ب د} = 72^\circ = \frac{72}{2} = \angle \text{ب د}$$

$$\therefore \angle \text{ب د} = 72^\circ$$

$$\therefore \angle \text{ب د} = (72^\circ + 72^\circ) - 180^\circ = \angle \text{ب د}$$

$\therefore \angle (ه ب ع) = \angle (ه ب د) \therefore ه ب = ه د$   
 $\therefore \Delta ه ب د$  متساوي الساقين

$$(11) \quad \angle ب د = [2] \quad 0. \quad [3] \quad 20 \quad [4] \quad 82 \quad [5] \quad 03$$

$$[6] \quad 0 \quad [7] \quad 6. \quad [8] \quad 12. \quad [9] \quad \text{قائم الزاوية}$$

(12) [1] منفرج الزوية

$$[2] \quad 6.$$

$$[3] \quad 20$$

$$[4] \quad 12. \quad [5] \quad \text{منفرجة} \quad [6] \quad \text{متساوي الساقين}$$

الدرس الرابع : نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين

$$(1) \quad \Delta م ب د \text{ فيه : } م ب = م د , \overline{م د} \perp \overline{ب د}$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 32^\circ$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 32^\circ \times 2 = 64^\circ$$

$$م ب = م د = م د = م د = 6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ سم}$$

$$(2) \quad \Delta م ب د \text{ فيه : } م ب = م د , \overline{م د} \perp \overline{ب د}$$

$$\therefore م ب = م د = م د = م د = 2 \times 4 = 8 \text{ سم}$$

$$\angle (م د ب) = \angle (م د د) = 9.^\circ$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 9.^\circ \times 2 = 18.^\circ$$

$$\therefore \text{من } \Delta م ب د : \angle (م د ب) = 18.^\circ = (9.^\circ + 9.^\circ) - 18.^\circ = 9.^\circ$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 9.^\circ$$

$$\therefore م ب = م د$$

$$\therefore \Delta م ب د \text{ متساوي الساقين}$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) \therefore م ب = م د$$

$$\therefore \Delta م ب د \text{ متساوي الساقين}$$

$$(8) \quad \therefore \Delta م ب د \text{ فيه : } م ب = م د , \angle (م د ب) = 12.^\circ$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 12.^\circ \times \frac{1}{2} = 6.^\circ$$

$$= 3.^\circ$$

$$\therefore \overline{م د} \text{ ينصف } \angle م ب د \therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 6.^\circ$$

$$\therefore \overline{م د} \text{ ينصف } \angle م ب د \therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 6.^\circ$$

$$\therefore \overline{م د} \text{ ينصف } \angle م ب د \therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 6.^\circ$$

$$\therefore \overline{م د} \text{ ينصف } \angle م ب د \therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 6.^\circ$$

$\therefore$  في  $\Delta م ب د$  يكون :

$$\angle (م د ب) = \angle (م د د) = 18.^\circ = (6.^\circ + 6.^\circ) - 18.^\circ = 6.^\circ$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) = 6.^\circ$$

$$\therefore \Delta م ب د \text{ متساوي الأضلاع}$$

$$(9) \quad \therefore \overline{م د} \parallel \overline{ه د} \therefore \angle (م د ب) = \angle (ه د ب) \text{ بالتناظر}$$

$$\angle (م د ب) = \angle (ه د ب) \text{ بالتناظر}$$

$$\therefore م ب = م د \therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د)$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (م د د) \therefore م ب = م د$$

$$\therefore \Delta م ب د \text{ متساوي الساقين}$$

$$\therefore م ب = م د , م ب = م د$$

$$\therefore \text{بالطرح ينتج : } م ب = م د$$

$$(10) \quad \therefore \overline{م د} \parallel \overline{ه د} \therefore \angle (م د ب) = \angle (ه د ب) \text{ بالتبادل}$$

$$\therefore \angle (م د ب) = \angle (ه د ب)$$



$$(٧) \quad \overline{AB} = \overline{BA} \quad \therefore \overline{AB} \supset \overline{BA} \quad \text{محور } \overline{AB}$$

$$\angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\therefore \text{بالتطرح ينتج: } \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$(٨) \quad \overline{AB} = \overline{BA} \quad \therefore \overline{AB} \supset \overline{BA} \quad \text{محور } \overline{AB}$$

$$\therefore \text{من (١)، (٢) ينتج: } \overline{AB} \supset \overline{BA} \quad \text{محور } \overline{AB}$$

$$(٨) \quad \therefore \text{في } \triangle AB \text{ فيه: } \overline{AB} = \overline{BA}$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{BA} \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA) \quad \text{بالتناظر}$$

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{BA} \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA) \quad \text{بالتناظر}$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$(٩) \quad \text{محور تماثل له [٢] محور تماثل لها [٣] متساويين}$$

$$[٤] \quad ٣ \quad [٥] \quad ١ \quad [٦] \quad ٣$$

$$[٧] \quad \text{القاعدة و زاوية رأس المثلث [٨] القاعدة و يكون عمودياً عليها}$$

$$(١٠) \quad [١] \quad ٣ \quad [٢] \quad \text{صل} \quad [٣] \quad \overline{AB} = \overline{BA}$$


$$[٤] \quad \text{محور تماثل} \quad [٥] \quad \text{صفر} \quad [٦] \quad ١ \quad [٧] \quad \text{محور تماثل}$$

للأمانة العلمية

يرجى عدم حذف أسمى نهائياً

يسمح فقط بإعادة النشر

دون أي تعديل



$$(٣) \quad \text{نصل } \overline{AB}, \overline{AC}$$

$$\triangle AB \cong \triangle AC, \overline{AB} = \overline{AC} \text{ فيهما:}$$

$$\angle (AB) = \angle (AC), \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$\angle (AB) = \angle (AC), \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$\therefore \text{ينطبق المثلثان و ينتج أن: } \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$\therefore \triangle AB \cong \triangle AC \text{ فيه: } \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (AC) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$(٤) \quad \overline{AB} = \overline{BA} \quad \therefore \overline{AB} \supset \overline{BA} \quad \text{محور } \overline{AB}$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{BA} \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$\angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$(٥) \quad \overline{AB} = \overline{BA} \quad \therefore \overline{AB} \supset \overline{BA} \quad \text{محور } \overline{AB}$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (BA) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (BA)$$

$$(٦) \quad \triangle ABC \supset \triangle ACB \text{ فيه: } \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (AC) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (AC) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (AC) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (AC)$$

$$\therefore \angle (AB) = \angle (AC) \quad \therefore \angle (AB) = \angle (AC)$$

## الوحدة الخامسة

## التباين

## الدرس الأول : التباين

$$(1) \quad [1] > [2] < [3]$$

$$(2) \quad [1] < [2] < [3] < [4] < [5]$$

$$(3) \quad [1] > [2] < [3] < [4] > [5]$$

$$(4) \quad \angle B < \angle C$$

$$(5) \quad \angle B + \angle C < \angle A + \angle D \quad \angle B < \angle D \quad \angle C < \angle D$$

$$(6) \quad \angle B - \angle C < \angle A - \angle D \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D$$

$$(7) \quad \angle B = \angle C \quad \angle A = \angle D \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D$$

$$(8) \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D \quad \angle B + \angle C < \angle A + \angle D$$

$$(9) \quad \angle B = \angle A \quad \angle C = \angle D \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D$$

$$(10) \quad \angle B = \angle A \quad \angle C = \angle D \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D$$

$$(11) \quad \angle B = \angle A \quad \angle C = \angle D \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D$$

$$(12) \quad \angle B = \angle A \quad \angle C = \angle D \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D$$

$$(13) \quad \angle B = \angle A \quad \angle C = \angle D \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D$$

$$(14) \quad \angle B = \angle A \quad \angle C = \angle D \quad \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle D$$

## الدرس الثاني : المقارنة بين قياسات الزوايا في المثلث

(1) في  $\triangle ABC$  :

$$(1) \quad \angle B < \angle C \quad \angle A < \angle B \quad \angle A < \angle C$$

$$(2) \quad \angle B < \angle C \quad \angle A < \angle B \quad \angle A < \angle C$$

$$(3) \quad \angle B < \angle C \quad \angle A < \angle B \quad \angle A < \angle C$$

$$(4) \quad \angle B < \angle C \quad \angle A < \angle B \quad \angle A < \angle C$$

$$(5) \quad \angle B < \angle C \quad \angle A < \angle B \quad \angle A < \angle C$$

$$(6) \quad \angle B < \angle C \quad \angle A < \angle B \quad \angle A < \angle C$$

$$(7) \quad \angle B < \angle C \quad \angle A < \angle B \quad \angle A < \angle C$$

$$(8) \quad \angle B < \angle C \quad \angle A < \angle B \quad \angle A < \angle C$$

(3) نصل  $AD$

$$\triangle ABC \text{ فيه : } \angle B = \angle C$$

$$\triangle ABD \text{ فيه : } \angle B < \angle A$$


$$\triangle ADC \text{ فيه : } \angle C < \angle A$$

$$\triangle ABC \text{ فيه : } \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle A$$


$$\triangle ABC \text{ فيه : } \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle A$$

$$\triangle ABC \text{ فيه : } \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle A$$

$$\triangle ABC \text{ فيه : } \angle B < \angle A \quad \angle C < \angle A$$



## (٤) نصل بـ ع



$\triangle ABC$  فيه :  $AB = AC$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB$$

$\triangle ACD$  فيه :  $AD < AC$

$$\therefore \angle ACD < \angle CAD$$

$$\therefore \angle ABC + \angle ACD < \angle ACB + \angle CAD$$

$$\angle ABC + \angle ACD < \angle ACB + \angle CAD$$

$$\therefore \angle ABC < \angle CAD$$

(٥)  $\triangle AED$  فيه :  $AD < AE$

$$\therefore \angle AED < \angle ADE$$

$$\therefore \angle AED < \angle ADE$$

$$\angle AED < \angle ADE$$

$$\angle AED < \angle ADE$$

(٦)  $\overline{AE}$  ،  $\overline{AD}$  متوسطان في  $\triangle ABC$  تقاطعا في نقطة م

$\therefore$  نقطة تقاطع متوسطات  $\triangle ABC$

$$\therefore AM = ME, BM = MD$$

$$\therefore ME < MD, MD < ME$$

$$\therefore ME < MD, MD < ME$$

$\therefore$  من  $\triangle AEM$  يكون :  $\angle AEM > \angle AME$

(٧)  $\triangle AED$  فيه :  $AD < AE$

$$\therefore \angle AED < \angle ADE$$

$\therefore \triangle ABC$  مستطيل

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ABC > \angle ACB$$

(٨)  $\triangle ABC$  متساوي الأضلاع

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 60^\circ$$

$$\therefore \angle ABC < \angle ACB$$

$$\therefore \angle ABC < \angle ACB$$

$$\angle ABC < \angle ACB$$

$$\angle ABC < \angle ACB$$

$$\angle ABC < \angle ACB$$

$$\angle ABC < \angle ACB$$

$$\angle ABC < \angle ACB$$

$$\angle ABC < \angle ACB$$

$$\angle ABC < \angle ACB$$

$$(٩) [١] \text{ أصغر } [٢] \text{ أكبر } [٣] ٦. [٤] <$$

$$[٥] \angle ABC < \angle ACB$$

$$(١٠) [١] > [٢] \angle ABC < \angle ACB [٣] >$$

أحمد الشنتوري

## الدرس الثالث : المقارنة بين أطوال الأضلاع في المثلث

$$(1) [1] < [2] > [3] > [4]$$

$$(2) \overline{PM} \parallel \overline{PD} \therefore \angle (PMD) = \angle (PDM) = 30^\circ \text{ بالتبادل}$$

$$\angle (PMD) = \angle (PDM) = 70^\circ \text{ بالتناظر}$$

$$\therefore \Delta PMD \text{ فيه : } \angle (PMD) < \angle (PDM) \therefore PM < PD$$

$$(3) \overline{PM} \parallel \overline{PD}$$

$$\therefore \angle (PMD) = \angle (PDM) = 30^\circ \text{ بالتبادل}$$

$$\therefore \Delta PMD \text{ فيه : } \angle (PMD) < \angle (PDM) \therefore PM < PD$$

$$\therefore PM < PD$$

$$(4) \text{ نصل } \overline{PE}$$

$$\therefore \Delta PBE \text{ فيه : } PE = PB$$

$$\therefore \angle (PEB) = \angle (PBE) = 30^\circ$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$(5) \therefore \Delta PBE \text{ فيه : } PE = PB$$

$$\therefore \angle (PEB) = \angle (PBE) = 30^\circ$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$


$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

$$\therefore \angle (PEB) < \angle (PBE) \therefore PE < PB$$

أحمد الشنتوري



$$\therefore \angle (PMD) < \angle (PDM) \therefore PM < PD$$

$$\therefore PM < PD$$

$$(6) \therefore \angle (PMD) = \angle (PDM) = 120^\circ - 180^\circ = 60^\circ$$

$$\therefore \angle (PMD) = \angle (PDM) = 100^\circ - 180^\circ = 80^\circ$$

$$\therefore \angle (PMD) > \angle (PDM) \therefore PM > PD$$

$$(7) \therefore \Delta PMD \text{ فيه : } \angle (PMD) = 90^\circ \therefore PM > PD$$

$$(8) \therefore \Delta PMD \text{ فيه : } \angle (PMD) = 90^\circ \therefore PM > PD$$

$$\text{بجمع (1) ، (2) ينتج : } PM + PD < PE + ED$$

$$\therefore PM < PD$$

$$(9) \therefore \angle (PMD) = \angle (PDM) = 180^\circ$$

$$\therefore 180^\circ = 20^\circ + 30^\circ + 10^\circ - 30^\circ + 2^\circ + 3^\circ$$

$$\therefore 180^\circ = 12^\circ + 3^\circ \text{ ومنها : } 14^\circ$$

$$\therefore \angle (PMD) = 72^\circ \text{ ، } \angle (PDM) = 74^\circ$$

$$\therefore \angle (PMD) = 34^\circ$$

$$\therefore \angle (PMD) > \angle (PDM) \therefore PM > PD$$

$$\therefore PM > PD$$

$$(10) \text{ أصغر [2] الوتر [3] } \overline{PD} \text{ [4] } \overline{PM} \text{ [5] } \overline{PD}$$

$$(11) \text{ [1] } PM < PD \text{ [2] } PM < PD \text{ [3] } PM$$

$$\text{[4] } PM < PD \text{ [5] } PM < PD \text{ [6] } PM$$

الدرس الرابع : متباينة المثلث المثلث

$$(1) \text{ [1] } 3, 6, 9 \text{ لا تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث}$$

$$\text{لأن : } 9 = 6 + 3$$

